



Vercal™

Λίπασμα

Υδατοδιαλυτό υγρό λίπασμα ασβεστίου για διαφυλλική εφαρμογή σε καρποφόρα δένδρα και άλλες καλλιέργειες.

Λ.Τ. (Π Ι) (Μ Ι) - Δ. 2 Ανόργανο λίπασμα δευτερευόντων θρεπτικών συστατικών. Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου (σύμφωνα με την ΥΑ50424/2025).
Οξείδιο του ασβεστίου (CaO): 15.9% β/β (21.1% β/ο) (διαλυτό στο νερό)
Ως διάλυμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το λίπασμα Vercal™ είναι πλήρως υδατοδιαλυτό υγρό λίπασμα Ασβεστίου υπό μορφή χλωριούχου ασβεστίου, για διαφυλλική εφαρμογή, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ασβεστίου σε καρποφόρα δένδρα και άλλες καλλιέργειες.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Προφυλάξεις: ● Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας τα μάτια/πρόσωπο. ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ● Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ● Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: ● **Επαφή με τα μάτια:** Κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά. Καλέστε ένα γιατρό εάν δεν υποχωρεί ο ερεθισμός. ● **Επαφή με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα βαμμένα ή πιτσιλισμένα ρούχα που δεν προσκολλώνται στο δέρμα. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. ● **Εισπνοή:** Απομακρύνετε το άτομο από την έκθεση εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του ατόμου ενώ το κάνει. **Κατάποση:** Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗ προκαλείτε εμετό. Αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του, δώστε του να πει 2 ποτήρια νερό. Κάντε αμέσως ιατρική εξέταση.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

UFI: KQ41-N3T8-5N4T-6KF3

Αρ.παρτίδας/Ημερ. παραγωγής: Αναγράφεται επί της φιάλης

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Εισάγεται στην Ευρώπη από: FMC Agricultural Solutions A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Denmark.
TEL: 45 (0) 96909690 **και διανέμεται στην Ελλάδα από:**
FMC Χημικά Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε., Α. Συγγρού 348,
Τ.Κ: 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 455701000

Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την:
FMC AGRO LIMITED. Rectors Lane, Pentre,
Flintshire, CH5 2DH, Ηνωμένο Βασίλειο

11008732_22066625_GREECE

Τα FMC, FMC logo και Vercal™ είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της. ©2020-2025 FMC Corporation. All rights reserved.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. Συμβουλευτείτε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μήλα: Η χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο αυξάνει τον κίνδυνο πικρής κηλίδωσης, σκωριόχρωσης, σχίσματος του δέρματος, ή ρωγμών της επιφάνειας και μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τις δυνατότητες αποθήκευσης των καρπών. Οι εφαρμογές του ασβεστίου συμβάλλουν στην αποκατάσταση του δέντρου καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Δόση 200-500 κ.εκ./στρέμμα από το στάδιο του μπουμπουκιού μέχρι την αρχή της ανθοφορίας και από την έναρξη της καρπώσεως έως την συγκομιδή ανά 7-10 ημέρες.

Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα: 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την καρπώσεως έως την συγκομιδή.

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό, μαρούλι, σπανάκι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, αγκινάρα, φασολάκια: 250-500 κ.εκ./στρέμμα ξεκινώντας 15-20 ημέρες μετά την μεταφύτευση.

Πατάτα, καρότο: 250-500 κ.εκ./στρέμμα ξεκινώντας από την δόγκωση του κονδύλου και επανάληψη ανά 20-25 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Κρεμμύδι, σκόρδο, βολβοί: 250-500 κ.εκ./στρέμμα ξεκινώντας από την δόγκωση του βολβού και επανάληψη ανά 20-25 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο): 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την δόγκωση των οφθαλμών ως την αρχή της άνθησης και στην συνέχεια από την καρπώσεως ως την συγκομιδή ανά 10 ημέρες.

Φράουλα, μικροί καρποί και μούρα (Σμέουρα, Μύρtila, Βατόμουρα): 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την καρπώσεως έως την συγκομιδή.

Εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, συκιά, ακτινίδιο: 250-500 κ.εκ./ στρέμμα από την δόγκωση των οφθαλμών ως την αρχή της άνθησης και στην συνέχεια από την καρπώσεως ως την συγκομιδή ανά 7-10 ημέρες.

Αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκι, καστανιά: 250-500 κ.εκ./στρέμμα. Εφαρμόστε στην καρπώσεως και επαναλάβετε τη εφαρμογή εάν απαιτείται μετά από 15-20 ημέρες.

Ελιά: 250-500 κ.εκ./στρέμμα από την καρπώσεως και επανάληψη μετά από 20-25 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Βαμβάκι: 100-150 κ.εκ./στρέμμα κατά την έναρξη της άνθησης και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.

Σητάρι: 75-100 κ.εκ./στρέμμα κατά την επιμήκυνση του βλαστού.

Αραβόσιτος, ζαχαρότευτλα: 125-150 κ.εκ./στρέμμα κατά την επιμήκυνση του βλαστού.

Ελαιόχοι σπόροι, ελαιοκράμβη: 100-150 κ.εκ./στρέμμα εφαρμογή μετά την ανθοφορία.

Όσπρια: Φασόλια, ρεβίθια, φακές, μπιζέλια: 75-100 κ.εκ./στρέμμα στην αρχή της άνθησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ● Για εφαρμογή με στάγδην άρδευση δόσολογία 0,7-1 λίτρο/στρέμμα. ● Αποφύγετε τον ψεκασμό σε υψηλές θερμοκρασίες και ακραίες συνθήκες. Μικρότερες δόσεις κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. ● Οι δόσεις

πρέπει επίσης να είναι ανάλογες με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες στρες. ● Οι προτεινόμενες δόσεις μπορεί να ποικίλουν λόγω διαφορετικών τύπων εδάφους, διαφορετικών γεωργικών πρακτικών και καιρικών συνθηκών. Να συμβουλευτείτε πάντα έναν τεχνικό. Το προϊόν να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει έντονο το ηλιακό φως και θερμοκρασίες άνω των 25°C. Εάν είναι δυνατόν οι ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα.

Εκτακτικές καλλιέργειες: Εφαρμόζεται όταν υπάρχει στρέψ λόγω ξηρασίας ειδικά αμέσως μετά τη γονιμοποίηση των άνθεων.

Όγκος νερού: Ανάλογα με το μέγεθος του δέντρου εφαρμόστε 15-50 λίτρα ανά στρέμμα. Σε πλήρως ανεπτυγμένα δένδρα εφαρμόζετε επαρκές νερό έτσι ώστε να φτάσει στο επίπεδο της απορρόφησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν το ανοίξετε και το χρησιμοποιήσετε. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού με νερό μέχρι τη μέση, αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος Vercal™. Ξεπλύνετε καλά το δοχείο, προσθέστε τα ξεπλύνματα στη δεξαμενή ψεκασμού, ολοκληρώστε το γέμισμα και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Μην εισπνέετε πάνω από το προϊόν. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση.

Συνιστάται οι παραγωγοί να ενημερώνονται από τους κατά τόπους γεωπόνους, για την ορθή χρήση της εκάστοτε περίπτωσης και την αποφυγή της υπερβολικής λίπανσης. Συνιστάται τα αποτελέσματα της ανάλυσης εδάφους και ιστών να χρησιμοποιούνται ώστε είναι δυνατόν για να καθοδηγήσουν τις εφαρμογές μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών για τη βελτιστοποίηση της κατάστασης των θρεπτικών συστατικών της καλλιέργειας. Επικοινωνήστε με την εταιρεία ή τον διανομέα της εταιρείας για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. (www.fmc.com).

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το λίπασμα Vercal™ είναι φυσικά και χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών προϊόντων. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για τις τελευταίες πληροφορίες. Να διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα του προϊόντος προσεκτικά πριν την ανάμειξη με το λίπασμα Vercal™.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5°C. Κρατήστε το σε δροσερό μέρος, καλά αεριζόμενο και κατάλληλο μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε μέρη με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Προστατεύστε το σκεύασμα από τον παγετό.

11008732_22066625_LBL_SL-F_1L_VERCAL_GR_5