

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την κατηγορία του φ.π. στην 1^η και 2^η σελίδα από το εσφαλμένο «ζιζανιοκτόνο» στο ορθό «φυτορρυθμιστική ουσία», το σημείο 4 στην 6^η σελίδα όπου διαγράφεται η λέξη «ζιζανιοκτόνο» και το σημείο 6 στην 8η σελίδα (αρ. πρωτ. 247072/15.09.2025).



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.09.2025
Αριθ. πρωτ: 242165

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
E-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) AFFINITY (δ.ο. carfentrazone-ethyl 6 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
 - β) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
 - γ) (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΕ) αριθ. 2018/1061 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2018 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **carfentrazone-ethyl**, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής,
 - ε) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και

τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ)».
4. Την από 04/2025 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 494/28.05.2025) και την αρ. 239498/08.09.2025 ηλεκτρονική αλληλογραφία.
5. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’2339/14.05.25).
6. Τις αρ. πρωτ. 2963/85558/31.03.2022, 4294/119673/06.05.2022, 5697/161355/10.06.2022, 8913/260239/08.09.2022, 7707/199726/09.07.2024, 12002/332660/30.10.2024 και 163230/18.06.2025 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **AFFINITY (δ.ο. carfentrazone-ethyl 6 % β/ο)**, της εταιρείας **FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

8335

10.09.2025

31.07.2034

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

AFFINITY

1.2.β Μορφή:

Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (**ME**)

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

carfentrazone-ethyl

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

91% β/β min

Χημική ομάδα:

Τριαζολινονών

Παρασκευαστής της δ.ο. :

FMC Corporation

1735 Market Street

Philadelphia, PA 19103, NJ, ΗΠΑ

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Jiangsu Baozong & Baoda Pharmachem Co., Ltd.

No. 10 Yuejiang Road

Changjiang Town (Rugao Port District)

Rugao, Jiangsu 226532, Κίνα

2. Jiangsu Lianhe Chemical Technology Co. Ltd.

Weisan Rd, Chenjiagang, Xiangshui

Jiangsu Province, 224631, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστηκής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστηκής ουσίας προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 2963/85558/31.03.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 198 3903
FAX: +30 211113 8614
E-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 198 3903
FAX: +30 211113 8614
E-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

β) Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 198 3903
FAX: +30 211113 8614
E-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Δανία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του
σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. FMC Corporation**
Wyoming Plant Highway 17E
P.O Box 180
Wyoming IL 61491, Η.Π.Α.
- 2. FMC Agro Singapore Pte Ltd.**
Singapore Formulation Unit
Tuas View Circuit, Singapore, 637470, Σιγκαπούρη
- 3. DuPont de Nemours (France) S.A.I.**
Agricultural Products, 82, rue de Wittelsheim, BP9 F-68701
Cernay CEDEX, Γαλλία
- 4. Cheminova Deutschland GmbH & Co KG**
Stader Elbstraße 28,
D-21683 Stade, Γερμανία
- 5. Kwizda Agro GmbH**

- F. Joh. Kwizda GmbH, Agrarchemie
Kwizda-Allee
A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Αυστρία
- 6. Cheminova A/S**
Thyborønvej 78
DK-7673 Harboøre, Δανία
- 7. Laboratorios Sirga**
Poligono Industrial del Mediterraneo
46560 Massalfassar – Valencia, Ισπανία
- 8. Schirm GmbH**
Standort Baar-Ebenhausen
Dieselstrasse 8
DE- 85107 Baar-Ebenhausen, Γερμανία
- 9. Schirm GmbH Standort Lübeck,**
Betriebsstätte Lübeck,
Mecklenburger Strasse 229,
23568 Lübeck, Schleswig-Holstein, Γερμανία
- 10. Schirm GmbH Standort Schönebeck**
Geschwister-Scholl Strasse 127
D-39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία
- 11. Imperial Chemical Logistics GmbH (former Lehnkering GmbH)**
Wendessener Strasse 11 c,
38300 Wolfenbüttel, Γερμανία
- 12. Althaller Italia s.r.l.**
Strada Comunale per Campagna 5
20078 San Colombano al Lambro (MI), Ιταλία
- 13. MAGMA Γεωργικές Εισροές Α.Ε.** θέση Ποταμιά,
Οινόφυτα Βοιωτίας

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. FMC Corporation**
Wyoming Plant Highway 17E
P.O Box 180
Wyoming IL 61491, Η.Π.Α.
- 2. FMC Agro Singapore Pte Ltd.**
Singapore Formulation Unit
Tuas View Circuit, Singapore, 637470, Σιγκαπούρη
- 3. DuPont de Nemours (France) S.A.I.**
Agricultural Products, 82, rue de Wittelsheim, BP9 F-
68701
Cernay CEDEX, Γαλλία
- 4. Cheminova Deutschland GmbH & Co KG**
Stader Elbstraße 28,
D-21683 Stade, Γερμανία
- 5. Kwizda Agro GmbH**
F. Joh. Kwizda GmbH, Agrarchemie
Kwizda-Allee
A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Αυστρία
- 6. Cheminova A/S**
Thyborønvej 78
DK-7673 Harboøre, Δανία
- 7. Laboratorios Sirga**
Poligono Industrial del Mediterraneo
46560 Massalfassar – Valencia, Ισπανία

8. Schirm GmbH

Standort Baar-Ebenhausen
Dieselstrasse 8
DE- 85107 Baar-Ebenhausen, Γερμανία

9. Schirm GmbH Standort Lübeck,

Betriebsstätte Lübeck,
Mecklenburger Strasse 229,
23568 Lübeck, Schleswig-Holstein, Γερμανία

10. Schirm GmbH Standort Schönebeck

Geschwister-Scholl Strasse 127
D-39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία

11. Imperial Chemical Logistics GmbH (former Lehnkering GmbH)

Wendessener Strasse 11 c,
38300 Wolfenbüttel, Γερμανία

12. Althaller Italia s.r.l.

Strada Comunale per Campagna 5
20078 San Colombano al Lambro (MI), Ιταλία

13. MAGMA Γεωργικές Εισροές Α.Ε. θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: carfentrazone-ethyl 6% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 92,92% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ 2963/85558/31.03.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη/Δοχείο	1- 5 L	COEX HDPE/PA
2	Δοχείο	15 L	COEX HDPE/EVOH

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Αποξήρανση στελεχών πατάτας: καθολικός ψεκασμός φυλλώματος.

Αποξήρανση παραφυάδων στις υπόλοιπες καλλιέργειες: κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δενδροστοιχίας ή των πρέμνων στον αμπελώνα. Εφαρμόζετε στις παραφυάδες χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το υπόλοιπο φυτό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση. Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά τα 2/3. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο υπό συνεχή ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά και με τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας, (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Αποξηραντικό για την αποξήρανση του υπέργειου μέρους της πατάτας πριν τη συγκομιδή και για τον έλεγχο των παραφυάδων επί της γραμμής της δενδροστοιχίας ή των πρέμων στον αμπελώνα.

Η δραστική ουσία του σκευάσματος (carfentrazone-ethyl) παρεμποδίζει το ένζυμο οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrinogen - oxidase, PPG – O ή PP – O), ενός βασικού ενζύμου για την βιοσύνθεση της πρωτο πορφυρίνης (protoporphyrin) κατά την βιοσύνθεση της χλωροφύλλης. Απορροφάται από τα φύλλα, με περιορισμένη διασυστηματική κίνηση εντός του φυτού.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστη- μα (σε ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
Πατάτα SOLTU	Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή (ΥΚΡΑΥ)	100	30-60	Ψεκασμός φυλλώματος κατά την έναρξη κιτρινίσματος των φύλλων (BBCH > 90).	1
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Αποξήρανση παραφυάδων (ΥΕΧΣΤ)	90	10-30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός σε παραφυάδες (ύψους 15-25 εκ.) κατά μήκος της γραμμής φύτευσης των πρέμων, από την πλήρη έκπτυξη 3 ή περισσότερων φύλλων, μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει μέγεθος μπιζελιού (BBCH 13-75).	1

Καρυδιά IUGRE Καρυδιά Πεκάν CYAIL Αμυγδαλιά PRNDU Φουντουκιά CYLAV Φιστικιά PIAVE Καστανιά CSNSA Κουκουναριά PIUPN	Αποξήρανση παραφυάδων (YEXST)	90 ή 45	15-50	Κατευθυνόμενος ψεκασμός κατά μήκος της δενδροστοιχίας σε παραφυάδες ύψους έως 15 εκ.	1 ή 2/ 15-60
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Ιαπωνική μουσμουλιά EIOJA	Αποξήρανση παραφυάδων (YEXST)	90	25-30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός κατά μήκος της δενδροστοιχίας σε παραφυάδες ύψους έως 15 εκ.	1
Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV	Αποξήρανση παραφυάδων (YEXST)	90	25-30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός κατά μήκος της δενδροστοιχίας σε παραφυάδες ύψους έως 15 εκ.	1
Ακτινιδιά ATIDE	Αποξήρανση παραφυάδων (YEXST)	90	25- 30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός σε παραφυάδες (ύψους έως 15 εκ.) κατά μήκος της δενδροστοιχίας, από το στάδιο που ο καρπός έχει μέγεθος 10% μέχρι ο καρπός έχει μέγεθος 90% (BBCH 70-80).	1

Παρατηρήσεις:

1. Η εφαρμογή για αποξήρανση παραφυάδων να γίνεται σε μη ξυλοποιημένες παραφυάδες.
2. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).
3. Η χρήση στην Κερασιά (PRNAV) περιλαμβάνει την Αγριοκερασιά (PRNSO), τη Βυσσινιά (PRNCE) και τα Κράνα (CRWMS).
4. Η χρήση στη Δαμασκηνιά (PRNDO) περιλαμβάνει την Κορομηλιά (PRNCF).
5. Η χρήση στο Αχλάδι (PYUCO) περιλαμβάνει το Ασιατικό Αχλάδι (Nashi) [PYUPY].
6. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα και στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

-Αποφύγετε την επαφή των καρπών με το σκεύασμα.
-Αποφύγετε την επαφή των καρπών με έδαφος στο οποίο έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος.

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία carfentrazone-ethyl, η οποία ανήκει στην ομάδα 14 κατά HRAC.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας:

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μετά από 60 μέρες και εφόσον προηγηθεί ελαφρύ όργωμα (2,5 εκ.) από την εφαρμογή του σκευάσματος μπορούν να σπαρούν ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλα, παντζάρια, μπιζέλια, αραβόσιτος, σιτάρι, κριθάρι και γκαζόν (πολυετής λόλιο).

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

11 Δηλώσεις προφύλαξης**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.**P272:** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή.**Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.***SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).**SPE3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε:

- **Πατάτα:** μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα 20 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στην.
- **Αμπέλι:** μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 20 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.
- **Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα και Ακτινίδια :** μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 20 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

SPE3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήνετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75%.**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.**P302+P352+P333+P313+P362+P364:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ

ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλυθείτε με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας συμβουλέψει σχετικά ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο εφαρμογής	Ημέρες
Πατάτα (0211000)	3
Αμπέλι επιτραπέζιο (0151010), Αμπέλι οινοποιήσιμο (0151020) Μηλιά (0130010), Αχλαδιά, Ασιατικό αχλάδι (nashi) (0130020), Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040), Ιαπωνική μουσμουλιά (0130050) Ροδακινιά - Νεκταρινιά (0140030), Δαμασκηινιά, Κορομηλιά (0140040), Βερικοκιά (0140010), Κερασιά, Αγριοκερασιά, Βυσσινιά, Κράνα (0140020) Ακτινιδιά (0162010) Καρυδιά (0120110), Καρυδιά Πεκάν (0120080), Αμυγδαλιά (0120010), Φουντουκιά (0120060), Φιστικιά (0120100), Καστανιά (0120040), Κουκουναριά (0120090)	7

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα :

- Viscosity test at a minimum of two shear rates should be provided.
- Τουλάχιστον δύο (2) πειράματα φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αμπελιού Σουλτανίνα ή Κορινθιακή σταφίδα.
- Τουλάχιστον δύο (2) πειράματα φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι ή Κοντούλα.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ