

FMC

AFFINITY®

Carfentrazone-ethyl 6% β/ο (Καρφεντραζόν-εθύλ)
Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)

Αποξηραντικό - Έλεγχος παραφυάδων

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστική ουσία: Carfentrazone-ethyl: 6% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες: 92,92% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:
8335 / 10.09.2025

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
Βλέπε συσκευασία

Κάτοχος της άδειας / Υπεύθυνος για
την τελική διάθεση στην αγορά:
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα,
ΤΗΛ.: 211 198 3903
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 455701000

Τα FMC, FMC logo και AFFINITY® είναι εμπορικά
σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2025 FMC Corporation. All rights reserved.

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο e

FMC

ΠΡΟΣΟΧΗ
UFI: RDAY-N20U-8N45-8N55



Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Παρεταταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακριμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε: ● **Πατάκια:** μια φυτική ζώνη αναστολής από τα επιφανειακά ύδατα 20 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%. ● **Αμπέλι:** μια αμπελοκήλη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 20 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%. ● **Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα και Ακτινίδια:** μια αμπελοκήλη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 20 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%. Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήνετε μια αμπελοκήλη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75%.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Πλυνθείτε με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας συμβουλευτεί σχετικά ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

11004195_22069160_GREECE



11004195_22069160_LBL_SL-F_1L_AFFINITY_GR_5_BOOKLET_2PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11004195	Base for Booklet	
Product SKU Description	AFFINITY_1L_GR_5	Booklet	244 x 130 mm
Label SKU	22069160	Number of pages (Booklet)	2 pages
Label SKU Description	LBL_SL-F_1L_AFFINITY_GR_5	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Αποξηραντικό για την αποξήρανση του υπέργειου μέρους της πατάτας πριν τη συγκομιδή και για τον έλεγχο των παραφυάδων επί της γραμμής της δένδροστοιχίας ή των πρέμνων στον αμπελώνα. Η δραστική ουσία του σκευάσματος (carfentrazone-ethyl) παρεμποδίζει το ένζυμο οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protochlorophyllide - oxidase, PPG - O ή PP - O), ενός βασικού ενζύμου για την βιοσύνθεση της πρώτο πορφυρίνης (protochlorophyllin) κατά την βιοσύνθεση της χλωροφύλλης. Απορροφάται από τα φύλλα, με περιορισμένη διασυστηματική κίνηση εντός του φυτού.

Φάσμα δράσης:

Πατάτα: Για την αποξήρανση στελεχών πριν τη συγκομιδή με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-60 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος κατά την έναρξη κιτρινίσματος των φύλλων (BBCH > 90). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα (σε ημέρες): 1.

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για την αποξήρανση παραφυάδων με δόση 90 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-30 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός σε παραφυάδες (ύψους 15-25 εκ.) κατά μήκος της γραμμής φύτευσης των πρέμνων, από την πλήρη έκπτυξη 3 ή περισσότερων φύλλων, μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει μέγεθος μπιζελιού (BBCH 13-75). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα (σε ημέρες): 1.

Καρυδιά, Καρυδιά Πεκάν, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά, Κουκουναριά: Για την αποξήρανση παραφυάδων με δόση 90 ή 45 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 15-50 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός κατά μήκος της δένδροστοιχίας σε παραφυάδες ύψους έως 15 εκ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα (σε ημέρες): 1 ή 2/15-60.

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουσμουλιά: Για την αποξήρανση παραφυάδων με δόση 90 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 25-30 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός κατά μήκος της δένδροστοιχίας σε παραφυάδες ύψους έως 15 εκ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα (σε ημέρες): 1.

Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Κερασιά: Για την αποξήρανση παραφυάδων με δόση 90 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 25-30 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός κατά μήκος της δένδροστοιχίας σε παραφυάδες ύψους έως 15 εκ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα (σε ημέρες): 1.

Ακτινιδιά: Για την αποξήρανση παραφυάδων με δόση 90 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 25-30 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός σε παραφυάδες (ύψους έως 15 εκ.) κατά μήκος της δένδροστοιχίας, από το στάδιο που ο καρπός έχει μέγεθος 10% μέχρι ο καρπός έχει μέγεθος 90% (BBCH 70-80). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα (σε ημέρες): 1.

Παρατηρήσεις: **1.** Η εφαρμογή για αποξήρανση παραφυάδων να γίνεται σε μη ξυλοποιημένες παραφυάδες. **2.** Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά. **3.** Η χρήση στην Κερασιά περιλαμβάνει την Αγριοκερασιά, τη Βυσσινιά και τα Κράνα. **4.** Η χρήση στη Δαμασκηνιά περιλαμβάνει την Κορομηλιά. **5.** Η χρήση στο Αχλάδι περιλαμβάνει το Ασιατικό Αχλάδι (Nashi). **6.** Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανάνα και στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι

αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

Τρόπος εφαρμογής: Αποξήρανση στελεχών πατάτας: καθολικός ψεκασμός φυλλώματος. Αποξήρανση παραφυάδων στις υπόλοιπες καλλιέργειες: κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δένδροστοιχίας ή των πρέμνων στον αμπελώνα. Εφαρμόζετε στις παραφυάδες χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το υπόλοιπο φυτό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση. Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά τα 2/3. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο υπό συνεχή ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά και με τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας, (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Αποφύγετε την επαφή των καρπών με το σκεύασμα. Αποφύγετε την επαφή των καρπών με έδαφος στο οποίο έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος. Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία carfentrazone-ethyl, η οποία ανήκει στην ομάδα 14 κατά HRAC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μετά από 60 μέρες και εφόσον προηγηθεί ελαφρύ όργωμα (2,5 εκ.) από την εφαρμογή του σκευάσματος μπορούν να σπαρούν ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλα, παντζάρια, μπιζέλια, αραβόσιτος, σιτάρι, κριθάρι και γκαζόν (πολυετής λόλιο).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα 3 ημέρες. Αμπέλι επιτραπέζιο, Αμπέλι οινοποιήσιμο, Μηλιά, Αχλαδιά, Ασιατικό αχλάδι (nashi), Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουσμουλιά, Ροδακινιά - Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Κορομηλιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Αγριοκερασιά, Βυσσινιά, Κράνα, Ακτινιδιά, Καρυδιά, Καρυδιά Πεκάν, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά, Κουκουναριά: 7 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

11004195_22069160_ LBL_SL-F_1L_AFFINITY_GR_5_BOOKLET_2PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11004195	Base for Booklet	
Product SKU Description	AFFINITY_1L_GR_5	Booklet	244 x 130 mm
Label SKU	22069160	Number of pages (Booklet)	2 pages
Label SKU Description	LBL_SL-F_1L_AFFINITY_GR_5	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	