



AVTAR®

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
prothioconazole (προθιοκοναζόλ) + Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
difenoconazole (ντιφενοκοναζόλ)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ασθενειών σε σιτάρι, κριθάρι και σίκαλη.

Εγγυημένη σύνθεση:
prothioconazole 25% β/ο + difenoconazole 13% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 65,9 % β/β

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 61213/15.09.2025

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:
ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κάτοχος της άδειας: Indofil Industries (Netherlands) B.V.
Jollemanhof 22, 1019 GW Amsterdam, Ολλανδία

Περιεχόμενο:
1 Λίτρο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα
Τηλ. 2111983903
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 455701000

FMC
Τα FMC και FMC logo είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2025 FMC Corporation. All rights reserved.

11016950_22069555_GREECE

ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: SWPU-VCPD-X00X-FFKA

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Δηλώσεις Προφύλαξης:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 40°C. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. «Η εφαρμογή να γίνεται με ψεκαστικό μηχάνημα φερόμενο από γεωργικό ελκυστήρα χρησιμοποιώντας ακροφυσία μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%». «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο». Για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων είναι απαραίτητη η χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείτε από τα επιφανειακά ύδατα μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, φαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας

11016950_22069555_LBL_ML-F_1L_AVATAR_GR_1_BOOKLET_2PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11016950	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_AVATAR_GR_1_BOOKLET_2PAGES	Booklet	280x145
Label SKU	22069555	Number of pages (Booklet)	2
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_AVATAR_GR_1_BOOKLET_2PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το AVTAR είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με βάση τις δραστικές ουσίες prothioconazole και difenoconazole και έχει ευρύ φάσμα δράσης εναντίον ασθενειών σε σιτάρι, κριθάρι και σίκαλη. Το prothioconazole και το difenoconazole είναι διασυστηματικά μυκητοκτόνα της ομάδας των DMIs και παρουσιάζουν προληπτική και θεραπευτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων. Σε βιοχημικό επίπεδο δρουν παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης η οποία είναι το κύριο συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών των μυκήτων. Συγκεκριμένα δρουν στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors- DMIs).

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Πεδίο εφαρμογής – στόχοι – δόσεις - χρόνος & τρόπος εφαρμογής):

Σιτάρι:

Για την καταπολέμηση της Σεπτορίωσης (*Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola*), της Καστανής σκωρίωσης (*Puccinia triticina*), της Φουζαρίωσης (*Fusarium sp.*) και της Πυρνηνοφόρας (*Drechslera tritici*) με δόση 60-70 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές από το τέλος του αδελφώματος μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/14.

Κριθάρι:

Για την καταπολέμηση της Ρυγχοσποριώσης (*Rhynchosporim secalis*), της Δικτυωτής κηλίδωσης (*Pyrenophora teres*) και της Φουζαρίωσης (*Fusarium sp.*) με δόση 60-70 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές από το τέλος του αδελφώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-61). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/14.

Σίκαλη:

Για την καταπολέμηση της Ρυγχοσποριώσης (*Rhynchosporim secalis*), της Καστανής σκωρίωσης (*Puccinia triticina*) και της Σεπτορίωσης (*Leptosphaeria syn. Septoria*) με δόση 60-70 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού: 10-40 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές από το τέλος του αδελφώματος μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/14.

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόστε την υψηλότερη δόση σε μεγαλύτερη πίεση προσβολής και σε συνθήκες ευνοϊκές για την ασθένεια. 2. Εφαρμόζεται προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών ή όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα. 3. Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει και τη χρήση στο τριτικάλε. 4. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη διαδικασία βυνοποίησης και ζυθοποίησης.

Οδηγίες Χρήσης:

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα:

Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας, (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες prothioconazole και difenoconazole οι οποίες ανήκουν στην ομάδα 3 κατά FRAC. Για περιορισμό του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται: ● Εναλλαγή ή χρήση σε μείγμα με μυκητοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης. ● Εφαρμογή κυρίως προληπτικά. ● Εφαρμογή στις συνιστώμενες δόσεις. ● Αποφυγή επαναλαμβανόμενης εφαρμογής του σκευάσματος στην ίδια καλλιέργεια, την ίδια καλλιεργητική περίοδο έναντι παθογόνων υψηλού κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Σιτάτι, Τριτικάλε, Σίκαλη, Κριθάρι: 44 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε χώρο με θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 40°C, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.