



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.10.2025
Αριθ. πρωτ.: 299419

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SERBOT (δ.ο. deltamethrin 2,5% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2023/1757 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιώνdeltamethrin.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

- στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (Α'91/14.06.2024)».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β'2339/14.05.2025).
5. Την αριθμ. 14658 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) GRIAL 2,5 EC (δ.ο. deltamethrin 2,5% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 5074/68737/14.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθμ. 293521/24.10.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **SERBOT (δ.ο. deltamethrin 2,5% β/ο)**, της εταιρείας **Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	14936
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης	31.10.2025
1.1.β Ημερομηνία λήξης	15.08.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:	SERBOT
1.2.β Μορφή:	Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	Deltamethrin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	98,5% (β/β) min
Χημική ομάδα:	Πυρεθρινοειδών
Παρασκευαστής:	MEGHMANI ORGANIC LIMITED “Meghmani House” Shree nivas society, Paldi, Ahmedabad – 380 007 Gujarat, Ινδία Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη την εταιρεία: MEGHMANI EUROPE BVBA Grote Steen Weg 42-44 2600 Berchem, Βέλγιο

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Meghmani Organics Limited

Plot No.402 to 404 & 452 to 454,
At Village: Chharodi –382170, Ta: Sanand,
Dist: Ahmedabad Gujarat – Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθμ. 4997/54242/30.04.13 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21 SI-2327 Rače, Σλοβενία
Edward Smith
Τηλέφωνο: +44 741 580 0193
E-mail: esmith@albaugh.eu

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

Λεωφόρος Συγγρού 348, Κτίριο Β, 17674,
Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 211 198 3903
E-mail: info.fmcgreece@fmc.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21 SI-2327 Rače, Σλοβενία
Edward Smith
Τηλέφωνο: +44 741 580 0193
E-mail: esmith@albaugh.eu

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

Ciudad de Sevilla, 53
Pol Ind. Fuente del Jarro
46988 Paterna (Valencia) Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

- 2. Albaugh TKI d.o.o.**
Grajski trg 21
SI-2327 Rače, Σλοβενία
- 3. BAC d.o.o.**
Grajski trg 21
SI-2327 Rače, Σλοβενία

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. INDUSTRIAS AFRASA, S.A.**
Ciudad de Sevilla, 53
Pol Ind. Fuente del Jarro
46988 Paterna (Valencia) Ισπανία
- 2. Albaugh TKI d.o.o.**
Grajski trg 21
SI-2327 Rače, Σλοβενία
- 3. BAC d.o.o.**
Grajski trg 21
SI-2327 Rače, Σλοβενία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Deltamethrin 2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,35% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 4997/54242/30.04.13 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	25 κ.εκ. - 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/ EVOH)
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	25 - 500 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/ EVOH) Κουτί χάρτινο
3	Δοχεία	2 - 20 λίτρων	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/ EVOH) ή COEX: HDPE+PA

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δοχείου, δυο (2) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ/ στρέμμα	Κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
<u>Εσπεριδοειδή</u> Πορτοκαλιά CIDSΙ	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	30 - 50	30 - 50	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβολών	1
Γκρέιπ-φρούτ CIDPA	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL	50	50	100		
Νεραντζιά CIDAU	Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA					
<u>Εσπεριδοειδή</u> Λεμονιά CIDLI	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	30	30	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14
Μανταρινιά CIDRE						
<u>Ακρόδρυα</u> Αμυγδαλιά PRNDU	Αφίδες <i>Hyalopterus</i> sp. HYALSP	42 - 50	30	140	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	
Φιστικιά PLAVE	Καρπόκαψα Καρυδιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO		50	100		
Φουντουκιά CYLAV						
Καρυδιά IUGRE	Καρπόκαψα Καστανιάς <i>Laspeyresia splendana</i> LASPSL					
Καστανιά CSNSA						
	Ευρύτομο <i>Eurytoma plotnicovi</i> EURTPL	50	50	100	Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων	

<u>Μηλοειδή</u> Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE	Καρπόκαψα <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO	30 - 50	30 - 50*	100 - 140	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14
	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO, <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL					
	Ψύλλα μηλιάς <i>Psylla mali</i> PSYLMA					
	Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE, <i>Archips rosanus</i> CACORO	35 - 50	35	100 - 140		
	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Psylla pyri</i> PSYLPI	50	50	100		
<u>Πυρηνόκαρπα</u> Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV Βυσσινιά PRNCE	Φυλλοδέτες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE, <i>Archips rosanus</i> CACORO	35 - 49	35	100 - 140	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβολών	1
	Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI					
	Ραγολέτιδα <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE	40 - 70	40 - 50			
	Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	50 - 70	50			
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE, <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE, <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR	30 - 70	35 - 50			
	Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς <i>Laspeyresia funebrana</i> LASPFU					

Αμπέλι ** VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	50 - 70	50 (1η γενεά) 50-70 (2η και 3η γενεά)	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 14
	Κογχυλίδα <i>Clysia ambiguella</i> CLYSAM	50 - 70	50 - 70			
	Τζιτζικάκι <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	50	50			
Ελιά (Επιτραπέζια και ελιές για παραγωγή λαδιού) OLVEU	Πυρηνотρήτης (ανθόβιας και καρπόβιας γενιά) <i>Prays oleae</i> PRAYOL	40	30 - 40	80 - 100	Εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας	1
	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL	50 - 70	50	100 - 140	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες	
	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL	50 - 70	50	100 - 140	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προβολής	
	Βαμβακάδα <i>Euphyllura olivine</i> EUPHSP	30 - 70	30 - 50	100 - 140		
Φράουλα (υπαίθρου) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Aphis ruborum</i> APHIRB, <i>Aulacorthum solani</i> AULASO, <i>Chaetosiphon</i> <i>fragaeifolii</i> CHTSFR, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP	50	30 - 50	30 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14
Φράουλα (θερμοκηπίου) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP	25 - 50	50	50 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 14
Κρεμμύδι ALLCE Πράσο ALLPO Σκόρδο ALLSA	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB	30 - 50	--	40 - 50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 14

Τομάτα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) LYPES Μελιτζάνα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> MACSEU, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i> HELIAR Άλτης <i>Chrysodeixis</i> <i>chalcites</i> PLUSCH Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG, <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI	50	30 - 50	30 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE	30 - 50	50	60 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 14
	Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i> NEZAVI	18 - 30	30	60 - 100		
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP	30 - 50	--	60 - 100		
Πιπεριά (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) CPSSS	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> SPODSP Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i> LPTNDE	30 - 50 (Υ) 30 - 70 (Θ)	50	60 - 100 (Υ) 60 - 140 (Θ)	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 14 (Υ) 4 / 7 (Θ)

	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Anuraphis cardui</i> BRDSCA, <i>Hyperomyzus</i> <i>lactucae</i> HYPELA					
	Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i> NEZAVI	18 – 30 (Υ) 18 – 42 (Θ)	30	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)		
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> TRIAVA	42 – 70 (Θ)	70 (Θ)	60 – 100 (Θ)		
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP	30 – 50 (Υ)	--	60 – 100 (Υ)		
Κολοκυθάκι (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) CUUPG	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa</i> <i>armigera</i> HELIAR Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI	50	30 - 50	30 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14
Αγγούρι, Αγγουράκι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) CUMSA	Αφίδες <i>(Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Hyperomyzus</i> <i>lactucae</i> HYPELA) Πράσινο σκουλήκι <i>(Helicoverpa</i> <i>armigera</i> HELIAR)	50	30 - 50	30 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14

	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE, <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYF					
Πεπόνι, (υπαίθρου & θερμοκηπίου) CUMME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI, <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE, <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYF	50	30 - 50	30 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14
Καρπούζι (υπαίθρου & θερμοκηπίου) CITLA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI, <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA	50	30 - 50	30 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14

Κουνουπίδι BRSOB Μπρόκολο BRSOK	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR, <i>Lipaphis erysimi</i> LIPAER, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR, <i>Pieris rapae</i> PIERRA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE, <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYF Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR, <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI, Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA	50	30 - 50	30 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14
Μαρούλι (Υπαίθρου) LACSA	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> SPODEX Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Αφίδες <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA, <i>Aphis sp.</i> APHISP, <i>Nasonovia ribis-nigri</i> NASORN	25 - 50	50	50 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 7

	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP	30 - 50	--	50 - 100		
Ρόκα DIPER	Αφίδες <i>Aphis sp.</i> APHISP	35	50	70	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> SPODEX					
	Μαμέστρα <i>Mamestra sp.</i> BARABR					
	Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH					
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP	30 - 50	--	70		
Μπιζέλια (αρακάς) φρέσκα PIBSX	Αφίδα των μπιζελιών <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON	25	-	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14
	Σιτόνα <i>Sitona sp.</i> SITNSP					
	Αφίδα των κουκιών <i>Aphis fabae</i> APHIFA	30 - 50	-			
	Κάμπια των μπιζελιών <i>Laspeyresia nigricana</i> LASPNI					
	Θρίπας <i>Thrips angusticeps</i> THRIAN					
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP					
<u>Ψυχανθή</u> (όσπρια)	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	30 - 50	--	50 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	2/14
Φακή LENCU						

Ρεβίθια CIEAR	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE, <i>Aphis sp.</i> APHISP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP					
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 14
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI	30 - 50	--	60		
Βαμβάκι GOSHI	Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i> PECTGO Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	50 - 70	--	30 - 50	Εφαρμογές με την εμφάνιση της προβολής	2 / 14
	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> BEMITB Τζιτζικάκια <i>Empoasca sp.</i> EMPOSP	50	--			
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> SPODSP Αφίδα <i>Aphis gossypii</i> APHIGO Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP	30 - 50	--			
Καπνός NIOTA	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB	30 - 50	--	50 - 100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	3 / 7

Παντζάρι BEAVV	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> ARHIFA, <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Μύγα των τεύτλων <i>Pegomya sp.</i> PEGOSP Άλτης <i>Chaetocnema tibialis</i> CHAETI Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> SPODSP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP	30 - 50	--	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβολών	1
	Κασσίδα <i>Cassida nebulosa</i> CASSNE	50	--	50		
Αραβόσιτος*** ZEAMX	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Σεζάμια <i>Sesamia nonagrioides</i> SESANO Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera sp.</i> SPODSP Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis sp.</i> AGROSP	30 - 50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών	3/14-21

	Διαβρώτικα <i>Diabrotica virgifera</i> DIABV	50				Για την Διαβρώτικα μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14
<u>Σιτηρά</u> Σιτάρι TRZAX Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESW Σίκαλη SECCE	Αφίδες <i>Rhopalosiphum</i> <i>padi</i> RHOPFI, <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30 - 50	--	40 - 60	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προβολών	1
Μηδική MEDVA	Αφίδα των μπιζελιών <i>Acyrtosiphon</i> <i>pisum</i> ACYRON Σκαθάρι των μπιζελιών <i>Apion pisi</i> APIOPI Φυτονόμος <i>Hypera postica</i> HYPRPO	25	--	40	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προβολών	2 / 14
Καλλωπιστικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) NNNZZ	Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUPE Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> THRITB	25 - 50	50	50 - 100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	3/7
	Φυλλοδέτες <i>Archips</i> sp. CACORO, <i>Adoxophyes</i> sp. ADXPSP, <i>Pandemis</i> sp. PANDSP	17.5 - 35	35			
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>) TRIAVA	50	70	70		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

* **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

*** Η εφαρμογή στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία deltamethrin, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
2. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
3. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται τις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
4. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
5. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
6. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:



GHS02



GHS05



GHS07



GHS08



GHS09

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα
P264: Πλύνετε τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή.»

«Σε περίπτωση επανεισόδου οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό.»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/συσκευασιών.

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian **αψέκαστη ζώνη προστασίας** από τα επιφανειακά ύδατα:

- 30 μέτρων, για τις δενδρώδεις καλλιέργειες
- 20 μέτρων, για αμπέλι και ελιά
- 30 μέτρων, με φυτική κάλυψη (φυτική ζώνη ανάσχεσης), σε τομάτα, μελιτζάνα, κολοκυνθοειδή, φράουλα.
- 20 μέτρων, που να συμπεριλαμβάνει 10 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75 %, σε Κουνουπίδι και Μπρόκολο
- 10 μέτρων για τις υπόλοιπες υπαίθριες καλλιέργειες

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μian **αψέκαστη ζώνη προστασίας** 10 μέτρων από μη γεωργική γη, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80%, σε δενδρώδεις καλλιέργειες ή κατά 60%, σε ελιά.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για εφαρμογές σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, για την προστασία των μελισσών να μην εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της άνθησης, όταν τα θερμοκήπια παραμένουν ανοικτά. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα και επικονιαστές όπως βομβίνοι κ.α. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων.

12

Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο:

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ένα γιατρό/Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777.

13

Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά
όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Φράουλα (0152000), Τομάτα (0231010), Μελιτζάνα (0231030), Πιπεριά (0231020), Αγγούρι (0232010), Αγγουράκι (0232020), Κολοκυθάκι (0232030), Πεπόνι (0233010), Καρπούζι (0233030), Ρόκα (0251060)	3
Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια) (0151010), Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια) (0151020), Ελιά (επιτραπέζιες ποικιλίες) (0161030), Ελιά (ελαιοποιήσιμες ποικιλίες) (0402010), Μηλιά (0130010),	7

Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040), Ροδακινιά (0140030), Νεκταρινιά (0140030-002), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040), Κερασιά (0140020), Βυσσινιά (0140020-006), Κρεμμύδι (0220020), Μαρούλι (0251020), Πράσο (0270060), Σκόρδο (0220010), Κουνουπίδι (0241020), Μπρόκολο (0241010), Φακές (όσπρια) (0300020), Ρεβίθια (όσπρια) (0300030-001), Μπιζέλια - Αρακάς (0260040), Πατάτα (0211000), Καπνός	
Μηδική	14
Πορτοκαλιά (0110020), Λεμονιά (0110030), Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπ-φρούτ (0110010), Νεραντζιά (0110020-002), Αμυγδαλιά (0120010), Φιστικιά (0120100), Φουντουκιά (0120060), Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040), Βαμβάκι (0401090), Παντζάρι (0213010), Αραβόσιτος (0500030), Σιτάρι (0500090), Κριθάρι (0500010), Βρώμη (0500050), Σίκαλη (0500070)	30
Καλλωπιστικά	Μη εφαρμόσιμο

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείστε το στην αρχική, απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα: -

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ