



Package MID : 280642 2602  
 Trade Name : BULLET 480SC  
 Country : GREECE  
 Nbre pages (19 p. max.) : 11 pages  
 Size : 200 x 58 mm  
 Artwork Type : 250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED  
 Specification : EU511-C  
 Printer : EMEA - CCL FRANCE  
 Packing Location : EMEA - CERNAY 2754

Ticket No : N/A  
 Date : 24-FEB-2026  
 Proof Cycle No : 2

COLOUR REFERENCES  
 Number of Coulours used : 4



Last updated by : PUBLI H


EU511-C

PAGES LIFT OPEN FROM RIGHT

PAGE 1 (Cover)

FOLDED END OF PAGE

OPEN END OF PAGE



2602

**MANDATORY REQUIREMENT:  
 THIS AREA MUST BE BLANK  
 (for 2D Data Matrix, Lot Nr.,  
 Manufacturing Date ...)**

**CORTEVA**  
**Bullet<sup>®</sup> 480SC**  
*Osobona<sup>®</sup> active*  
 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  
 Εγγενημένη σύνθεση: giproad 48 % β/β  
 εσθερβηλικός οξείας: 48,20 % β/β  
 ΠΥΚΝΟ ΕΝΔΙΟΡΜΑ (SC)  
 Δοσοδοτημένο εντομοκτόνο επαρχής και σταθμάου  
 UFI: 8TP2-70WU-U00E-FCH1  
 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ, ΦΥΛΑΞΙΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ  
 ΠΡΟΠΟΡΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
 ΑΑΔΑ: 14821/24/02/2023  
 Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
 CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
 Υδρούς 2 και Α. Καραγιάνης 280, 15202, Χαλάνδρι  
 Τηλ: +30 210 6969700  
 Διανομέας:  
**FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΕ**  
 ΑΕΔΟΡ Α. ΣΤΙΤΤΟΥ ΣΑΒ. Τ.Κ. 176 74 ΚΑΛΑΜΕΙΑ  
 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 455701000,  
 ΤΗΛ: 211 198 27687, 211 113 8614, www.finchellas.gr  
 Το FMC, FMC logo είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της, ©2024  
 FMC Corporation, All rights reserved.  
 \*\* Επιπλέον σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

Πολύ τοξικό για τους υβρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις.  
 Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one & 2-methylisothiazolo(3,2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
 Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.


**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μειώστε τη μυρωδιά, φοράτε ολοήμερη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμειξη / φέρνηση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επικοινωνίας στην καλλέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακροχρόνιο προστατευτικό και μακριά παντοφύλι και μπότες. Διάθεση του περιεχομένου / περίσπασμα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΕΣ:**  
 Γενικές πληροφορίες: Μην έχετε υγρά και μη προκαλείτε εμπόδιο εάν ο ασθενής έχει σπασμούς ή έχει αναπνευστικό πρόβλημα. Σε περίπτωση κατάσπασης: Μην προκαλείτε εμπόδιο. Καθαρίστε ορισμένο νερό και δείξτε του την εστίαση για να μην προκαλέσει ή όχι εμπόδιο να ληφθεί από το γαστρίο.  
 Σε περίπτωση επαρχής με το μάτι: Σπλύνετε ορισμένο με καθαρό νερό. Σχετίστε επαρκή σουβούλι.  
 Σε περίπτωση επαρχής με το δέρμα: Πλύνετε ορισμένο με καθαρό νερό και σαπούνι.  
 Σε περίπτωση επαρχής: Μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γαστρίο.  
 Αντιδοτόν: Δεν έχει καταγραφεί. Ανακοινώστε συμπτωματολογία διερχομένης.  
**ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ:** 210-7287777  
 Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): 2105714417

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να απομακρυνθεί ή ριπώνεται μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις πόλεμους επικοινωνίες και τους δρόμους).  
 Για να προστατέψετε τους υβρόβιους οργανισμούς να αρχίσετε με ζώνη προστασίας 20 μέτρων για τις δένδρους καλλέργειες και 15 μέτρων για τις υλοκαλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.  
 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχευσης να αρχίσετε μια ασφαλή ζώνη προστασίας 3 μέτρων από μη γεωργική γη.  
 Επιστρέψτε για τις μάλασσες.  
 Για να προστατέψετε τις μάλασσες και άλλα έντομα επικοινωνίας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μάλασσες αλλάζουν γνήσι. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κοιλίες κατά τη χρήση του προϊόντος και στη 1 ώρα μετά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζώων. Απομακρύνετε τα ζώα πριν από την ανθοφορία.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 κ.εκ e

Fonts: Arial, normal, italic, bold  
 Gilroy Extrabold  
 Font size min ↓ 3 pt





Package MID : 280642 2602  
Trade Name : BULLET 480SC  
Country : GREECE  
Nbre pages (19 p. max.) : 11 pages  
Size : 170 x 58 mm  
Artwork Type : 250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED  
Specification : EU511-C  
Printer : EMEA - CCL FRANCE  
Packing Location : EMEA - CERNAY 2754

Ticket No : N/A  
Date : 24-FEB-2026  
Proof Cycle No : 2

COLOUR REFERENCES  
Number of Coulours used : 1

Noir

Last updated by : PUBLI H

PAGE 2 (Rear cover)

FOLDED END OF PAGE

58 mm

170 mm  
157 mm  
5 mm  
8 mm

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ**

Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Πατάτα, Σμέουρο, Βατόμουρο, Μύρτιλλο, Φιστικιά, Γλυκοπατάτα: 7 ημέρες  
Αχλαδιά (εφαρμογές για καταπολέμηση της Ψύλλας), Αμπέλι: 14 ημέρες  
Φράουλα: 1 ημέρα

Τομάτα (Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Σπανάκι, Ρόκα, Μαρούλι: 3 ημέρες  
Βαμβάκι: 21 ημέρες  
Φοινικοειδή: -

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

**Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά):** Για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας των μήλων (*Cydia pomonella*) και της Νάρκης των γιγαντοκάρπων (*Lithocolletis blancardella*). Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προεπιδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. Δόση: 20-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-125 λίτρα/στρ. Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 3.

**Αχλαδιά\*\*:** Για την καταπολέμηση της Ψύλλας της αχλαδιάς (*Cacopsylla gylt*). Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προεπιδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. Δόση: 30-35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-125 λίτρα/στρέμμα. Μεγ. αριθ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3.

Non-printed area on page 2 ONLY (on the back of «Label A-code + Barcode area»)


Non-printed area on page 2 ONLY (on the back of 2D code area printed on the front page)

OPEN END OF PAGE

5 mm

4 mm




Package MID :	280642 2602
Trade Name :	BULLET 480SC
Country :	GREECE
Nbre pages (19 p. max.) :	11 pages
Size :	170 x 58 mm
Artwork Type :	250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED
Specification :	EU511-C
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - CERNAY 2754
Ticket No :	N/A
Date :	24-FEB-2026
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	1
	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 3

FOLDED END OF PAGE

58 mm






Package MID :	280642 2602
Trade Name :	BULLET 480SC
Country :	GREECE
Nbre pages (19 p. max.) :	11 pages
Size :	170 x 58 mm
Artwork Type :	250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED
Specification :	EU511-C
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - CERNAY 2754
Ticket No :	N/A
Date :	24-FEB-2026
Proof Cycle No :	2
<b>COLOUR REFERENCES</b>	
Number of Coulours used :	1
<b>Noir</b>	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 4

FOLDED END OF PAGE

58 mm



5 mm

OPEN END OF PAGE

4 mm



Package MID :	280642 2602
Trade Name :	BULLET 480SC
Country :	GREECE
Nbre pages (19 p. max.) :	11 pages
Size :	170 x 58 mm
Artwork Type :	250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED
Specification :	EU511-C
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - CERNAY 2754
Ticket No :	N/A
Date :	24-FEB-2026
Proof Cycle No :	2
<b>COLOUR REFERENCES</b>	
Number of Couloirs used :	1
<b>Noir</b>	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 5

FOLDED END OF PAGE

58 mm



EU511-C

170 mm

157 mm

8 mm

5 mm

5 mm

OPEN END OF PAGE

4 mm

BULLET 480SC 0.25L BKL GR 280642 2602.indd 5

27/02/2026 15:04

**Πατάτα:** Για την καταπολέμηση του δορυφόρου (*Leptinotarsa decemlineata*). Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. Δόση: 5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγ. αριθ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3.

**Φιστικιά (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Για την καταπολέμηση της Ψύλλας της Φιστικιάς (*Agonoscepa* sp.). Ψεκάσμοι καλύψεως με την εμφάνιση ωών και νυμφών στα φύλλα. Μεσοδιαστήματα 14-21 ημέρες. Έως 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγ. αριθ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3.

**Σπανάκι (Υ) (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Για την καταπολέμηση του κοινού Θρίπα (*Thrips tabaci*) και του Θρίπα της Καλιφόρνιας (*Frankliniella occidentalis*). Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. Δόση: 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγ. αριθ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3.

**Ρόκα (Υ) (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Για την καταπολέμηση του Θρίπα της Καλιφόρνιας (*Frankliniella occidentalis*). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Δόση: 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγ. αριθ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 3.

**Φοινικοειδή (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Για την καταπολέμηση του εντόμου *Paysandisia archon*. Εφαρμογή στα μέγιστο των πιέσεων του εντόμου και πριν την εγκατάσταση της προσβολής. Επανάληψη μετά από 15 ημέρες εφ' όσον συνεχίζονται συλλήψεις του εντόμου. Ο ψεκάσμος πρέπει να κατευθύνεται στη στεφάνη / κορυφαίο τμήμα του κορμού (0,5 έως 1 μέτρο από την κορυφαία περιοχή), που είναι η προτιμώμενη περιοχή αναπαραγωγής του θηλυκού και όχι σε ολόκληρο το δένδρο. Δόση: 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 40-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγ. αριθ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2.

**Μικροί καρποί (Θ), Βατόμουρο, Σμέουρο, Μύρτιλλο (Χρήσεις ήσσονος σημασίας):** Για την καταπολέμηση του εντόμου *Drosophila suzukii*. Ψεκάσμοι φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγ. αριθ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2.

**Μαρούλι (Υ) (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Για την καταπολέμηση Προνυμφών Λεπιδόπτερου (*Heliothis armigera*). Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. Δόση: 20-25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγ. αριθ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2.

Package MID : 280642 2602  
 Trade Name : BULLET 480SC  
 Country : GREECE  
 Nbre pages (19 p. max.) : 11 pages  
 Size : 170 x 58 mm  
 Artwork Type : 250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED  
 Specification : EU511-C  
 Printer : EMEA - CCL FRANCE  
 Packing Location : EMEA - CERNAY 2754

Ticket No : N/A  
 Date : 24-FEB-2026  
 Proof Cycle No : 2


COLOUR REFERENCES  
 Number of Coulours used : 1

Noir

Last updated by : PUBLI H

PAGE 6

FOLDED END OF PAGE






Package MID :	280642 2602
Trade Name :	BULLET 480SC
Country :	GREECE
Nbre pages (19 p. max.) :	11 pages
Size :	170 x 58 mm
Artwork Type :	250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED
Specification :	EU511-C
Printer :	EMEA - CCL FRANCE
Packing Location :	EMEA - CERNAY 2754
Ticket No :	N/A
Date :	24-FEB-2026
Proof Cycle No :	2
<b>COLOUR REFERENCES</b>	
Number of Coulours used :	1
<b>Noir</b>	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 7

FOLDED END OF PAGE

58 mm



το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε το ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους. Ξεπλύνετε άλλες δύο (2) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Το sripinosad είναι δισυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση εντόμων των τάξεων Lepidoptera, Diptera, Siphonaptera, Thysanoptera, και κάποια Coleoptera σε διάφορες καλλιέργειες και δευτερευόντως για μυζητικά έντομα και ακάρεα. Το sripinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης και προκαλεί παρατεταμένη ενεργοποίησή τους, εξαιτίας της οποίας το έντομο παραλύει λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ****Διαχείριση ανθεκτικότητας**

- Εφαρμογή μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων στόχων σε χαμηλά επίπεδα.

- Επεμβάσεις με BULLET 480 SC νωρίς, όταν ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων είναι σε χαμηλά επίπεδα.
- Πλήρη κάλυψη των φυτών (φύλλα, καρποί) με το ψεκαστικό υγρό.
- Εφαρμογή των εγκεκριμένων δόσεων και όχι μικρότερων.
- Έως δύο (2) εφαρμογές ανά γενεά του κάθε εντόμου-στόχου και εναλλαγή για την επόμενη γενεά με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

**Προφυλάξεις για ασφαλή χρήση του BULLET 480 SC σε θερμοκλίμα:**

- Έκθεση των βομβινών, παρασιτοειδών ημενοπτέρων και αρπακτικών εντόμων και ακάρεων σε απευθείας ψεκασμό με BULLET 480 SC μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.
- Να μη γίνεται εξαπόλυση βομβινών για 24 ώρες μετά την εφαρμογή καθώς επίσης παρασιτοειδών και αρπακτικών εντόμων και ακάρεων για 1-2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες χρήσεις όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην επικέτα.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ**

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο.

OPEN END OF PAGE



**Package MID :** 280642 2602  
**Trade Name :** BULLET 480SC  
**Country :** GREECE  
**Nbre pages (19 p. max.) :** 11 pages  
**Size :** 170 x 58 mm  
**Artwork Type :** 250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED  
**Specification :** EU511-C  
**Printer :** EMEA - CCL FRANCE  
**Packing Location :** EMEA - CERNAY 2754

**Ticket No :** N/A  
**Date :** 24-FEB-2026  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
**Number of Coulours used :** 1

Noir

**Last updated by :** PUBLI H

EU511-C

PAGE 8

FOLDED END OF PAGE



OPEN END OF PAGE



**Package MID :** 280642 2602  
**Trade Name :** BULLET 480SC  
**Country :** GREECE  
**Nbre pages (19 p. max.) :** 11 pages  
**Size :** 170 x 58 mm  
**Artwork Type :** 250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED  
**Specification :** EU511-C  
**Printer :** EMEA - CCL FRANCE  
**Packing Location :** EMEA - CERNAY 2754

**Ticket No :** N/A  
**Date :** 24-FEB-2026  
**Proof Cycle No :** 2

**COLOUR REFERENCES**  
**Number of Coulours used :** 1

Noir

**Last updated by :** PUBLI H

EU511-C

PAGE 9

FOLDED END OF PAGE

OPEN END OF PAGE





**Package MID :** 280642 2602  
**Trade Name :** BULLET 480SC  
**Country :** GREECE  
**Nbre pages (19 p. max.) :** 11 pages  
**Size :** 170 x 58 mm  
**Artwork Type :** 250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED  
**Specification :** EU511-C  
**Printer :** EMEA - CCL FRANCE  
**Packing Location :** EMEA - CERNAY 2754

**Ticket No :** N/A  
**Date :** 24-FEB-2026  
**Proof Cycle No :** 2

**COLOUR REFERENCES**  
**Number of Coulours used :** 1

Noir

**Last updated by :** PUBLI H

EU511-C

PAGE 10

FOLDED END OF PAGE

OPEN END OF PAGE





Package MID : 280642 2602  
 Trade Name : BULLET 480SC  
 Country : GREECE  
 Nbre pages (19 p. max.) : 11 pages  
 Size : 170 x 58 mm  
 Artwork Type : 250ML BOOKLET / LEAFLET FOLDED  
 Specification : EU511-C  
 Printer : EMEA - CCL FRANCE  
 Packing Location : EMEA - CERNAY 2754

Ticket No : N/A  
 Date : 24-FEB-2026  
 Proof Cycle No : 2

COLOUR REFERENCES  
 Number of Colours used : 4



Last updated by : PUBLI H

EU511-C

PAGE 11 (Repeat page)

FOLDED END OF PAGE

58 mm

170 mm

157 mm

8 mm

5 mm

5 mm

OPEN END OF PAGE

2 8 0 6 4 2

2602

**CORTEVA**  
**Bullet** 480SC  
 Galcovad active  
 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Εγγυημένη σύνθεση: εσφρασά 48 % β/β  
 Βοηθητικές ουσίες: 48,20 % β/β  
**ΠΥΚΝΟ ΕΝΔΟΡΗΜΑ (SC)**  
 Δοσολογητικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

UFI: 8TR2-70WU-100E-FCH1  
**ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΞΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ**  
**ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΑΑΔΑ: 1482/Υ/24/02/2023  
 Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
 CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
 Υδράς 2 και Α, Κηφισός 280, 15232, Χαλάνδρι  
 Τηλ: +30 210 8689700

Διανομέας:  
**FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΕ**  
 LEGSO: Α. ΣΥΓΓΡΟΥ 348, Τ.Κ. 176 74 ΚΑΛΑΝΟΕΑ,  
 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 455701000,  
 ΤΗΛ: 211 198 2768/Γ: 211 113 8614, www.finchellas.gr  
 Το FMC, FMC logo είναι εμπορικό σήμα της FMC Corporation και θεωρούνται της ©2025  
 FMC Corporation. All rights reserved.  
 \*\* Εμπιστευτικό σήμα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

**FMC**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 κ.εκ. e

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
 Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one & 2-methylisothiazol(2H)- one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μολύνετε τη γεινιά ποσότητα. Φοράτε ολοκληρωμένη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάγνξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επικινδυνότητας στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μαρμαρινό παντεφύκι και μακρύ παντόφλι και μπότες. Διάβαστε του παραρτήματος / περίληψη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**ΠΡΟΤΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**  
 Γενικές πληροφορίες: Μην δίνετε υγρό και μη προκαλείτε εμπόδι εάν ο ασθενής έχει σπασμούς ή είναι αναίσθητος.  
 Σε περίπτωση κατάπτωσης: Μην προκαλείτε εμπόδι. Καλέστε αμέσως γιατρό και βρείτε τον ηρώα. Η απόφαση για το εάν προκληθεί ή όχι εμπόδι θα ληφθεί από το γιατρό.  
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Σεπάρωνε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.  
 Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Διευκολύνετε τη γαστρά.  
 Αντιδοτό: Δεν έχει καθοριστεί. Ανακοινώστε ερευνηματική βοήθεια.  
 ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΓΗΓΡΑΞΕΩΝ: 210-7703777  
 Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): 2105714417

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.** (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να απορριφθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λυόμενες επιφανείες και τους δρόμους).  
 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 20 μέτρων για τις δεινδροβίους καλλιέργειες και 15 μέτρων για τις υπόλοιπες καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.  
 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόμαχο να αφήσετε μια ζώνη προστασίας 3 μέτρων από μη γεωργική γη.  
 Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνων μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυλιές κατά τη χρήση του προϊόντος και επί 1 μέρα μετά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζυζυγκίων. Απομακρύνετε τα ζώα πριν από την ανθοφορία.

BULLET 480SC 0.25L BKL GR 280642 2602.indd 11

27/02/2026 15:04