

FMC

EXIREL® 10 SE

Cyantraniliprole

(Σιαντρανιλιπρόλ)

10 % β/ο

Powered by
Cyazypyr®
active

Ομάδα 28 Εντομοκτόνο

ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ΑΙΩΡΗΜΑ (SE)

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 14883/10.10.2024

Εγγυημένη σύνθεση: Cyantraniliprole 10 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 89,15 % β/β

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες
Κάτοχος της άδειας / Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ, Α. Συγγρού 348, Τ.Κ: 17674
Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903

ΑΡ.ΓΕΜΗ:455701000

Αρ. παρτίδας/Ημ. Παραγωγής: Βλέπε συσκευασία

Τα FMC, FMC logo και Exirel® 10 SE είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation
ή και θυγατρικών της. ©2024 FMC Corporation. All rights reserved.

Περιεχόμενο: **1 Λίτρο e**

FMC

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιέχει 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one.

Δηλώσεις Προφύλαξης:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε μακρυμανικό πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια». Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Στα εσπεριδοειδή με πυκνή φύτευση, δεν επιτρέπεται η χρήση ψεκαστικών μέσων χειρός και επινώτιου ψεκαστήρα, για να αποφευχθεί η επαφή των χειριστών με τη ψεκαζόμενη καλλιέργεια».

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή την συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρώτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, το προϊόν να εφαρμόζεται κάθε τρία χρόνια για τα εσπεριδοειδή, την ελιά, το αμπέλι την κερασιά και τη ροδακινιά.

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, εφαρμόστε το προϊόν αυτό ή οποιοδήποτε άλλο, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία cyantraniliprole, κάθε τρία έτη στον ίδιο αγρό για τη δόση 40 κ.εκ/στρ. για τον αραβόσιτο ή κάθε τέσσερα έτη στον ίδιο αγρό για τη δόση 50 κ.εκ/στρ. για τον αραβόσιτο.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα εσπεριδοειδή, την ελιά, την κερασιά, ροδακινιά και για τη δόση 50 κ.εκ/στρ. για τον αραβόσιτο.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια αιψέκαστη ζώνη προστασίας:


- 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 95% ή 10 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% για τα εσπεριδοειδή, την κερασιά και τη ροδακινιά.
- 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων

μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 95% για την ελιά.

- 10 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% ή 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% για την καλλιέργεια του αμπελιού.
- 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% για τη δόση 50 κ.εκ/ στρ. για τον αραβόσιτο.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε ανείσθητο άτομο.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Πλυθείτε με άφθονο νερό λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής.
Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας συμβουλευτεί σχετικά ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11000155	Base for Booklet	
Product SKU Description	EXIREL 10SE_1L_GR	Booklet	235/230 x 130 mm
Label SKU	22072564	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_EXIREL 10SE_GR_5	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22071222	Preprinted Material	

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος στα εσπεριδοειδή και την ελιά. Στο αμπέλι ο ψεκασμός να γίνεται στη ζώνη των τοσαμπιών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση. Το σκεύασμα είναι ευδιάλυτο στο νερό και δεν απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Γεμίστε το βυτίο με νερό ως τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Διαλύστε καλά με ανάδευση και απογεμίστε το βυτίο. Διενεργήστε τον ψεκασμό υπό ανάδευση. Εάν το τελικό ψεκαστικό διάλυμα έχει pH >8 προσθέστε ρυθμιστή pH ώστε το pH να είναι στο 7 ή μικρότερο ή χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό διάλυμα εντός 4 ωρών. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Για τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό ψεκαστικών μέσων ή αμμωνία. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το προϊόν είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών. Ανάλογα με τον εχθρό μπορεί να έχει ακμαιοκτόνο, προνυμφοκτόνο και ωοκτόνο δράση. Πρόκειται για διασυστηματικό εντομοκτόνο με αποπλαστική και διελασματική κίνηση. Εφαρμοζόμενο στο φύλλωμα μειώνει άμεσα τις προσβολές των εντόμων και έμμεσα τη μετάδοση ασθενειών από τα έντομα. Περιέχει την δραστική ουσία cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχών ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση, ταχεία παύση της διατροφής του εντόμου (αντιτροφική δράση) και ακολούθως θανάτωση των εντόμων- στόχων.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην ομάδα 28 κατά IRAC. Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει 2 ώρες μετά τον ψεκασμό.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν να εφαρμόζεται με εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Φάσμα δράσης:

Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Πράσινα λεμόνια (lime).

Εναντίον του Λεπιδοπτέρου (*Prays citri*) με δόση 25-50 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-200. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από την έκπτυξη των βλαστών έως πριν την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 31-50). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Εναντίον του Λεπιδοπτέρου (*Phyllocnistis citrella*) με δόση 40-74 κ.εκ/ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 30-185. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την έκπτυξη των βλαστών έως πριν την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 31-50). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Εναντίον των Αφίδων (*Aphis spiraecola*, *Aphis gossypii*) με δόση 74 κ.εκ/ στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 74-99. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από το στάδιο όπου είναι ορατές οι κορυφές των φύλλων στους οφθαλμούς έως την πλήρη ανάπτυξη των βλαστών (BBCH 09-39). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Εναντίον του Θρίπα (*Pezothrips kellyanus*) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας για Αλευρώδη** (*Parabemisia myricae*), Ψύλλα των εσπεριδοειδών** (*Trioza erytrae*), Μαύρο ακανθώδη αλευρώδη** (*Aleurocanthus spiniferus*) με δόση 74 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 74-99. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών έως την καρπόδεση (BBCH 51-71). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Εναντίον του Δίπτερου (*Ceratitis capitata*) με δόση 74 κ.εκ/στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 74-99. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την καρπόδεση (οι καρποί έχουν αποκτήσει το 40% του μεγέθους) έως και την έναρξη του χρωματισμού των καρπών (BBCH 74-82). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Εναντίον του Αλευρώδη (*Aleurothrix floccosus*, *Dialeurodes citri*) με δόση 74 κ.εκ/στρέμμα.



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11000155	Base for Booklet	
Product SKU Description	EXIREL 10SE_1L_GR	Booklet	235/230 x 130 mm
Label SKU	22072564	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_EXIREL 10SE_GR_5	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22071222	Preprinted Material	

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 74-200. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την καρπόδεση (BBCH 51-72). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Ελιά: Εναντίον του Λεπιδοπτέρου (*Prays oleae*) με δόση 20-35 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 70-175. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από το στάδιο όπου οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι ακόμα κλειστοί έως την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 50-81). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά τρία χρόνια (με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες).

Αμπέλι οινοποιήσιμο: Εναντίον του Λεπιδοπτέρου (*Lobesia botrana*) με δόση 34 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 57-68. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός στην ζώνη των τσαμπιών στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από την καρπόδεση (οι νεαροί καρποί αρχίζουν να διογκώνονται, τα υπολείμματα των λουλουδιών χάνονται) μέχρι το μαλάκωμα των ρωγών (BBCH 71-85). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Κερασιά* (Χρήση ήσσονος σημασίας): Εναντίον της Δροσόφιλα (*Drosophila suzukii*) και της ραγολέτιδας (*Rhagoletis cerasi*) με δόση 74 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 74-99. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Από το στάδιο όπου ο καρπός έχει αποκτήσει το 90% του μεγέθους του έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 79-87). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Ροδακινιά: Για χρήση ήσσονος σημασίας: Εναντίον της Δροσόφιλα* (*Drosophila suzukii*) με δόση 74 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): 74-99. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Από το τέλος της άνθησης έως την ωρίμανση των καρπών. BBCH 69-87. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 ανά τρία χρόνια.

Αραβόσιτος (και για ενσίρωση): Εναντίον της Οστρίνιας (*Ostrinia nubilalis*) και της Σεσάμιας (*Sesamia sp.*) με δόση 40 κ.εκ./στρέμμα ή με δόση 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-80 (λίτρα/στρέμμα). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μία εφαρμογή: Από το πρώιμο στάδιο εκκίνησης (το περίβλημα των φύλλων της σημαίας επεκτείνεται) έως το τέλος της κεφαλής (ταξιανθία πλήρως ανεπτυγμένη) BBCH 40-59 ή Από την υδαρή ωρίμανση (οι πρώτοι κόκκοι έχουν φτάσει στο μισό του τελικού τους μεγέθους) έως την αρχή της ωρίμανσης BBCH 71-83. Μέγιστος αριθμός ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή ανά τρία χρόνια εάν χρησιμοποιηθεί η δόση των 40 κ.εκ./στρέμμα ή εναλλακτικά 1 εφαρμογή ανά τέσσερα χρόνια εάν χρησιμοποιηθεί η δόση των 50 κ.εκ./στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

1. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό καταπόνηση.
2. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τη φράπα.
3. Η χρήση στη πορτοκαλιά περιλαμβάνει και το περγαμόντο, τη νεραντζιά και το σαγκουίνι.
4. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει και το κιτρολέμονο.
5. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει και τις κλημεντίνες, τη σατσούμα και τις ταγγερίνες.
6. Για τον αραβόσιτο: Η συνολική δόση ανά τέσσερα χρόνια ή η μέγιστη δόση να είναι 50 κ.εκ./στρ.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της ροδακινιάς και της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του αλευρώδη, της ψύλλας των εσπεριδοειδών και του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11000155	Base for Booklet	
Product SKU Description	EXIREL 10SE_1L_GR	Booklet	235/230 x 130 mm
Label SKU	22072564	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_EXIREL 10SE_GR_5	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22071222	Preprinted Material	

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **Περιέχει 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one.**

Δηλώσεις Προφύλαξης:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε μακρυμανικό πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια». Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Στα εσπεριδοειδή με πυκνή φύτευση, δεν επιτρέπεται η χρήση ψεκαστικών μέσων χειρός και επινώτιου ψεκαστήρα, για να αποφευχθεί η επαφή των χειριστών με τη ψεκαζόμενη καλλιέργεια».

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή την συσκευασία του. (Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, το προϊόν να εφαρμόζεται κάθε τρία χρόνια για τα εσπεριδοειδή, την ελιά, το αμπέλι την κερασιά και τη ροδακινιά.

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, εφαρμόστε το προϊόν αυτό ή οποιοδήποτε άλλο, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία cyantraniliprole, κάθε τρία έτη στον ίδιο αγρό για τη δόση 40 κ.εκ/στρ. για τον αραβόσιτο ή κάθε τέσσερα έτη στον ίδιο αγρό για τη δόση 50 κ.εκ/στρ. για τον αραβόσιτο.

Για την προστασία των **υδρόβιων οργανισμών**, να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα **εσπεριδοειδή**, την **ελιά**, την **κερασιά**, **ροδακινιά** και για τη δόση 50 κ.εκ/στρ. για τον **αραβόσιτο**.

Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας:

- 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 95% ή 10 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% **για τα εσπεριδοειδή, την κερασιά και τη ροδακινιά.**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυσσωρευτικές χρήσεις: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Πράσινα λεμόνια-lime, Φράπα, Περغامόνο, Νεραντζιά, Σαγκουίνι, Κιτρολέμονο, Κλημεντίνες, Σατσούμα, Ταγγερίνες, Κερασιά, Ροδακινιά: 7 ημέρες. Ελιά: 14 ημέρες. Αμπέλι (οινοποιήσιμο): 10 ημέρες. Αραβόσιτος: 21 ημέρες.

- 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 95% **για την ελιά.**
- 10 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% ή 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% **για την καλλιέργεια του αμπελιού.**
- 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% για τη δόση 50 κ.εκ/ στρ. για τον αραβόσιτο.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε το δοχείο ή την ετικέτα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλυνθείτε με άφθονο νερό λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Αν τα συμπτώματα επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέσετε εμετό εκτός αν σας συμβουλευθεί σχετικά ο γιατρός ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Τα FMC, FMC logo και Exirel® 10 SE είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της. ©2024 FMC Corporation. All rights reserved.

UFI: 325X-J21W-PN4U-F7PG



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11000155	Base for Booklet	
Product SKU Description	EXIREL 10SE_1L_GR	Booklet	235/230 x 130 mm
Label SKU	22072564	Number of pages (Booklet)	4 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_EXIREL 10SE_GR_5	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22071222	Preprinted Material	