

Φάσμα εφαρμογής - Δόσεις:

Διαφυλλική εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε τη γενική δοσολογία: **100 - 200 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος**, ανάλογα με το στάδιο της καλλιέργειας:

- **ΑΚΡΟΔΡΥΑ:** α) Στην αρχή της βλάστησης, β) πριν την άνθηση και γ) μετά την καρπόδεση.
- **ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ:** α) Στην αρχή της βλάστησης, β) πριν την άνθηση και γ) μετά την καρπόδεση.
- **ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ:** α) Πριν την άνθηση, β) στο κλείσιμο της σταφυλής, γ) στο γέμισμα του βότρου.
- **ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ:** α) στο γέμισμα του βότρου και β) μετά το γυάλισμα των σταφυλιών για αύξηση των Brix (σε συνδυασμό με σάκχαρο).
- **ΒΑΜΒΑΚΙ:** α) Στην εμφάνιση των χτενιών, β) στην αρχή της άνθησης και γ) στην ωρίμανση των καρυδιών.
- **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ:** α) Μετά τη μεταφύτευση, ή σε ύψος 15-20 εκ., β) στο σχηματισμό ταξιανθιών και ταξικαρπιών και γ) μετά την αλλαγή του χρώματος για αύξηση των Brix (σε συνδυασμό με σάκχαρο).
- **ΕΛΙΑ:** α) Πριν την άνθηση, β) όταν ο καρπός έχει μέγεθος «φακής» και γ) στην αλλαγή του χρώματος.
- **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:** α) Πριν την άνθηση, β) μετά την καρπόδεση (μέγεθος «μπιζελιού») και γ) όταν ο καρπός έχει διάμετρο περίπου 6-7 εκ.
- **ΗΛΙΑΝΘΟΣ:** α) Στις αρχές της ανάπτυξης του φυλλώματος, από το στάδιο των 8-10 φύλλων και β) μετά από 15 μέρες.
- **ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ:** α) Όταν τα φυτά φτάσουν σε ύψος 20-25 εκ. και β) πριν την ανθοφορία.
- **ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:** α) Μετά τη μεταφύτευση, ή σε ύψος 15-20 εκ. και β) στο σχηματισμό ταξιανθιών και ταξικαρπιών.
- **ΜΗΛΟΕΙΔΗ:** α) Πριν την άνθηση, β) από την πτώση των πετάλων ως το καρπίδιο και γ) στην αύξηση του καρπού.
- **ΠΑΤΑΤΑ:** α) Όταν το φυτό έχει 5-6 φύλλα, β) στην αρχή της κονδυλοποίησης, (περίπου 2 μήνες από τη φύτευση και γ) 15-20 ημέρες μετά.
- **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** α) Πριν την άνθηση, β) από την πτώση των πετάλων ως το καρπίδιο και γ) στην αύξηση του καρπού.
- **ΣΙΤΗΡΑ:** Στο στάδιο του «ξεσταχυάσματος», (μέσα Απριλίου κ ύστερα - μπορεί να συνδυαστεί ενδεχομένως με μυκητοκτόνα), για αύξηση περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη.
- **ΤΡΙΦΥΛΛΙ:** Μετά από κάθε κοπή.
- **ΟΣΠΡΙΑ:** 2-3 εφαρμογές κάθε 15-20 μέρες, ξεκινώντας από την αρχή της βλαστικής ανάπτυξης και εν συνεχεία κατά την διάρκεια κρίσιμων σταδίων όπως, πριν την ανθοφορία και μετά τον σχηματισμό λοβών.
- **ΦΡΑΟΥΛΑ:** α) Μετά τη μεταφύτευση, β) στην αρχή της νέας βλάστησης, γ) 15 ημέρες πριν την άνθηση, δ) ακριβώς μετά την καρπόδεση και ε) στην αύξηση μεγέθους του καρπού.
- **ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ:** α) πριν την ανθοφορία για την ενίσχυση της γονιμοποίησης και καρπόδεσης και β) μετά την καρπόδεση για αύξηση μεγέθους και ποιότητας καρπού.

Εφαρμογή στο έδαφος: Εφαρμόστε **300-400 κ. εκ. / στρ. ανά εφαρμογή**, ανάλογα με το στάδιο της καλλιέργειας, (3-4 εφαρμογές), στο σύστημα άρδευσης, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αυξημένες

NUVOLA® AMIN

ενεργειακές ανάγκες από το φυτό ή συνθήκες αβιοτικού στρες. Συνίσταται τα αποτελέσματα της ανάλυσης εδάφους και ιστών να χρησιμοποιούνται όποτε είναι δυνατόν για να καθοδηγήσουν τις εφαρμογές μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών για βελτιστοποίηση της κατάστασης των θρεπτικών συστατικών της καλλιέργειας. Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Αποφύγετε την άμεση εφαρμογή με ψεκασμό ή την έμμεση επαφή (όπως η διασπορά ψεκαστικού νέφους) σε μη στοχευόμενες περιοχές και ανοικτά υδάτινα ρεύματα (λίμνες, ρυάκια και ποτάμια). Συνίσταται οι παραγωγοί να ενημερώνονται από τους κατά τόπους γεωπόνους, για την ορθή χρήση της εκάστοτε περίπτωσης και την αποφυγή της υπερβολικής λίπανσης.

Οδηγίες Εφαρμογής: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός. Τοποθετήστε στη δεξαμενή ψεκασμού νερό μέχρι τη μέση, αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του βιοδιαγέρτη **NUVOLA® AMIN**. Ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο, προσθέστε τα ξεπλύματα στη δεξαμενή ψεκασμού, συμπληρώστε το γέμισμα και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Διατηρήστε την ανάδευση σε όλη την έκταση. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μην το χρησιμοποιείτε με προϊόντα χαλκού, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν τα ελαιόδεντρα. Μην το αναμιγνύετε με παραφινικά λάδια ή θειάφι. Επικοινωνήστε με την εταιρεία ή τον διανομέα της εταιρείας για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. (www.fmc.com).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 5°C. Διατηρήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην το αποθηκεύετε σε μέρη με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Περιεχόμενο:
5 λίτρα

11017299_22071096_GREECE

11017299_22071096_ LBL_SL-B_5L_NUVOLA AMIN_GR_1

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	149x149
Product SKU	11017299	Base for Booklet	
Product SKU Description	5L_NUVOLA AMIN_GR_1	Booklet	
Label SKU	22071096	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	LBL_SL-B_5L_NUVOLA AMIN_GR_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	