

FMC

SERBOT®

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ (ΕC)
Deltamethrin (Ντελταμεθρίν)ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΤΑ
ΜΥΖΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝΕγγυημένη σύνθεση: Deltamethrin 2,5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 97,35% β/β

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14936 / 31.10.2025

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΠεριεχόμενο:
1 Λίτρο eΚάτοχος της έγκρισης:
Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21 SI-2327
Rače, ΣλοβενίαΥπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά -
Διανομέας: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λεωφόρος Συγγρού 348, Κτίριο Β, 17674,
Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ.: 211 198 3903
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 455701000Τα FMC, FMC logo είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2025 FMC Corporation. All rights reserved.

FMC



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και αιτρώ εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Υποπύο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα. Πλύνετε τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/συσκευασιών.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ένα γιατρό/Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777**

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **1. 30 μέτρων**, για τις δενδρώδεις καλλιέργειες **2. 20 μέτρων**, για αμπέλι και ελιά **3. 30 μέτρων**, με φυτική κάλυψη (φυτική ζώνη ανασχεσης), σε τομάτα, μελιτζάνα, κολοκυνθοειδή, φράουλα. **4. 20 μέτρων**, που να συμπεριλαμβάνει **10 μέτρα** φυτική ζώνη ανασχεσης, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75%, σε Κουνουπίδι και Μπρόκολο **5. 10 μέτρων** για τις υπόλοιπες υπαίθριες καλλιέργειες. Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80 %, σε δενδρώδεις καλλιέργειες ή κατά 60%, σε ελιά. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για εφαρμογές σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, για την προστασία των μελισσών να μην εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της άνθησης, όταν τα θερμοκήπια παραμένουν ανοικτά. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα και τους επικονιαστές όπως βομβίνοι κ.α. **Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων.**

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



11017272_12104_ LBL_ML-F_1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_5PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11017272	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_5PAGES	Booklet	220x120
Label SKU	12104	Number of pages (Booklet)	1/5
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_2PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δοχείου, δυο (2) φορές με καθαρό νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής - στομάχου κατά μυζητικών και μασητικών εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυτάρων.
Φάσμα δράσης: Πεδίο Εφαρμογής–Στόχος–Δόσεις σκευάσματος – Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιφρουτ, Νεραντζιά): **Για Αφίδες (Myzus persicae)** δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρ.). **Για Λεκάνιο (Saissetia oleae) και Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.
Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά): **Για Αφίδες (Myzus persicae)** δόση 30 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά): **Για Αφίδες (Hyalopterus sp.), Καρπόκαψα Καρυδιάς (Laspeyresia pomonella), Καρπόκαψα Καστανιάς**

(Laspayresia splendana) και για Spodoptera frugiperda** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** i) δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (42–50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 140 λίτρα/στρ. ii. δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (42–50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **Για Ευρύτομο (Eurytoma plotnicovi)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 λίτρα/στρ. Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων.
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά): **Για Καρπόκαψα (Laspeyresia pomonella), Αφίδες (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea), Ψύλλα μηλιάς (Psylla mali) και για Spodoptera frugiperda **** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50* κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100-140 λίτρα/στρ. **Για Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana, Archips rosanus)** δόση 35 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (35-50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100-140 λίτρα/στρ. **Για Ψύλλα αχλαδιάς (Psylla pyri)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά): **Για Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana, Archips rosanus), Ανάρσια (Anarsia lineatella) και για Spodoptera frugiperda **** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 35 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (35-49 κ.εκ./στρ.). **Για Ραγολέπιδα (Rhagoletis cerasi)** δόση 40-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40-70 κ.εκ./στρ.). **Για Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρ.). **Για Αφίδες (Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni), Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς (Laspeyresia funebrana)** δόση 35-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100-140 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.
Αμπέλι:** **Για Ευδεμίδα (Lobesia botrana)** δόση 50 (1η γενεά) και 50-70 (2η και 3η γενεά) κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρ.). **Κογχυλιόδα (Clysia ambiguella) και για Spodoptera frugiperda **** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 50-70 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρ.). **Για Τζιτζικάκι (Empoasca sp.)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την

εμφάνιση των προσβολών.
Ελιά (Επιπταπέζια και ελιές για παραγωγή λαδιού): **Για Πυρηνοτρήτη (ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς) (Prays oleae) και για Spodoptera frugiperda **** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-40 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (40 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας. **Για Δάκο (Bactrocera oleae)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 - 140 λίτρα/στρ. Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. **Για Λεκάνιο (Saissetia oleae)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-70 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 - 140 λίτρα/στρ. **Για Βαμβακάδα (Euplyllura olivine)** δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-70 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 - 140 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.
Φράουλα (υπαίθρου): Για Αφίδες (Aphis gossypii, Aphis ruborum, Aulacorthum solani, Chaetosiphon fragaefolii, Myzus persicae), Σποντόπτερα (Spodoptera sp.), Κοφτοσκούληκα (Agrotis ypsilon) δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30 - 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.
Φράουλα (θερμοκηπίου): Για Αφίδες (Aphis sp.) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.
Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο: Για Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp.), Θρίπα (Thrips tabaci) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 40-50 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.
Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ): Για Αφίδες (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Άλτη (Chrysodeixis chalcites), Μαμέστρα (Autographa gamma), Κοφτοσκούληκα (Agrotis segetum), Σποντόπτερα (Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30-100 λίτρα/στρ.

«Διαβάστε τις εσώκλειστες οδηγίες»



11017272_12104_ LBL_ML-F_1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_5PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11017272	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_5PAGES	Booklet	220x120
Label SKU	12104	Number of pages (Booklet)	2/5
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_2PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών. **Για Δορυφόρο (Leptinotarsa decemlineata)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. **Για Βρωμούσα (Nezara viridula)** δόση 30 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (18-30 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. **Για Κοφτοσκούληκα (Agrotis ypsilon)** δόση 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Πιπεριά (Y+Θ): Για Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera sp.), Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae) δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (30-50 (Y), 30-70 (Θ) κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 100 (Y), 60 – 140 (Θ) λίτρα/στρ. **Για Βρωμούσα (Nezara viridula)** δόση 30 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (18-30 (Y), 18-42 (Θ) κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 100 (Y), 60 – 140 (Θ) λίτρα/στρ. **Για Αλευρώδη (Trialeurodes vaporariorum)** δόση 70 (Θ) κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (42-70 (Θ) κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 100 (Θ) λίτρα/στρ. **Για Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp.)** δόση 30-50 (Y) κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 – 100 (Y) λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Κολοκυθάκι (Y+Θ): Για Αφίδες (Aphis gossypii, Myzus persicae), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Μαμέστρα (Autographa gamma), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Αγγούρι, Αγγουράκι (Y+Θ): Για Αφίδες (Aphis gossypii, Myzus persicae, Hyperomyzus lactucae), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis), Κοφτοσκούληκα (Agrotis segetum, Agrotis ipsilon) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Πεπόνι (Y+Θ): Για Αφίδες (Aphis gossypii, Myzus persicae), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Μαμέστρα

(Autographa gamma), Κοφτοσκούληκα (Agrotis segetum, Agrotis ipsilon) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Καρπούζι (Y+Θ): Για Αφίδες (Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Μαμέστρα (Autographa gamma) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Κουνουπίδι, Μπρόκολο: Για Αφίδες (Brevicoryne brassicae, Lipahis erysimi, Myzus persicae), Πισιρίδα (Pieris brassicae, Pieris rapae), Κοφτοσκούληκα (Agrotis segetum, Agrotis ipsilon), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Μαμέστρα (Mamestra brassicae, Autographa gamma), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis), Πλουτέλλα (Plutella xylostella) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Μαρούλι (Y): Για Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera exigua), Άλη (Chrysodeixis chalcites), Αφίδες (Hyperomyzus lactucae, Aphis sp., Nasonovia ribis-nigri) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. **Για Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp.)** δόση 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Ρόκα: Για Αφίδες (Aphis sp.), Σποντόπτερα (Spodoptera exigua), Μαμέστρα (Mamestra sp.), Άλη (Chrysodeixis chalcites) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (35 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. Υγρού: 70 λίτρα/στρ. **Για Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp.)** δόση 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 70 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Μπιζέλια (αρακάς) φρέσκα: Για Αφίδα των μπιζελιών

(Acyrtosiphon pisum), Σιτόνα (Sitona sp.) δόση 25 κ.εκ./στρ. **Για Αφίδα των κουκιών (Aphis fabae), Κάμπα των μπιζελιών (Laspeyresia nigricana), Θρίπα (Thrips angusticeps), Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp.) και για Spodoptera frugiperda **** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Ψυχανθή (όσπρια) (Φακή, Ρεβίθια): Για Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis sp.), Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp.) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Πατάτα: Για Δορυφόρο (Leptinotarsa decemlineata) δόση 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 λίτρα/στρ. **Για Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis) και για Spodoptera frugiperda **** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Βαμβάκι: Για Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) δόση 50-70 κ.εκ./στρ., **Για Αλευρώδη (Bemisia tabaci), Τζιζικάκια (Empoasca sp.)** δόση 50 κ.εκ./στρ., **Για Σποντόπτερα (Spodoptera sp.), Αφίδα (Aphis gossypii), Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp.)** δόση 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 30-50 λίτρα/στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής.

Καπνός: Για Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp.), Θρίπα (Thrips tabaci) και για Spodoptera frugiperda ** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./στρ.- Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Παντζάρι: Για Αφίδες (Aphis fabae, Myzus persicae), Μύγα των τεύτλων (Pegomya sp.), Άλη (Chaetocnema tibialis), Σποντόπτερα (Spodoptera sp.), Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp.) δόση 30-50 κ.εκ./στρ. **Για Κασσίδα (Cassida nebulosa)** δόση 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 50 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Αραβόσιτος**: Για Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis), Σεζάμια (Sesamia nonagrioides), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera sp.), Αφίδες (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae), Κοφτοσκούληκα**



11017272_12104_ LBL_ML-F_1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_5PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11017272	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_5PAGES	Booklet	220x120
Label SKU	12104	Number of pages (Booklet)	3/5
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_2PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

(*Agrotis* sp.) δόση 30-50 κ.εκ./στρ. **Για Διαβρώτικα (*Diabrotica virgifera*)** δόση 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 60 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη): **Για Αφίδες (*Rhopalosiphum padi*, *Sitobion avenae*), Κοφτοσκούληκα (*Agrotis* sp.) και για *Spodoptera frugiperda* **** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 30-50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 40-60 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Μηδική: **Για Αφίδα των μπιζελιών (*Acyrtosiphon pisum*), Σκαθάρι των μπιζελιών (*Apion pisi*), Φυτονόμο (*Hypera postica*) και για *Spodoptera frugiperda* **** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 25 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. Υγρού: 40 λίτρα/στρ. Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.

Καλλωπιστικά (Y+Θ): Για Αφίδες (*Myzus* sp.), Θρίπες (*Thrips tabaci*) δόση 50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (25-50 κ.εκ./στρ.) Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. **Για Φυλλοδέετες (*Archips* sp., *Adoxophyes* sp., *Pandemis* sp.) και για *Spodoptera frugiperda* **** (Χρήση ήσσονος σημασίας)** δόση 35 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (17.5 -35 κ.εκ./στρ.) Όγκος ψεκ. Υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. **Για Αλευρώδη (*Trialeurodes vaporariorum*)** δόση 70 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.) Όγκος ψεκ. Υγρού: 70 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

Παρατηρήσεις: *ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 l/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

*** Η εφαρμογή στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp. ****Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του *Spodoptera frugiperda* στις καλλιέργειες: ακρόδρυων, μηλοειδών, πυρηνόκαρπων, αμπελιού, ελιάς, φράουλας (Θ), κρεμμυδιού, πράσου, σκόρδου, τομάτας (Y+Θ), μελιτζάνας (Y+Θ), κολοκυθίου (Y+Θ), αγγουριού (Y+Θ), πεπονιού (Y+Θ), καρπουζιού (Y+Θ), κουνουπιδιού, μπρόκολου, μαρουλιού, ρόκας, μπιζελιού, οσπρίων, πατάτας, καπνού, σιτηρών, μηδικής, καλλωπιστικών (Y+Θ). Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει

ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Παντζάρι, Σιτηρά: Μία (1) εφαρμογή. Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Φράουλα (Y), Τομάτα (Y+Θ) και Μελιτζάνα (Y+Θ) για Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Άλτη, Μαμέστρα, Κοφτοσκούληκα, Σποντόπτερα *Spodoptera frugiperda* **** (Χρήση ήσσονος σημασίας), Κολοκυθάκι (Y+Θ), Αγγούρι (Y+Θ), Αγγουράκι (Y+Θ), Πεπόνι (Y+Θ), Καρπούζι (Y+Θ), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Ρόκα, Μπιζέλια (αρακάς) φρέσκα, Ψυχανθή (όσπρια): Φακή, Ρεβύθια, Βαμβάκι, Μηδική: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες. Μαρούλι (Y): 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Καπνός, Καλλωπιστικά (Y+Θ): 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Αμπέλι, Φράουλα (Θ), Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Τομάτα (Y+Θ) και Μελιτζάνα (Y+Θ) για Δορυφόρο, Βρωμούσα, Κοφτοσκούληκα, Πιπεριά (Y), Πατάτα: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες. Πιπεριά (Θ): 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Αραβόσιτος για Πυραλίδα, Σεζάμια, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες, Κοφτοσκούληκα: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες, για Διαβρώτικα: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.

[Y: υπαίθρου, Θ: θερμοκηπίου]

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία deltamethrin, η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά IRAC.

1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

2. Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.

3. Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται τις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.

4. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές του προϊόντος. Το

σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

5. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών-στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

6. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα: 3 ημέρες. Αμπέλι (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια), Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες), Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Κρεμμύδι, Μαρούλι, Πράσο, Σκόρδο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Φακές (όσπρια), Ρεβίθια (όσπρια), Μπιζέλια-Αρακάς, Πατάτα, Καπνός: 7 ημέρες. Μηδική: 14 ημέρες. Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρούτ, Νεραντζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Βαμβάκι, Παντζάρι, Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: 30 ημέρες. Καλλωπιστικά: Μη εφαρμόσιμο.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείστε το στην αρχική, अपαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

11017272_12104_ LBL_ML-F_1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_5PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11017272	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_5PAGES	Booklet	220x120
Label SKU	12104	Number of pages (Booklet)	4/5
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_2PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

FMC

SERBOT®

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ (ΕC)
Deltamethrin (Ντελταμεθρίν)ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΤΑ
ΜΥΖΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝΕγγυημένη σύνθεση: Deltamethrin 2,5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 97,35% β/β

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14936 / 31.10.2025

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΠεριεχόμενο:
1 Λίτρο eΚάτοχος της έγκρισης:
Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21 SI-2327
Rače, ΣλοβενίαΥπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά -
Διανομέας: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λεωφόρος Συγγρού 348, Κτίριο Β, 17674,
Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ.: 211 198 3903
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 455701000Τα FMC, FMC logo είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2025 FMC Corporation. All rights reserved.

FMC

11017272_12104_GREECE



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και αιτρώ εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Υποπύο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα. Πλύνετε τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια, φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/συσκευασιών.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ένα γιατρό/Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777**

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αμέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **1. 30 μέτρων**, για τις δένδρωδεις καλλιέργειες **2. 20 μέτρων**, για αμπέλι και ελιά **3. 30 μέτρων**, με φυτική κάλυψη (φυτική ζώνη ανασχεσης), σε τομάτα, μελιτζάνα, κολοκυνθοειδή, φράουλα. **4. 20 μέτρων**, που να συμπεριλαμβάνει **10 μέτρα** φυτική ζώνη ανασχεσης, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75%, σε Κουνουπίδι και Μπρόκολο **5. 10 μέτρων** για τις υπόλοιπες υπαίθριες καλλιέργειες. Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μια αμέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80 %, σε δένδρωδεις καλλιέργειες ή κατά 60%, σε ελιά. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για εφαρμογές σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, για την προστασία των μελισσών να μην εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της άνθησης, όταν τα θερμοκήπια παραμένουν ανοικτά. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα και τους επικονιαστές όπως βομβίνι κ.α. **Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων.**

11017272_12104_LBL_ML-F_1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_5PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11017272	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_5PAGES	Booklet	220x120
Label SKU	12104	Number of pages (Booklet)	5/5
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_SERBOT 2.5EC_GR_2_BOOKLET_2PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	