



AMMARI®

Pyraclostrobin (Πυρακλοστρόμπιν) 20% β/ο
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση
κατά των ασθενειών που προσβάλλουν το φύλλωμα και
τους στάχεις των σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι).

Εγγυημένη σύνθεση: pyraclostrobin: 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 80,3% β/β

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 61232/04.11.2025

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας

Κάτοχος της άδειας: Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21, Rače, 2327, Σλοβενία

Περιεχόμενο:

1 Λίτρο

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα
Τηλ. 2111983903
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 455701000

Τα FMC, FMC logo είναι εμπορικά
σήματα της FMC Corporation ή και
θυγατρικών της. ©2025 FMC
Corporation. All rights reserved.

11017119_11954_GREECE

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



UFI: UAS0-U0U2-200Y-18D5

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ, στο γαστρεντερικό σύστημα και στην ρινική κοιλότητα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά, τους βραχίονες και το πρόσωπο μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και την αναπνοή κατά την ανάμιξη/φόρτιση. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος, να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα: ● μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων**, εκ των οποίων τα **10 μέτρα** να είναι φυτική ζώνης ανάσχεσης κατά την εφαρμογή έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 29), στην καλλιέργεια του χειμερινού/ανοιξιάτικου σιταριού, σκληρού σιταριού, τριπκάλε, σίτου

σπέλτα (όλυρα), σίτου μονόκοκκου, σίτου δίκοκκου. ● μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **15 μέτρων** ή μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%** κατά την εφαρμογή μετά την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους (BBCH 30) σε χειμερινό/ανοιξιάτικο σιτάρι, σκληρό σιτάρι, τριπκάλε, σίτο σπέλτα (όλυρα), σίτο μονόκοκκο, σίτο δίκοκκο, και κατά την καλλιέργεια του χειμερινού και ανοιξιάτικου κριθαριού. Επικινδύνo για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777**

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της επικέτας



11017119_11954_ LBL_ML-F_1L_AMMARI 200EC_GR_BOOKLET_2PAGES

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11017119	Base for Booklet	
Product SKU Description	1L_AMMARI 200EC_GR_BOOKLET_2PAGES	Booklet	250x138
Label SKU	11954	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_AMMARI 200EC_GR_BOOKLET_2PAGES	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά των ασθενειών που προσβάλλουν το φύλλωμα και τους στάχεις των σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι). Περιέχει pyraclostrobin, το οποίο παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποτοπλαστική και διελασματική κίνηση. Παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Μετά την εφαρμογή του, απορροφάται μερικώς από τα φύλλα, το οποίο εξηγεί την προστατευτική, διελασματική και τοπικά διασυστηματική του δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Πεδίο εφαρμογής - Στόχοι - δόσεις - Χρόνος & τρόπος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

Χειμερινό σιτάρι: Εναντίον της Σεπτορίωσης (*Zymoseptoria tritici*, *Parastagonospora nodorum*), της Καστανής Σκωρίωσης (*Puccinia reondita*, *Puccinia triticina*) και της Κίτρινης Σκωρίωσης (*Puccinia striiformis*, *Puccinia striiformis* f. sp. *tritici*) με δόση 100-125 κ.εκ. ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα ανά στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος μεταξύ Μαρτίου – Ιουνίου, από το στάδιο εμφάνισης του 5^{ου} αδελφίου έως το στάδιο κατά το οποίο οι πρώτοι σπόροι έχουν φτάσει στο 50% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 25-71)¹. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/21.

Ανοιξιάτικο σιτάρι: Εναντίον της Σεπτορίωσης (*Zymoseptoria tritici*, *Parastagonospora nodorum*) και της Καστανής Σκωρίωσης (*Puccinia reondita*, *Puccinia triticina*) με δόση 100-125 κ.εκ. ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα ανά στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος μεταξύ Μαρτίου - Ιουνίου, από το στάδιο εμφάνισης του 5^{ου} αδελφίου έως το στάδιο κατά το οποίο οι πρώτοι σπόροι έχουν φτάσει στο 50% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 25-71)¹. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/21.

Χειμερινό κριθάρι, Ανοιξιάτικο κριθάρι: Εναντίον της Δικτυωτής κηλίδωσης (*Pyrenophora teres*), της Ρυγχοσπορίωσης (*Rhynchosporium secalis*) και της Καστανής Σκωρίωσης (*Puccinia hordei*) με δόση 100-125 κ.εκ. ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα ανά στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος, μεταξύ Μαρτίου - Μαΐου, από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως το τέλος ξεσταχυάσματος / πλήρης έκπτυξη της ταξιανθίας (BBCH 30-59). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2/21.

Παρατηρήσεις:

1. Στο χειμερινό ή ανοιξιάτικο σιτάρι να πραγματοποιείται μόνο ένας ψεκασμός έως το τέλος του αδελφώματος (BBCH 29).
2. Σε περίπτωση υψηλής έντασης προσβολής της ασθένειας να χρησιμοποιείται η υψηλότερη δόση.
3. Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει τις χρήσεις: Σκληρό σιτάρι, Τριτικάλε, Σίτος σπέλτα (όλυρα), Σίτος μονόκοκκος, Σίτος δίκοκκος.
4. Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά ή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας.

Οδηγίες Χρήσης:

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος με χρήση γεωργικού ελκυστήρα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyraclostrobin, η οποία ανήκει στην **ομάδα 11** κατά FRAC. **Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:** ● Η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. ● Η εφαρμογή δραστικής ουσίας της ομάδας 11, να περιορίζεται σε 2 εφαρμογές ανά έτος, είτε αυτή είναι σε μίγμα είτε ως μεμονωμένη δραστική ουσία σε σκεύασμα. ● Να εφαρμόζονται τα μυκητοκτόνα της ομάδας προληπτικά, στα πρώτα στάδια της προσβολής. Αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες χρήσεις και σύμφωνα με τις δόσεις εφαρμογής όπως περιγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Σιτάρι, Σκληρό σιτάρι, Σίτος ο μονόκοκκος, Σίτος ο δίκοκκος, Σίτος σπέλτα, Τριτικάλε, Κριθάρι: 56 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική του απараβίαση συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.