



An Agricultural
Sciences Company

Tripali® Xtra technológiai csomag



Csomagösszetevők:

Tripali® gyomirtó szer 1 x 200 g + Fidum Xtra®* gombaölő szer 1 x 5 l

- ✓ A Tripali® Xtra technológiai csomag kimagaslóan költséghatékony megoldást kínál a kalászosok védelmére, kompromisszumok nélkül.
- ✓ A gondosan összeállított csomag egyszerre nyújt megbízható gyomirtást és hatékony védelmet a gombabetegségekkel szemben.
- ✓ A Tripali® széles hatásspektrumú gyomirtó szerként optimális védelmet nyújt a gabonákban előforduló legfontosabb kétszikű gyomok ellen, tiszta állományt és ideális fejlődési feltételeket teremtve.
- ✓ A csomag része a Fidum Xtra®*, egy rugalmasan felhasználható gombaölő szer, amely célzottan lép fel a kalászosokban jelentkező legfontosabb gombabetegségekkel szemben.
- ✓ Tripali® Xtra csomag együttes alkalmazása esetén Trend® 90 hozzáadása nem szükséges.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKET BIZTONSÁGOSAN ÉS FELELŐSSÉGGEL HASZNÁLJA!
KÉRJÜK, MINDIG KÖVESSE A KÉSZÍTMÉNY CÍMKÉJÉN LEÍRTAKAT ANNAK ALKALMAZÁSAKOR!

Tripali®

Granulált (WG) gyomirtó szer



Hatóanyag:
105 g/kg floraszulam + 82,8 g/kg metszulfuron-metil + 83 g/kg tribenuron-metil

Forg. kat.: I.

Kultúra	Károsító	Dózis (g/ha)	é.v.i. (nap)
őszi búza, rozs, tritikálé, őszi árpa, tavaszi árpa	magról kelő kétszikű gyomnövények, ragadós galaj, mezei acat	37–50	n.k.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK

Őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikálé kultúrákban a készítményt tavasszal, posztmergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 3 leveles állapotától a zászlóslevél megjelenéséig. A ragadós galaj 2-3 levélörvös fejlettségkor, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 leveles korukban, a mezei acat tölevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Mezei acat ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. Erős ragadósgalaj-fertőzés esetén vagy 3-5 örvös fejlettségű egyedek ellen önmagában az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni vagy fluroxipir hatóanyagú készítmény 75 g hatóanyag/ha dóziséval kombinációban célszerű kijuttatni.

A Tripali® gyomirtó szer önmagában való alkalmazása esetén a gyomirtó hatás fokozására a permetléhez minden esetben **Trend® 90 permetezőszer-segédanyag** hozzáadása javasolt 0,1 %-os dózisban.

Utóvetemény: A készítmény 50 g/ha-os dóziséval kijuttatását követően ugyanabban az évben csak őszi kalászos és őszi káposztarepce vethető. Őszi káposztarepce csak a 6,5-nél alacsonyabb pH-értékű talajokon, a Tripali®-kezelést követő 120 nap után, mélyszántást követően vethető, ha nem volt hosszú, száraz periódus a gabona vegetációs idején a Tripali® gyomirtó szerrel történt kezelés után. A vegetációs idő alatti hosszú szárazság, aszály esetén a metszulfuron-metil hatóanyag gátolt lebomlása miatt az őszi káposztarepce károsodást szenvedhet. A készítménnyel kezelt kalászos betakarítását követő év tavaszán bármely szántóföldi kultúra vethető, cukorrépa kivételével. Zöldség, dísz- és gyógynövények, gyümölcsösök telepítése, palántázása, illetve őszi mák vetése előtt kérje ki az FMC munkatársainak véleményét! A kultúrnövény kipusztulása esetén a kezelt területre újratvetni csak kalászos gabonát szabad.

Fidum Xtra®*

Folyékony (EC) gombaölő szer



Hatóanyag:
140 g/l azoxistrobin + 100 g/l protiokonazol

Forg. kat.: II.

Kultúra	Károsító	Dózis (l/ha)	é.v.i. (nap)
őszi búza, tavaszi búza, durumbúza	sárgarozsda, vöröszroszda, (levélrozsda), pirenofórás, levélfoltosság, szeptóriás levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság	1,0-1,4 l/ha	44
	kalászfuzáriózis	1,4 l/ha	
őszi árpa, tavaszi árpa	törperozsda, pirenofórás levélfoltosság, rinospóriumos levélfoltosság	1,0-1,4 l/ha	35
tritikálé	rinospóriumos levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság, vöröszroszda (levélrozsda), pirenofórás levélfoltosság	1,0-1,4 l/ha	44
rozs	rinospóriumos levélfoltosság	0,7-1,4 l/ha	44
	szeptóriás pelyvafoltosság, barnarozsda (levélrozsda)	1,0-1,4 l/ha	
repce	szklerotíniás betegség (fehérpenész)	1,0,2 l/ha	56
	alternáriás betegség	0,6-1,2 l/ha	

FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK

Őszi és tavaszi búza, illetve durumbúza kultúrákban a kalászhányás végét követően a készítményt legfeljebb egy alkalommal lehet kijuttatni.

Búza kultúrákban (őszi és tavaszi búza, durumbúza) a levélbetegségek elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdni, és fertőzési veszélyhelyzettől függően 2-3 hét elteltével megismételni. A szeptóriás pelyvafoltosság ellen a kalász és a felső levélemelet védelme érdekében szintén megelőző jelleggel, a zászlóslevél megjelenésétől a teljes virágzásig célszerű a permetezést végrehajtani. A kalászfuzáriózis elleni kijuttatást céltartottan, a virágzás kezdetén javasolt elvégezni, biztosítva a kalászok teljes és egyenletes permetlé fedettségét. Fertőzésre hajlamosító körülmények között, illetve a kalászfuzáriózis ellen az engedélyezett nagyobb dózis (1,4 l/ha) kijuttatása szükséges.

Őszi és tavaszi árpa kultúrákban a rozsda és levélfoltosságok elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdni és a fertőzési veszélyhelyzettől függően 2-3 hét múlva javasolt megismételni. Fertőzésre hajlamosító körülmények között az engedélyezett nagyobb dózis (1,4 l/ha) kijuttatása szükséges.

Rozs és tritikálé kultúrákban a levélbetegségek ellen előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdni a védekezést, ami a fertőzési veszélyhelyzettől függően 2-3 hét múlva megismételhető. A szeptóriás pelyvafoltosság ellen a kalász és a felső levélemelet védelme érdekében szintén megelőző jelleggel, a zászlóslevél megjelenésétől a kalászhányás végéig célszerű a permetezést végrehajtani. Fertőzésre hajlamosító körülmények között az engedélyezett nagyobb dózis (1,4 l/ha) kijuttatása szükséges.

Őszi és tavaszi káposztarepce kultúrákban a szklerotíniás és az alternáriás betegség elleni permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel a virágzás kezdetén szükséges elvégezni. Fertőzésre hajlamosító körülmények között, illetve a szklerotíniás betegség (fehérpenész) ellen az engedélyezett nagyobb dózis (1,2 l/ha) kijuttatása indokolt.

*A Fidum Xtra® gombaölő permetezőszer azonos a 6700/2929-1/2023 NÉBIH számon engedélyezett Promino® Xtra gombaölő permetezőszerrel.

Fidum Xtra®*

Folyékony (EC) gombaölő szer




OPT-on technológia


Hogyan jut be és terjed szét a hatóanyag a levél felületén

A permetecseppek optimális érintkezési felülete biztosítja, hogy a hatóanyag gyorsan és hatékonyan bejusson a növénybe.

Hagyományos technológia



- nagyobb felületi feszültség
- kisebb érintkezési felület
- magas lemosódás
- gyenge esőállóság



- alacsonyabb felületi feszültség
- nagy érintkezési felület
- csökkentett lemosódás
- jobb esőállóság

A FIDUM XTRA®* GOMBAÖLŐ SZER HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI

- ☑ **Kiemelkedő esőállóság:** Megbízható védelem a tavaszi kijuttatási időszakban.
- ☑ **Gyorsabb felszívódás és egyenletes fedettség:** A hatékony védelem alapja a hatóanyag könnyű hozzáférhetősége (OPT-on Technológia)
- ☑ **Egyszerű keverhetőség és permetlé-előkészítés:** Könnyű használat, amely megkönnyíti a gazdálkodók munkáját.
- ☑ **Gyors hatás és hosszan tartó védelem:** Eredményes növényvédelem a rezisztencia kialakulásnak kockázata nélkül

*A Fidum Xtra® gombaölő permetezőszer azonos a 6700/2929-1/2023 NÉBIH számon engedélyezett Promino® Xtra gombaölő permetezőszerrel.