

Exirel®
rovarölő szer**A MINŐSÉG NEM A FELVÁSÁRLÓNÁL KEZDŐDIK**

- Rendkívül gyors táplálkozás leállítás
▶ *esély sincs a tojásrakásra*



- Már a károsítás előtt megállítja a rovarokat
▶ *hibátlan termés takarítható be*



- Hosszú tartamhatás/rövid É.V.I.
▶ *rugalmas felhasználás a betakarítás időszakában*

- Csökkenti a minőségi kockázatot a kritikus időszakban
▶ *stresszmentes értékesítés*



- Új hatásmechanizmus az AKG ültetvényekben*
▶ *rezisztenciatorésra is alkalmas*

*Évente egy alkalommal használható.

**A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKET BIZTONSÁGOSAN ÉS FELELŐSÉGTELJESEN HASZNÁLJA.
NÖVÉNYVÉDŐ SZER HASZNÁLATA ESETÉN MINDIG KÖVESSE A CÍMKÉN SZEREPLŐ UTASÍTÁSOKAT.**

FELHASZNÁLÁSI JAVASLATOK

Almában, körtében, birsben és naspolyában a sodrómolyok, *almailonca*, *alma-* és *körtémoly* elleni védekezés szükségességéről a kártevők egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Sodrómolyok esetében az első kezeléseket az áttelelő lárvák ellen kell időzíteni. Tenyészidőszakban a sodrómolyok további nemzedékei, az *almailonca*, az *alma-* és *körtémoly* esetében feromoncsapdákkal végzett előrejelzés alapján a fiatal lárvastádiumok (L1-L2) ellen kell időzíteni a permetezést, a tömeges lárvakelés idején. Erős fertőzésnél és elhúzódó rajzás esetén a kezelést 10 nap múlva szükséges megismételni.

Szilvában a *kis* és *nagy téliaraszoló* esetében a kezeléseket a kelő lárvák ellen kell időzíteni. *Almailonca* és szilvamoly esetében feromoncsapdákkal végzett előrejelzés alapján a fiatal lárvastádiumok (L1-L2) ellen kell időzíteni a védekezést, a tömeges lárvakelés idején.

Cseresznyében és meggyben a *kis* és *nagy téliaraszoló* esetében a kezeléseket a kelő lárvák ellen kell időzíteni. *Cseresznyelég* és *faltosszárnyú muslica* ellen a tömeges rajzás kezdetekor kell védekezni.


Szőlőben a *tarka szőlőmoly* ellen a védekezést feromoncsapdás előrejelzés alapján, a fiatal lárvák megjelenésekor ajánlott végrehaj-

tani. Nagy egyedszámú, elhúzódó rajzás esetén a permetezést 14 nap elteltével szükséges megismételni. *Szőlőkabócák* ellen a fiatal lárvastádiumok (L1-L3) megjelenésekor célszerű elvégezni a permetezést, a *faltosszárnyú muslica* ellen a tömeges imágórajzás kezdetekor kell védekezni.

Ribiszke, köszméte és áfonya kultúrákban tenyészidőszakban a sodrómolyok, valamint az araszolólepkék esetében feromoncsapdákkal végzett előrejelzés alapján a fiatal lárvastádiumok (L1-L2) ellen kell időzíteni a permetezést, a tömeges lárvakelés idején. A *faltosszárnyú muslica* ellen az illatcsapdás rajzásmegfigyelés alapján az imágórajzás kezdetekor kell védekezni.

Kiskultúrás, illetve kis jelentőségű felhasználások a felhasználó saját felelősségére az 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján: Dióban nyugati dióburok-fúrólég ellen illatcsalétekkel kombinált sárga ragadólapos rajzásmegfigyelésre alapozva a rajzás kezdetén célszerű védekezni.

****Az 50 ml-es kis kiszerelés a hobbikertészeknek, kis területen gazdálkodóknak készült.** Számukra a hektáronkénti dózis mellett a kijuttatott szer mennyiségét 10 literre is feltüntetjük a fenti táblázatban, 1000 literes hektáronkénti lémmennyiséggel kalkulálva.



Nyugati dióburok-fúrólég (Izsák, Bács-Kiskun vármegye, 2025)

Hatóanyag: 100 g/l Cyazypyr® = ciántraniliprol	Forg. kat.: I. és II. (kiszerezés függvényében)	Eng.szám: 6300/1277-1/2021 NÉBIH	m.v.i.: 0
Méhveszélyesség:	kifejezetten kockázatos		
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes		
Tűzveszélyesség:	nem jelölésköteles		
p.o. LD₅₀ patkányon:	>5000 mg/ttkg		
Kiszerezés:	50 ml-es műanyag flakon (II. forg. kat.), 1 l-es műanyag flakon (I. forg. kat.)		
UFI-kód:	325X-J21W-PN4U-F7PG		

ENGEDÉLYEZETT KULTÚRÁK

Kultúra	Károsító	Kezelések évenkénti maximális száma	Dózis (l/ha)	** Dózis (10 l per-metléhez)	é.v.i. (nap)
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	almailonca, sodrómolyok, alma- és körtemoly	2	0,5-0,9	5-9 ml	7
szilva	szilvamoly, almailonca, kis téliaraszoló, nagy téliaraszoló		0,5-0,75	5-7,5 ml	7
cseresznye, meggy	almailonca, kis téliaraszoló, nagy téliaraszoló cseresznyelég, foltosszárnyú muslica		0,5-0,75	5-7,5 ml	7
szőlő (bor és csemege)	tarka szőlőmoly, szőlőkabóca, foltosszárnyú muslica		0,5-0,9	5-9 ml	10
ribiszke, köszméte, áfonya	foltosszárnyú muslica, araszolólepkék, sodrómolyok		0,5	5 ml	3
dió*	nyugati dióburok fúrólég		0,5-0,75	5-7,5 ml	14

*Kiskultúrák felhasználások az 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján.

HATÁSMÓD ÉS HATÉKONYSÁG

Az **Exirel®** rovarölő szer hatóanyaga a **Cyazypyr®** – egy antranil diamid, amely kiváló védelmet nyújt a legfontosabb rágó és szívó kártevők széles körével szemben. A **Cyazypyr®** a kártevő rovarok táplálkozásának gyors leállítását okozza, amelyet egyedi hatásmechanizmusa révén ér el. A kártevők izomműködésének gyengítésével a célkultúra azonnali védelemben részesül, annak ellenére, hogy a

kártevők az állományban még aktívnak tűnhetnek. Az **Exirel®** rovarölő szer toxikológiai és ökotoxikológiai profilja kiváló. Rövid élelmezés-egészségügyi ideje és hosszú tartamhatása miatt rugalmasan időzíthetjük a védekezést még a betakarítás közeledtével is. Kiemelkedő hatékonyságával megfelelhünk az egyre szigorodó frisspiaci és konzerveyári igényeknek.



Videó az Exirel® hatásáról foltosszárnyú muslica ellen:



A mellékelt QR-kóddal közvetlenül elérhető videóban részletesen megismerheti a készítmény működési mechanizmusát.

OLVASS BE!



A cseresznyelég elleni küzdelemből győztesen került ki Kujáni László őstermelő, aki a piretroidokkal összevetve mondja el tapasztalatait az Exirel® rovarölő szerről kecskeméti cseresznye- és meggyültetvényében.



A mellékelt QR-kóddal közvetlenül elérhető videóban részletesen megismerheti a termelő tapasztalatait a készítménnyel.

OLVASS BE!



A 4 hektáron kipróbált rovarölő szer alkalmazása szép termést hozott