


Penyakit Bercak Ungu
(*Alternaria porri*)



Keunggulan Kivalo™

- ✓ Kombinasi bahan aktif terbaik untuk **Perlindungan Sempurna** secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap serangan penyakit bercak ungu (*Alternaria porri*) pada tanaman bawang merah.
- ✓ Daun bawang merah berwarna hijau mengkilat dan elastis, menghasilkan **Pertumbuhan Sempurna** terutama pada keseragaman tumbuh, kekokohan batang dan diameter/popor batang bawang merah.
- ✓ Memaksimalkan **Potensi Hasil Panen**, menyempurnakan kualitas dan daya simpan, sehingga menambah nilai jual hasil panen.

Kapan waktu paling optimal menggunakan Kivalo™ ?



Petunjuk Penggunaan

Tanaman	Penyakit	Konsentrasi Formulasi	Cara dan Waktu Aplikasi
Bawang merah	Penyakit bercak ungu (<i>Alternaria porri</i>)	2 ml/l	- Aplikasi pertama saat ditemukan gejala serangan - Maksimum aplikasi 3 kali - Penyemprotan volume tinggi
Cabai merah	Penyakit antraknosa (<i>Colletotrichum capsici</i>)	1.5 ml/l	- Aplikasi pertama saat ditemukan gejala serangan - Maksimum aplikasi 3 kali - Penyemprotan volume tinggi
Padi	Penyakit bulir kotor (<i>Dirty panicle</i>)	1.5 ml/l	- Aplikasi pertama saat 5% berbunga, Aplikasi kedua saat 75% berbunga - Maksimum aplikasi 2 kali - Penyemprotan volume tinggi

Pemegang Nomor Pendaftaran/Formulator

PT Bayer Indonesia

Gedung Menara Astra Lt.33
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp. 0807-1-801-801 (Darurat)

Dikemas Oleh :

PT Bina Guna Kimia

Wisma Kodel, Lt. 10, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. B-4
Jakarta 12910 - Indonesia
Telp : (62-21) 5089 0890 Fax : (62-21) 5089 0889

Penyakit Antraknosa
(*Colletotrichum capsici*)



Keunggulan Kivalo™

- ✓ Kombinasi bahan aktif terbaik untuk **Perlindungan Sempurna** secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap serangan penyakit antraknosa (*Colletotrichum capsici*) pada tanaman cabai.
- ✓ **Pertumbuhan Sempurna**; tanaman cabai tumbuh seragam, daun sehat berwarna hijau mengkilat dan lentur, percabangan optimal, bunga berlimpah dan serentak serta tahan rontok.
- ✓ Memaksimalkan **Potensi Hasil Panen**, menyempurnakan kualitas dan daya simpan buah cabai sehingga menambah nilai jual hasil panen

Kapan waktu paling optimal menggunakan Kivalo™ ?

Waktu Penggunaan :
Dimulai pada saat cabai berbunga dan diulangi selama 3 kali dengan interval 7 hari

Rekomendasi Dosis :
750 ml per hektar per aplikasi



Petunjuk Penggunaan

Tanaman	Penyakit	Konsentrasi Formulasi	Cara dan Waktu Aplikasi
Bawang merah	Penyakit bercak ungu (<i>Althernaria porri</i>)	2 m/l	- Aplikasi pertama saat ditemukan gejala serangan - Maksimum aplikasi 3 kali - Penyemprotan volume tinggi
Cabai merah	Penyakit antraknosa (<i>Colletotrichum capsici</i>)	1.5 m/l	- Aplikasi pertama saat ditemukan gejala serangan - Maksimum aplikasi 3 kali - Penyemprotan volume tinggi
Padi	Penyakit bulir kotor (<i>Dirtyy panicle</i>)	1.5 m/l	- Aplikasi pertama saat 5% berbunga, Aplikasi kedua saat 75% berbunga - Maksimum aplikasi 2 kali - Penyemprotan volume tinggi

Pemegang Nomor Pendaftaran/Formulator

PT Bayer Indonesia

Gedung Menara Astra Lt.33
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp. 0807-1-801-801 (Darurat)

Dikemas Oleh :

PT Bina Guna Kimia

Wisma Kodel, Lt. 10, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. B-4
Jakarta 12910 - Indonesia
Telp : (62-21) 5089 0890 Fax : (62-21) 5089 0889

Penyakit Bulir Kotor (Dirty panicle)




Keunggulan Kivalo™

- ✓ Kombinasi bahan aktif terbaik untuk **Perlindungan Sempurna** secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap serangan penyakit gabah kotor (*Dirty panicle*) pada tanaman padi.
- ✓ **Pertumbuhan Sempurna**, menyeragamkan pertumbuhan anakan produktif, memaksimalkan jumlah malai dan malai keluar secara serentak, tanaman padi sehat bebas dari jamur baik pada daun pelepah maupun daun bendera.
- ✓ **Potensi Hasil Panen** terbaik; bulir padi padat berisi, berwarna kuning bening berkilau, dengan daya simpan dan rendemen berkualitas tinggi sehingga menambah nilai jual hasil panen.

Kapan waktu paling optimal menggunakan Kivalo™ ?

Waktu Penggunaan :
45 - 60 Hari setelah tanam

Rekomendasi Dosis :
500 ml per hektar per aplikasi



Petunjuk Penggunaan

Tanaman	Penyakit	Konsentrasi Formulasi	Cara dan Waktu Aplikasi
Bawang merah	Penyakit bercak ungu (<i>Alternaria porri</i>)	2 ml/l	- Aplikasi pertama saat ditemukan gejala serangan - Maksimum aplikasi 3 kali - Penyemprotan volume tinggi
Cabai merah	Penyakit antraknosa (<i>Colletotrichum capsici</i>)	1.5 ml/l	- Aplikasi pertama saat ditemukan gejala serangan - Maksimum aplikasi 3 kali - Penyemprotan volume tinggi
Padi	Penyakit bulir kotor (<i>Dirty panicle</i>)	1.5 ml/l	- Aplikasi pertama saat 5% berbunga, Aplikasi kedua saat 75% berbunga - Maksimum aplikasi 2 kali - Penyemprotan volume tinggi

Pemegang Nomor Pendaftaran/Formulator

PT Bayer Indonesia

Gedung Menara Astra Lt.33
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Jakarta 10220
Telp. 0807-1-801-801 (Darurat)

Dikemas Oleh :

PT Bina Guna Kimia

Wisma Kodel, Lt. 10, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. B-4
Jakarta 12910 - Indonesia
Telp : (62-21) 5089 0890 Fax : (62-21) 5089 0889

Kilau, Bening dan Sempurna

