

MANFAAT MENGGUNAKAN ALLY 20WG

LEBIH AWAL

Tanaman padi tumbuh maksimal, bila gulma dikendalikan lebih awal. Aplikasi herbisida Ally 20WG pada 7 HST (Hari Setelah Tanam) di awal pemupukan, akan sangat membantu pertumbuhan padi.

LEBIH HEMAT

Biaya lebih rasional dari sisi biaya per hektar

LEBIH BERSIH

Lahan padi lebih bersih, karena Ally 20WG selain bertranslokasi dari ujung daun ke seluruh jaringan gulma, bertranslokasi melalui akar, serta mampu mengendalikan biji gulma.

MANTAP UNTUK PERSIAPAN LAHAN

Mengendalikan gulma sebelum masa tanam dengan cara:

- 

ALLY 50GR + GLYPHOSATE 2 LT
Aplikasi 3 Minggu Sebelum Tanam
- 

ALLY 50GR + PARAQUAT 2 LT
Aplikasi 2 Minggu Sebelum Tanam

Ally®
Herbisida 20 WG

Unggul Untuk Persiapan Lahan

Ally®
HERBISIDA 20WG



METIL METSULFURON 20%

Herbisida sistemik pra tumbuh dan purna tumbuh berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air untuk mengendalikan gulma pada hutan tanaman industri Accacia mangium, tanaman karet, kelapa sawit, padi sawah, dan pada persiapan tanam padi sawah (TOT).

FMC

BERAT BERSIH 5 gram



GRUP

B

HERBISIDA



PERHATIAN



Pemegang Nomor Pendaftaran :
PT. FMC Agricultural Manufacturing
Wisma Kodel Lantai 10
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-4
Jakarta Selatan 12910
Telp. (021) 5089 0890
Fax. (021) 5089 0889

Emergency Call
0800 1 401447

BACA DAN IKUTI PETUNJUK PENGGUNAAN YANG TERDAPAT PADA LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN INSEKTISIDA INI. SIMPAN DI TEMPAT YANG LAYAK DAN AMAN SERTA JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.

PETUNJUK PENGGUNAAN


TANAMAN DAN GULMA	DOSIS FORMULASI	CARA PENGGUNAAN ATAU APLIKASI
Padi Sawah Gulma berdaun lebar <i>Monochoria vaginalis</i> Teki <i>Cyperus sp</i> <i>Scirpus juncoides</i>	15-20 g/ha 15-20 g/ha 10-20 g/ha	• Volume semprot: 250 l/ha. • Semprotkan pada waktu tanam padi sawah berumur 5-21 hari setelah tanam. • Apabila disemprotkan sebelum gulma tumbuh, air di dalam petakan sawah tidak perlu dibuang dan diusahakan untuk dipertahankan.
Persiapan tanam padi sawah TOT Gulma berdaun lebar <i>Commelina diffusa</i> <i>Lymncharis flava</i> Teki <i>Cyperus difformis</i>	37,5-75 g/ha 37,5-75 g/ha 37,5-75 g/ha	• Volume semprot: 500 l/ha. • Aplikasi dilakukan pada saat 2 minggu setelah panen tanaman sebelumnya atau 2 minggu sebelum tabur benih.

WAKTU PENYEMPROTAN



*-21 Hari Sebelum Tanam (HSbT) aplikasi 20-60 gram Ally 20WG + 1.5-2 liter glifosat
 -14 Hari Sebelum Tanam (HSbT) aplikasi 60 gram Ally 20WG + 2 liter parakuat

DOSIS



JENIS GULMA UTAMA

1. Daun Lebar



2. Teki-tekan



3. Daun Sempit

