

Preza™

INSEKTISIDA 100 OD

powered by
CYAZYPYR®
ACTIVE INGREDIENT



Scan QR Code
Untuk informasi
lebih lanjut



Emergency Call
0800 1 401447

Pemegang Nomor Pendaftaran :
PT. FMC Agricultural Manufacturing
Wisma Kodel Lantai 10, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-4,
Jakarta Selatan 12910
Tel. (021) 5089 0890, Fax. (021) 5089 0889
Negara Pembuat: Singapura, Amerika Serikat & India
Dikemas di Indonesia



powered by
CYAZYPYR®
ACTIVE INGREDIENT

Hama Mingguat Pucuk Sehat Panen Berlipat





10 Petikan pertama = >70% total hasil panen
Potensi hasil panen dan kualitas buah cabai terbaik bergantung pada 10 petikan pertama.

Hama Vektor Virus pada Tanaman Cabai

Hama Vektor Virus



Kutu Daun (*Myzus persicae*) merupakan hama vector virus CMV & ChLCV



Kutu Kebul (*Bemisia tabacci*) merupakan hama vector virus PYLCV (Gemini Virus)






Hama Thrips (*Thrips tabacci* / *Thrips parvispinus*) merupakan hama vector virus TSWV

Gejala Infeksi Virus



Hama Minggat




"Preza™ memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap hama vektor virus dibandingkan dengan produk lain"

"Lahan dengan perlakuan Preza™ Lebih terlindungi dari infeksi virus dibandingkan dengan lahan kontrol"

#MinggatSehatBerlipat



Pucuk Sehat




Cabang tanaman cabai yang terinfeksi virus tidak menghasilkan buah, walaupun berbuah kualitasnya pasti rendah

- Cabang produktif
- Cabang tidak produktif

- Pucuk daun cabai yang diaplikasikan Preza™, lebih **mulus**, **bersih** dan **cepat berkembang**
- Bunga cabai yang diaplikasikan Preza™, lebih **sehat**, **putih**, **mulus** dan **tidak rontok**



Panen Berlipat



"Dengan menggunakan Preza™, potensi panen yang diselamatkan 5% lebih tinggi di banding produk lain"

Hasil uji LPD 5 Area - 2022 (Garut, Bukittinggi, Magelang, Kediri & Banyuwangi)

"Dengan menggunakan Preza™, kualitas hasil panen lebih terjaga, sehingga nilai jual lebih maksimal"

Perbandingan buah cabai yang terkena virus dengan buah cabai dengan perlakuan Preza™

Rekomendasi Terbaik Aplikasi Pada Tanaman Cabai

Waktu Aplikasi



Aplikasi di umur **14 dan 21 HST***
(Sebelum muncul cabang Y pertama)

Dosis



2.5 ml/Liter*

*Cara Aplikasi: Foliar