




**Label for Small Pack upto 250 g**

For Import Only

सिर्फ आयात के लिए

**Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG**  
(Nativo 75 WG)  
(SYSTEMIC FUNGICIDE)

टेबुकोनाजोल ५०% + ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन २५% घुलनशील कणक  
(नेटिवो ७५ घुलनशील कणक)  
(अन्तरप्रवाही फफूँदनाशक)



Chemical Composition:	Content (m/m)	रासायनिक संघटन मात्रा	(भार/भार)
Tebuconazole a.i.	50.00 %	टेबुकोनाजोल सक्रीय तत्व	५०.०० %
Trifloxystrobin a.i.	25.00 %	ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन सक्रीय तत्व	२५.०० %
Other adjuvants	Balance	सहयोगी पदार्थ	बाकी
<b>TOTAL</b>	<b>100.00 %</b>	<b>कुल</b>	<b>१००.०० %</b>

(Detailed Chemical Composition is attached in leaflet)

(विस्तृत रासायनिक संघटन के लिए संलग्न निर्देशपत्रिका देखिये)

**USE :**

Rice - Sheath blight, Leaf blast & Neck blast and Glume discolouration (dirty panicle) diseases.  
Tomato - Early blight

**इस्तेमाल :**

धान - पणच्छेद अंगमारी, पत्ता झुलसा व गरदन तोड़ झुलसा और भद्रे सिद्धे  
टमाटर - अगेती अंगमारी

"Not to be used on crops other than specified on this Label"

इस लेबल में निर्देशित न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करे."

**ANTIDOTE :** No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.

विषनिवारक - कोई विशेष विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

Regn. No.  
रेजी नं.  
Batch No.  
बॅच नं.

Mfg. Lic. No.  
मैजु. ला. नं.  
Mfg. Date  
निर्माण तिथि:  
Nett Contents  
कुल भार



Expiry Date  
अवसान तिथि  
Max. Retail Price  
(Inclusive of all Taxes)  
अधिकतम खुदा-विक्री मूल्य  
(कर समाविष्ट)

**Manufactured by:**  
Bayer CropScience AG, Germany

निर्माता -  
बायर क्रॉपसायन्स एजी, जर्मनी

**Imported and Re-packed by :**  
Bayer CropScience Limited

आयातक एवं पुनःपैकिंग :  
बायर क्रॉपसायन्स लिमिटेड

**Factory :**

- 66-75, GIDC Estate, Himatnagar, Gujarat - 383 001.
- Plot No.6301-10A, GIDC, Ankleshwar, Gujarat - 393 002.
- Khanpur Road, Kharar, Dist. Ropar (Punjab).

**फैक्टरी :**

- ६६-७५, जी.आई.डी.सी.इस्टेट, हिमतनगर, गुजरात-३८३ ००१
- प्लॉट नं. ६३०१-१०अ, जीआईडीसी, अंकलेश्वर, गुजरात-३९३ ००२
- खानपुर रोड, खराड़, जिला : रोपड़ (पंजाब) ।

**Regd. Office:**


Olympia, 1<sup>st</sup> Floor, Central Avenue, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai - 400 076.

**रेजी. ऑफिस :**

ऑलिंपिया, पहला माला, सेन्ट्रल एव्हेन्यु, हिरानन्दानी गार्डन्स, पवई, मुंबई - ४०००७६.

**NB:** For details, please see enclosed leaflet.

**नोट :** विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न निर्देशपत्रिका देखें ।






For import only

**Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG**  
(Nativo 75 WG)  
(SYSTEMIC FUNGICIDE)

सिर्फ आयात के लिए

टेबुकोनाजोल ५०% + ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन २५% घुलनशील कणक  
(नेटिवो ७५ घुलनशील कणक)  
(अन्तरप्रवाही फफूँदनाशक)

Net Content /  
Volume



कुल मात्रा/  
आयतन

Keep Out of  
Reach of  
Children

बच्चों की पहुंच  
से दूर रखिए।



**Chemical Composition :**  
(m/m)

Chemical Composition :	Content
Tebuconazole a.i.	50.00 %
Trifloxystrobin a.i.	25.00 %
Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1'-oxybis(methylbenzene), sodium salt	15.00 %
Naphthalenesulfonic acids, branched and linear butyl derivatives, sodium salt	1.00 %
Urea/formaldehyde condensate	3.00 %
Kaolin	Balance %
<b>TOTAL</b>	<b>100.00 %</b>

**रासायनिक संघटन:**

रासायनिक संघटन:	मात्रा (भार/भार)
टेबुकोनाजोल सक्रीय तत्व	५०.०० %
ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन सक्रीय तत्व	२५.०० %
फॉर्मलडीहाइड, रिएक्शन प्रोडक्ट सल्फोनेटेड १, १'-ऑक्सीबीस [मिथाइल बेंजोइन] सोडियम सॉल्ट के साथ	१५.०० %
नैफथालिन सल्फोनिक एसिड्स, ब्रांच्ड और लिनिअर व्युटाईल डेरिवेटिव, सोडियम सॉल्ट	१.०० %
युरीआ / फॉर्मलडीहाइड कन्डेनसेट	३.०० %
केओलिन	बाकी %
<b>कुल</b>	<b>१००.०० %</b>

Read enclosed leaflet before use and follow instructions carefully

इस्तेमाल से पहले दिए गये सूचनापत्र को ध्यान से पढ़ें और निर्देशों का बड़े ध्यान से अनुसरण करें।

**USE :** Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG is recommended as a foliar spray for the control of Sheath blight, Leaf blast & Neck blast, Glume discolouration (dirty panicle) diseases on Rice and Early blight in Tomato.

**इस्तेमाल:** टेबुकोनाजोल ५०% + ट्रायफ्लोक्सिस्ट्रोबीन २५% + घुलनशील कणक धान में पर्णच्छेद अंगमारी, पत्ता झुलसा व गरदन तौड झुलसा और भधे सिद्धे और टमाटर में लगने वाले अनेती अंगमारी रोग की रोखथाम के लिए सिफारिश किया जाता है।

"Not to be used on crops other than Specified on this Label"

"इस लेबल में निर्देशित न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें."

**AUTHENTICATED**

**PRECAUTIONS :** Avoid contact with spilled product or contaminated surfaces. Wear protective clothing. Wash exposed parts of the body with soap and water after handling and before eating drinking and smoking.

सावधानीया: वाहर गिरे हुए पदार्थ तथा दुषित पृष्ठों से संपर्क न होने दे। सुरक्षा साधन परिधान करें। इस्तेमाल के बाद यांखोंसोपाने या धूप पान से पहले शरीर के दुषित भागोंको अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोले।

**SYMPTOMS OF POISONING :** Weakness, fatigue, Disponea.

**विषबाधा के लक्षण :** दुर्बलता, थकावट, कष्टक्षम।

**FIRST AID :** Get the victim into the fresh air immediately. If there is a risk of unconsciousness, position and transport in stable sideways position. Remove soiled or soaked clothing immediately and dispose of safely. In case of contact with eyes rinse the eyes thoroughly with water. In case of contact with skin wash immediately with copious water and soap. In case of ingestion, do not induce vomiting, wash out mouth with water. Call a physician immediately.

**प्राथमिक उपचार :** मरीज को तुरन्त खुली हवा में ले जाए। यदि मरीज बेहोश होने की संभावना हो तो उसे चीना हिलाए, तिरछा लेटा के एक जगह से दुसरी जगह ले जाए। दुषित कपडों को निकाल कर सुरक्षित जगह निपटाए। आँखों को फफूँदनाशक लगने पर आँखों को अच्छी तरह पानी से धोए। दुषित त्वचा को साबुन और पानी से धोए। यदि फफूँदनाशक निगला गया हो तो मरीज को उल्टी ना करवाए, उसके मुह को पानी से धोए। डाक्टर की सलाह प्राप्त करें।

**ANTIDOTE:** No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.

**विषनिवारक :** कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

**STORAGE :**

(1) The packages containing this fungicide shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms / almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the fungicide.) The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour / air.

**DISPOSAL OF EMPTY CONTAINER:**

1. The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

**संघय :**

- (१) फफूंदनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन में अन्य पदार्थों के संग्रह हेतु कमरों या भवन से दूर रखना चाहिए अथवा फफूंदनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग अलमारी में ताला लगाकर रखना चाहिए।
- (२) फफूंदनाशकों के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि वाष्प /हवा के साथ प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।

**खाली डिब्बों को निपटारा:**

- १) खाली डिब्बों को जानवरों तथा इनसान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दीजिये या इनसिनेरेटर में जला दें।
- २) खाली डिब्बों को बाहर न रखिये ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके।
- ३) डिब्बों, बचे हुए फफूंदनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

Regn. No.  
रेजी नं.  
Batch No.  
बैच नं.

Mfg. Lic. No.  
मैनु. ला. नं.  
Mfg. Date  
निर्माण तिथि:  
Nett Contents  
कुल भार

Expiry Date  
अवसान तिथि  
Max. Retail Price  
(Inclusive of all Taxes)  
अधिकतम खुद-विक्री मूल्य  
(कर समाविष्ट)

Manufactured by:  
Bayer CropScience AG, Germany

Imported and Re-packed by :  
Bayer CropScience Limited

**Factory:**

1. 66-75, GIDC Estate, Himatnagar, Gujarat - 383 001.
2. Plot No.6301-10A, GIDC, Ankleshwar, Gujarat - 393 002.
3. Khanpur Road, Kharar, Dist. Ropar. (Punjab)

**Regd. Office:**

Olympia, 1<sup>st</sup> Floor, Central Avenue,  
Hiranandani Gardens, Powai,  
Mumbai - 400 076.



निर्माता:  
Bayer CropScience AG, जर्मनी  
आयातक एवं पुनःपैकिंग :  
Bayer CropScience Limited


**पैक्टरी :**

- १) ६६-७५, जी.आई.डी.सी.इस्टेट, हिमतनगर, गुजरात-३८३ ००१.
- २) प्लॉट नं. ६३०१-१०अ, जीआईडीसी, अंकलेश्वर, गुजरात-३९३ ००२.
- ३) खानपुर रोड, खराड़, जिला : रोपड़, (पंजाब)

**रेजी. ऑफिस :**

ऑलिंपिया, पहला माला, सेंट्रल एव्हेन्यु,  
हिरानन्दानी गार्डन्स, पवई,  
मुंबई - ४०० ०७६.






FOR IMPORT ONLY

**Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG**  
**(Nativo 75 WG)**  
**(SYSTEMIC FUNGICIDE)**

Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG formulation contains 500 g of Tebuconazole and 250 g of Trifloxystrobin active ingredient per kg of formulation. Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG is a fungicide recommended for use as a foliar spray for the control of Sheath blight, Leaf blast & Neck blast and Glume discoloration (dirty panicle) diseases in Rice and early blight disease in Tomato.

Chemical Composition :	Content (m/m)
Tebuconazole a.i.	50.00 %
Trifloxystrobin a.i.	25.00 %
Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene], sodium salt	15.00 %
Naphthalenesulfonic acids, branched and linear butyl derivatives, sodium salt	1.00 %
Urea/formaldehyde condensate	3.00 %
Kaolin	<u>Balance</u>
<b>TOTAL</b>	<b>100.00 %</b>



**RECOMMENDATION FOR USE:** *Rice*

Crop	Common Name of disease	Dosage / per Hectare			Interval between last application & harvest (days)
		a.i. (g)	Formulation (g)	Dilution in Water (L)	
Rice	Sheath blight, Leaf blast & Neck blast, Glume discoloration (dirty panicle)	100 + 50	200	375-500	21
Tomato	Early blight	175 + 87.5	350	500	<i>3 (days)</i>

"Not to be used on crops other than Specified on this Leaflet"

**AUTHENTICATED**

**TIME OF APPLICATION AND APPLICATION EQUIPMENT:**

Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG is recommended to be applied with knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle at early appearance of disease. Depending upon the severity of disease, 1 -2 more spray may be given for disease management.

**PRECAUTIONS:**

Avoid contact with spilled product or contaminated surfaces. Wear protective clothing. Wash exposed parts of the body with soap and water after handling and before eating drinking and smoking.

**SYMPTOMS OF POISONING:**

Weakness, fatigue, Dispnoea.

**FIRST AID :**

Get the victim into the fresh air immediately. If there is a risk of unconsciousness, position and transport in stable sideways position. Remove soiled or soaked clothing immediately and dispose of safely. In case of contact with eyes, rinse the eyes thoroughly with water. In case of contact with skin wash immediately with copious water and soap. In case of ingestion, do not induce vomiting, wash out mouth with water. Call a physician immediately.

**ANTIDOTE :**

No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.





**STORAGE :**

(1) The packages containing fungicide shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms / almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the fungicide.

(2) The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour / air.

**DISPOSAL OF EMPTY CONTAINER:**

1. The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated.

2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.

3. Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

**Manufactured by:**

Bayer CropScience AG, Germany

**Imported and Re-packed by:**

Bayer CropScience Limited

**Factory:**

1. 66-75, GIDC Estate, Himatnagar, Gujarat - 383 001.

2. Plot No.6301-10A, GIDC, Ankleshwar, Gujarat - 393 002.


3. Khanpur Road, Kharar, Dist Ropar (Punjab).

**Regd. Office:**

Olympia, 1<sup>st</sup> Floor, Central Avenue,

Hiranandani Gardens, Powai,

Mumbai - 400 076.



AUTHENTICATED





सिर्फ आयात के लिए

टेबुकोनाजोल ५०% + ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन २५% घुलनशील कणक  
(नेटिवो ७५ घुलनशील कणक)  
(अन्तरप्रवाही फफूँदनाशक)

टेबुकोनाजोल ५०% + ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन २५% घुलनशील कणक में ५०० ग्राम टेबुकोनाजोल और २५० ग्राम ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन सक्रिय तत्व प्रति किलो फार्मुलेशन में समाविष्ट है। टेबुकोनाजोल ५०% + ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन २५% घुलनशील कणक एक फफूँदनाशक है जिसका प्रयोग धान में लगनेवाले पर्णच्छेद अंगमारी, पत्ता झुलसा व गरदन तोड़ झुलसा और भध्दे सिद्धे और टमाटर में लगने वाले अगेती अंगमारी रोग की रोखथाम के लिए सिफारिश किया जाता है।

रासायनिक संघटन मात्रा	(भार/भार)
टेबुकोनाजोल सक्रीय तत्व	५०.०० %
ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन सक्रीय तत्व	२५.०० %
फॉर्मलडीहाइड, रिएक्शन प्रोडक्ट सल्फोनेटेड १,	१५.०० %
१-ऑक्सोबीस [मिथाइल बेनझीन]	
सोडियम सॉल्ट के साथ	
नैपथालिन सल्फोनिक एसिडस, ब्रांच्ड और	१.०० %
लिनिअर व्युटाईल डेरिवेटिव, सोडियम सॉल्ट	
युरीआ / फॉर्मलडीहाइड कन्डेनसेट	३.०० %
केओलिन	वाकी %
<b>कुल</b>	<b>१००.०० %</b>

प्रयोग के लिए सिफारिश : *Rumee*

फसल	रोग का नाम	मात्रा/हेक्टर			आखिरी छिड़काव और फसल काटने में अंतर (दिनों में)
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लिट्र)	
धान	पर्णच्छेद अंगमारी, पत्ता झुलसा व गरदन तोड़ झुलसा, भध्दे सिद्धे	१०० + ५०	२००	३७५ - ५००	२१
टमाटर	अगेती अंगमारी	१७५ + ८७.५	३५०	५००	३ (विना)

“इस लिफलेट में निर्देशित न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें”

प्रयोग का समय एवं चंत्र :

टेबुकोनाजोल ५०% + ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन २५% घुलनशील का प्रयोग वीमारी के लक्षण दिखने पर पीठ पर उपरोक्त सिफारिश द्वारा जिसे हॉलो कोन नोजल लगा हो द्वारा किया जाता है। रोग के सही व्यवस्थापन के लिए रोग की तीव्रता के अनुसार १-१ और स्प्रे करें।

सावधानीचाँ : वाहर गिरे हुए पदार्थ तथा दुषित पृष्ठों से संपर्क न हाने दे। सुरक्षा साधन परिधान करें। इन्हे खास के वाद या खानेपान को धूम्रपान से पहले शरीर के दुषित भागों को अच्छी तरह से धोवन और पानी से धोले।

विषबाधा के लक्षण: दुर्बलता, थकावट, काष्ठवास।

प्राथमिक उपचार: मरीज को तुरन्त खुली हवा में ले जाए। यदि मरीज बेहोश होने की संभावना हो तो उसे वीना हिलाए, तिरछा लेटा के एक जगह से दुसरी जगह ले जाए। दुषित कपडों को निकाल कर सुरक्षित जगह निपटाए। आँखों को फफूँदनाशक लगाने पर आँखों को अच्छी तरह पानी से धोए। दुषित त्वचा को साबुन और पानी से धोए। यदि फफूँदनाशक निगला गया हो तो मरीज को उल्टी ना करवाए, उसके मुह को पानी से धोए। डाक्टर से सलाह प्राप्त करें।

विषनिवारक : कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।



संचय :

- (१) फफूंदनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन में अन्य पदार्थों के संग्रह हेतु कमरों या भवन से दूर रखना चाहिए अथवा फफूंदनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग अलमारी में ताला लगाकर रखना चाहिए ।
- (२) फफूंदनाशकों के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि वायु /हवा के साथ प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो ।

खाली डिब्बों को निपटारा :

- १) खाली डिब्बों को जानवरों तथा इनसान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दीजिये या इनसिनेटर में जला दें ।
- २) खाली डिब्बों को बाहर न रखिये ताकि दुवारा इस्तेमाल न हो सके ।
- ३) डिब्बों, बचे हुए फफूंदनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो ।

निर्माता :

वायर क्रॉपसायन्स एजी, जर्मनी ।

आयातक एवं पुनःपैकिंग :

वायर क्रॉपसायन्स लिमिटेड ।

फैक्टरी :


- १) ६६-७५, जी.आई.डी.सी.इस्टेट, हिमतनगर, गुजरात-३८३ ००१ ।
- २) प्लॉट नं.६३०१-१००, जीआईडीसी, अंकलेश्वर, , गुजरात-३९३ ००२ ।
- ३) खानपूर रोड, खराड, जिला : रोपड़, (पंजाब) ।

रेजी. ऑफिस :

ऑलिंपीया, पहला माला, सेन्ट्रल एक्वेन्सु,  
हिरानन्दानी गार्डन्स, पवई,  
मुंबई - ४०० ०७६ ।



AUTHENTICATED  
APPROVED

ATTESTED BY ME  
  
N. J. RATHOD  
NOTARY (GOVT. OF INDIA)  
C/O. COURT COMPOUND, HIMMATNAGAR

