ಅಥಾರಿಟಿ

ಸಲ್ಫೆನ್ಟ್ರಾಝೋನ್ 39.6% ತೂಕ/ತೂಕ ಎಸ್‌ಸಿ
ಕಳೆನಾಶಕ
(ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ)

ಸಲ್ಫೆನ್ಟ್ರಾಝೋನ್ 39.6% ತೂಕ/ತೂಕ ಎಸ್‌ಸಿ – ಇದೊಂದು ಅಗಾಧ ಶ್ರೇಣಿಯ, ಆಯ್ಕೆಯುಳ್ಳ, ಹಾವಳಿಮುನ್ನದ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಿಯಝೋಲೈನೋನ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೋಯಾ ಬೆಳೆಯ ಅಗಲೆಲೆಯ ಕಳೆ, ಸೆಜಸ್ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಹೆಸರು : ಸಂಯೋಜನೆ (% ತೂಕ/ತೂಕ)
ಸಲ್ಫೆನ್ಟ್ರಾಝೋನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ : 39.60
ಪೊಲ್ಯಿಥನಾಕ್ಸಿ ಈಥರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ : 8.00
ಪೊಲ್ಯೊಕ್ಸಿ ಇಥೆಲಿನ್ ಇಥನಾಕ್ಸಿ ಈಥರ್ : 2.00
ಪ್ರೊಪಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ : 10.00
ಡೈಮೆಥಿಲ್ ಪೊಲಿಸಿಲೊಕ್ಸಾನ : 0.15
ಕ್ಸಾಥನ್ ಗಮ್ : 0.16
ಡಿಮಿನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನೀರು : ಕ್ಯೂ.ಎಸ್
ಒಟ್ಟು : 100.00

ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು : ಸಲ್ಫೆನ್ಟ್ರಾಝೋನ್ 39.6% ತೂಕ/ತೂಕ ಎಸ್‌ಸಿ ಇದನ್ನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯ ಹಾವಳಿ ಮುನ್ನದ ಈ ಕಳಗಿನ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಬೆಳೆ	ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಳೆಗಳು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ			ಕಾಯುವ ಅವಧಿ, ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅವಧಿ)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ)	ತೆಳೂ ಗೊಳಿಸಲು (ಲೀಟರ್ಸ್)	
ಸೋಯಾಬೀನ್	(ಅಕಲಿಂಫಾಜಾತಿ, ಕೊಮ್ಮೆಲಿನಾಜಾತಿ, ಡೈಗೆರಾಜಾತಿ, ಸೈಪರಸ್ ಜಾತಿ, ಎಖಿನೊಕ್ಲೊವಜಾತಿ, ಬ್ರಾಕ್ಯಾರ್ಯ ಡೈನೆಬ್ರಜಾತಿ)	360	750	500	88

ಬಳಕೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಸಿರಿ. ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಳಕೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಯಾಕಾರದ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನಾಝುಲ್ ಜೋಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬೆರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸಿರಿ.

ಬಳಕೆ : ಈ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಿದ 0 ಯಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹಾವಳಿಮುನ್ನದ ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ಬಳಸಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

அத்தாரிடி

சல்ஃபெண்டிராஜோன் 39.6% எ/எ எஸ்சி
களைக்கொல்லி
(உள்ளூரில் தயாரித்து பயன்படுத்துவதற்கு)

சல்ஃபெண்டிராஜோன் 39.6% எ/எ எஸ்சி ஒரு பரந்த வீரிய செயலாற்றலுள்ள, முளைக்கும் முன் கட்டுப்படுத்தும் தேர்வுநிலை களைக்கொல்லி. டிரையாஜோலினோன் வகுப்பைச் சேர்ந்த இக் களைக்கொல்லி சோயாபீன் பயிரில் அகன்ற இலைக் களைகள், புதர்கள் மற்றும் புற்களைக் கட்டுப்படுத்தும்.

இரசாயனக் கலவை:

பெயர் : அடக்கம் (%எ/எ)
சல்ஃபெண்டிராஜோன் வீரிய மூலப் பொருள் : 39.60
பாலிஇதானோக்ஸி இதர் பாஸ்பேட் சால்ட் : 8.00
பாலிஒக்ஸி இதைலின் இதனோக்ஸி இதர் : 2.00
புரொபைலின் கிளைகோல் : 10.00
டைமிதைல் பாலிசிலோக்ஸேன : 0.15
க்ஸாந்தம் கம் : 0.16
டிமினரலைஸ்டு வாட்டர் : கி.கு.
மொத்தம் : 100.00

பயன்படுத்துவதற்கான பரிந்துரை: சல்ஃபெண்டிராஜோன் 39.6% எ/எ எஸ்சி மருந்தை முளை விடும் முன்னதாகத் தெளித்து சோயாபீன் பயிரில் தோன்றும் கீழ்க்கண்ட களைகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

பயிர்	கட்டுப்படுத்தப்படும் களைகள்	மருந்தளவு / ஹெக்டேர்			காத்திருக்கும் காலம் நாட்களில் (கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடைப்பட்டது)
		ஏ.ஐ. (கிராம்)	தயாரிப்பு (மிலி)	நீர்த்தல் (லிட்.)	
சோயாபீன்	(அகாலைஃபா எஸ்பி., காம்மெலினா எஸ்பி., டைகிரா எஸ்பி., சைப்ரஸ் எஸ்பி., எகினோகுளோவா எஸ்பி., பிராசியாரியா எஸ்பி., டைன்பிரா எஸ்பி.,)	360	750	500	88

பயன்படுத்த குறிப்புகள்: தேவையான அளவு மருந்தை எடுத்துக் கொண்டு சிறிதளவு நீர் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். பின்பு தேவையான அளவு மீதித் தண்ணீரையும் ஊற்றி நன்கு கிண்டி கலக்கி அதிக அளவு தெளிப்பிற்கு தயாராக்கி ஃபிளேட் ஃபேன் ப்ளட் ஜெட் நாஸிலுடன் கூடிய நாப்சாக்

অথরিটি

সালফেনট্রাজোন ৩৯.৬% ও-ও এসসি
আগাছানাশক
(ভারতীয় উৎপাদন এবং ব্যবহার)

সালফেনট্রাজোন ৩৯.৬% ও-ও এসসি একটি ট্রিয়াজোলিনন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ কিছু আগাছার জন্মানোর আগে, সমগ্র দেহাংশে কাজ করা আগাছানাশক যা সোয়াবিন ফসলের বড় পাতা আগাছা, শর এবং ঘাস নিয়ন্ত্রণ করে।

রাসায়নিক গঠন :

নাম : গঠন (%ও-ও)
সালফেনট্রাজোন স্বক্রিয় উপাদান : ৩৯.৬০
পলিইথানক্সি ইথার ফসফেট সল্ট : ৮.০০
পলিঅক্সি ইথাইল ইথানক্সি ইথার : ২.০০
প্রোপাইলিন গ্লিকল : ১০.০০
ডাইমিথাইল পলিসিলোজানা : ০.১৫
জ্যানথাম গাম : ০.১৬
ডিমিনারালাইজড জল : কিউ. এস.
মোট : ১০০.০০

ব্যবহারের সুপারিশ: সালফেনট্রাজোন ৩৯.৬% ও-ও এসসি সোয়াবিনের নিম্নলিখিত আগাছা নিয়ন্ত্রণে আগাছা জন্মানোর আগে ব্যবহার করতে হবে।

ফসল	আগাছা নিয়ন্ত্রণ	মাত্রা / হেক্টর			অপেক্ষা র সময় দিনে (শেষ স্প্রে ও ফসল কাটার মাঝোর বিরতি)
		এ.আই. (গ্রা)	প্রস্তুতি (মিলি)	জলে দ্রবনীয়তা (লি)	
সোয়াবিন	(অ্যাকালিফা এসসি., কমোলিনা এসসি., ডিগেরা এসসি., সাইপেরাস এসসি., ইকিনোক্লোয়া এসসি., ব্রাচিয়ারিয়া এসসি., ডিনেব্রা এসসি.,)	৩৬০	৭৫০	৫০০	৮৮

ব্যবহারের নির্দেশ: প্রয়োজনীয় মাত্রায় আগাছানাশক মেশে নিয়ে অল্প পরিমাণ জলে ভালো করে মিশিয়ে নিন। নির্দেশমতো বাকি জলটুকু ভালোভাবে নাড়িয়ে মিশিয়ে দিন, ফ্ল্যাট ফ্যান, ফ্লাড জেট নজ্‌লযুক্ত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ারের মাধ্যমে হাই ভলিউম প্রয়োগের জন্য।

প্রয়োগ: এই আগাছানাশকটি কেবলমাত্র বপনের ০-৩ দিন পরে আগাছা জন্মানোর আগে স্প্রে করা যাবে। ভালো ফল পেতে সম্পূর্ণ ক্ষেতে সমানভাবে

അതോറിറ്റി

സൽഫെൻട്രാസോൺ 39.6% ക/കഎസ്സി
കളനാശിനി
(രാജ്യത്തിനകത്തെനിർമ്മാണത്തിനുംഉപയോഗത്തിനും)

സൽഫെൻട്രാസോൺ 39.6% ക/ക എസ്സി ബഹുവിധ പ്രവർത്തനമുള്ള തുംകളകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത്നശിപ്പിക്കുന്നതുംകളകൾമുളച്ച്പൊന്തുന്നതിന്മുമ്പ്ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമായഒരുകളനാശിനി ആണ്. ട്രായാസോളിനോൺ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഈ കളനാശിനി സോയാബീൻ കൃഷിയിലെപരന്നഇലകളുള്ളകളകൾ, കോറപ്പുല്ലുകൾ, വിവിധ തരംപുല്ലുകൾ എന്നിവയെനിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഫലപ്രദമാണ്.

രാസഘടന:

പേര് : ഉള്ളടക്കം (% W/W)
സൽഫെൻട്രാസോൺ സജീവ ഘടകം : 39.60
പോളിഎതനോക്സി ഈതർ ഫോസ്ഫേറ്റ്സോൾട്ട് : 8.00
പോളിഓക്സി എതിലീൻ എതനോക്സി ഈതർ : 2.00
പ്രോപ്പൈലീൻഗ്ലൈക്കോൾ : 10.00
ഡൈമീതൈൽ പോളിസിലോക്സെൻ : 0.15
സ്കാന്തം ഗം : 0.16
ഡിമിനറലൈസ്ഡ്‌വാട്ടർ : QS
ആകെ : 100.0

ഉപയോഗത്തിനുള്ളശുപാർശ: സൽഫെൻട്രാസോൺ 39.6% ക/ക എസ്സി സോയബീൻ കൃഷിയിലെതഴെപ റയുന്നകളകൾ മുളച്ച്പൊന്തുന്നതിന്മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കണം

വിളകൾ	നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന കളകളുടെ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെക്റ്റർ			വിളവെടുപ്പിനും അവസാന തളിയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പു കാലം (ദിവസം)
		സ.ഘ. (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (എംഎൽ)	നേർപ്പിക്കാൻ വെള്ളം (ലി.)	
സോയബീൻ	(എകാലിഫ എസ്പി, കൊമേലിന എസ്പി, ഡൈഗേരാഎസ്പി, സൈപെറസ്എസ് പി, എക്കിനോക്ലോവാഎസ് പി, ബ്രാക്കിയാറിയാഎസ്പി, ഡിനെബ്രഎസ്പി)	360	750	500	88

ഉപയോഗത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ : ആവശ്യത്തിനുള്ള അളവിൽ ഉത്പന്നമെടുത്ത് കുറച്ചു വെള്ളത്തിൽ നന്നായി മിശ്രിതപ്പെടുത്തുക. ഫ്ളാറ്റ് ഫാൻ ഫ്ളഡ് ജറ്റ് നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക് സ്പ്രെയറുകൾകൊണ്ട് ഉയർന്ന വോളിയത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുക.

অথৰিটী

চালফেন্ট্ৰাজঐন ৩৯.৬% ও/ও এচচি
অপতৃণনাশক
(স্বদেশীভাৱে প্ৰস্তুত আৰু ব্যৱহাৰৰ বাবে)

চালফেন্ট্ৰাজঐন ৩৯.৬% ও/ও এচচি হ'ল এবিধ বহু উপযোগী, বাছনিসক্ষম, ঘাঁহ-বন ওলোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰয়োগযোগ্য, ট্ৰায়েজলিনন শ্ৰেণীৰ অপতৃণনাশক, যাক চয়াবীন খেতিত দেখা দিয়া বিভিন প্ৰকাৰৰ ঘাঁহ-বন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

ৰাসায়নিক গঠন ঃ

নাম ঃ পৰিমাণ (% ও/ও)
চালফেন্ট্ৰাজঐন সক্ৰিয় উপাদান ঃ ৩৯.৬০
পলীইথেনক্সি ইথাৰ ফচফেট চল্ট ঃ ৮.০০
পলীঅক্সি ইথাইলিন ইথেনক্সি ইথাৰ ঃ ২.০০
প্ৰপিলিন গ্লাইকল ঃ ১০.০০
ডাইমিথাইল পলীচিলক্সানা ঃ ০.১৫
জেন্থম গম ঃ ০.১৬
ডিমিনাৰেলাইজ্‌ড ওৱাটাৰ ঃ বা.প.
মুঠ ঃ ১০০.০০

ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুমোদন ঃ চালফেন্ট্ৰাজ'ন ৩৯.৬% ওৰও এচচি চয়াবীন খেতিত দেখা দিয়া নিম্নলিখিত ঘাঁহ-বন সমূহ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘাঁহ-বন ওলোৱাৰ আগতেই ব্যৱহাৰ কৰা উচিত।

শস্য	নিয়ন্ত্ৰিত অপতৃণনাশক	মাত্ৰা / হেক্টৰ			বৰ লগা দিন (শেষ প্ৰয়োগৰ পৰা চপোৱাৰ মাজত ব্যৱধান)
		স. উ. (গ্ৰাম)	ফৰ্মুলেশ্যন (মিলি)	মিহলাবৰ বাবে পানী (লিটাৰ)	
চয়াবীন	(একালাইফা প্ৰজাতি, কমেলিনা প্ৰজাতি, ডাইজেৰা প্ৰজাতি, চাইপেৰাচ প্ৰজাতি, একিনঐক্লোৱা প্ৰজাতি, ব্ৰেকিয়াৰিয়া প্ৰজাতি, ডাইনেব্ৰা প্ৰজাতি)	৩৬০	৭৫০	৫০০	৮৮

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ ঃ অপতৃণনাশকৰ অনুমোদিত পৰিমাণ জুখি লব আৰু দ্ৰৱণ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে সামান্য পৰিমাণৰ পৰিষ্কাৰ পানীৰ সৈতে ভালদৰে মিহলাব। মাৰি বা ৰড এডালেৰে খুব জোৰেৰে দ্ৰৱণখিনি ঘুটিব। অপতৃণনাশক সম্পূৰ্ণৰূপে গলি নোযোৱালৈকে লাহে লাহে লৰাই থাকিব আৰু তাৰপিছতহে স্প্ৰেয়াৰটো ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ধাৰণক্ষমতালৈকে পানীৰে পূৰাব। অপতৃণনাশক প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে ফ্লেট ফেন বা ফ্লাড জেট নজল ব্যৱহাৰ কৰিব।

প্ৰয়োগ ঃ এই অপতৃণনাশক বীজ সিঁচাৰ ০-ৰ পৰা ৩ দিনৰ পিছত কেৱল ঘাঁহ-বন ওলোৱাৰ

ଅଥରିଟୀ

ସଲ୍‌ଫେନ୍‌ଟ୍ରାଜୋନ୍ ୩୯.୬% ଡବଲୁ/ଡବଲୁ ଏସ୍‌ସି
ଅନାବନା ଘାସନାଶକ
(ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଉପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ)

ସଲ୍‌ଫେନ୍‌ଟ୍ରାଜୋନ୍ 39.6% ଡବଲୁ/ଡବଲୁ ଏସ୍‌ସି ହେଉଛି ଟ୍ରାୟାଜୋଲାନନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଚୟନକାରୀ, ଗଜେଇବା ପୂର୍ବ ତୃଣନାଶକ ଯାହାର ଉପଯୋଗ ସୋୟାବିନ୍ ଫସଲରେ ହେଉଥିବା ଚଉଡ଼ା ପତରିଆ ଅନାବନା ଘାସ, ବୁଦା ଘାସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସକାଶେ କରାଯାଏ ।

ରାସାୟନିକ ସଂଗଠନ

ନାମ : ସଂଗଠନ (%ଡବଲୁ/ଡବଲୁ)
ସଲ୍‌ଫେନ୍‌ଟ୍ରାଜୋନ୍ ଉପାଦାନ : ୩୯.୬୦
ପଲୀଏଥାନୋକ୍ସୀ ଇଥର ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ଲବଣ : ୮.୦୦
ପଲୀଅକ୍ସି ଏଥିଲିନ୍ ଏଥାନୋକ୍ସୀ ଇଥର : ୨.୦୦
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ : ୧୦.୦୦
ଡାଇମିଥାଇଲ୍ ପଲୀସିଲୋକ୍ସେନ୍ : ୦.୧୫
ଜାନ୍‌ଥାନ୍ ଗମ୍ : ୦.୧୬
ଅଖଣିଜ ପାଣି : ଶତାଂଶର ବାକିମାତ୍ରା
ମୋଟ : ୧୦୦.୦୦

ବ୍ୟବହାର ବିଧି : ସଲ୍‌ଫେନ୍‌ଟ୍ରାଜୋନ୍ ୩୯.୬% ଡବଲୁ/ଡବଲୁ ଏସ୍‌ସି ର ଉପଯୋଗ ସୋୟାବିନ୍ ଫସଲରେ ହେଉଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନାବନା ଘାସ ଗଜେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଜରୁରୀ।

ଫସଲ	ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅନାବନା ଘାସ	ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାତ୍ରା			ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ଦିନରେ (ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ ଅମଳ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାଳ)
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରା)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ମିଲି)	ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ	
ସୋୟାବିନ୍	(ଅକାଲିଫା ଏସ୍‌ପି., କୋମେଲିନା ଏସ୍‌ପି., ଡାଇଜେରା ଏସ୍‌ପି., ସାଇପର୍‌ସ ଏସ୍‌ପି., ଏକିନୋକ୍ଲୋଆ ଏସ୍‌ପି., ବ୍ରାସିଆରିଆ ଏସ୍‌ପି., ଡାଇନେବ୍ରା ଏସ୍‌ପି)	୩୬୦	୭୫୦	୫୦୦	୮୮

ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳବୀ : ଏହି ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ମାପକରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ପାଣିରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବଳକାଂଶ ପାଣିକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲଭାବରେ ଦ୍ରବଣକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ସହିତ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଫ୍ଲାଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ଜେଟ୍ ନୋଜଲ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାପପାସ ସ୍ପ୍ରେୟାରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ପାରିବ।

INSTRUCTIONS FOR USE

FMC

AUTHORITY®

Sulfentrazone 39.6% w/w SC
Herbicide
(For indiginous manufacture and use)

अथॉरिटी®

सल्फेन्ट्राजोन ३९.६% भार/भार एस सी
खरपतवारनाशक
(स्वदेशी उत्पादन और उपयोग के लिए)

ઑથોરિટી®

સલ્ફેન્ટ્રેઝોન ૩૯.૬% વ/વ એસસી
નીંદણનાશક
(સ્વદેશી ઉત્પાદકો અને વપરાશ માટે)

Authority® is registered trademark of FMC Corporation or an affiliate

Manufactured and Marketed by :
FMC India Private Limited,
TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban,
Mumbai – 400098, Maharashtra, India.
Factory : Survey No. 216/1 & 216/2,
Village and Post : Chandrapura, Tal. Halol , Dist.
Panchmahal- 389 350, Gujarat.

निर्माता एवं विपणनकर्ता:
एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड,
टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी-५३,
बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन,
मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.
फैक्टरी : सर्वे नं. २१६/१ और २१६/२, गांव और पोस्ट : चंद्रपुरा,
तालूका- हलोल, डिस्ट. पंचमहल- ३८९३५०, गुजरात.

ઉત્પાદન તથા વયાણકર્તાઃ
એફ એમ સી ઈંડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ,
ટીસીજી ફાઈનેંશિયલ સેંટર, 2 જા માળે, સી -53,
બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પલેક્સ, બાંદ્રા (પૂર્વ), બાંદ્રા સબર્બન,
મુંબઈ - 400098, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ફૅક્ટરી : સર્વે નં. ૨૧૬/૧ અને ૨૧૬/૨,
ગામ અને પોસ્ટઃ ચંદ્રાપુર, તાલુકો હલોલ ,
જિલ્લોઃ પંચમહાલ- ૩૮૯૩૫૦, ગુજરાત.

Customer Cell ✆: **1800 102 6545** or
✉: **Ask@fmc.com** or
write at *FMC India address.