பெனிவியா®

சையாண்டிரானிலிப்ரோல் 10.26% எ/எ ஓடி
ஊடுருவும் மற்றும் தொடுகை பூச்சிக்கொல்லி

சியாண்டிரானிலிபுரோல் 10.26% எ/எ ஓடி ஒரு நூதன அந்திரானிலிக்டயமைட் பூச்சிக்கொல்லி. கடித்துத் தின்னும் மற்றும் சாறு உறிஞ்சும் பற்பல பூச்சிகளை பயனுள்ள வழியில் கட்டுப்படுத்த ஏற்றது. இந்த ஊடுருவும் பூச்சிக்கொல்லி வயிற்றில் சென்றும் அழிக்கும், தொடுகையினாலும் அழிக்கும்.

எச்சரிக்கை: நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் தேனீக்களுக்கு இந்த புராடெக்ட் நச்சாக இருக்கும் என்பதால், நீர்வாழ் உயிரின வளர்ப்பு இடங்களுக்கருகிலும், தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாகப் பறந்து கொண்டிருக்கும் சமயங்களிலும் இதன் பயன்பாட்டைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்கள்	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்	மருந்தளவு / ஹெக்டேர்			மருந்து தெளித்த பிறகு காத்திருக்கும் (நாட்கள்)
		தீ.மூ./ (கிராம்) (% செறிவு)	தயாரிப்பு (மிலி/ % செறிவு)	கரைக்க நீர் அளவு	
திராட்சை	பேன்கள் – ஸ்கிர்டொதிரிப்ஸ்டோர்சலிஸ் தெள்ளு வண்டு – ஸ்கெலோடோண்டா ஸ்டிரிகிகோல்லிஸ்	70	700	1000	5
மாதுளை	பேன்கள் – ஸ்கிர்டொதிரிப்ஸ் டோர்சலிஸ் மாதுளம்பழ வண்ணத்துப்பூச்சி – டியுடோரிக் ஐசோக்ரேட்ஸ்	75 (0.0075%)	750 (0.075%)	1000	5
	வெள்ளை ஈ – ஸைஃபோனினுஸ் ஃபில்லைரீ அசுவினி – அஃபிஸ் புனிகே	90 (0.009%)	900 (0.09%)		
முட்டை-கோசு	முட்டை கோசு அசுவினி – பிரிவைகோரினி பிராஸ்சிகே கடுகு அசுவிணி – லிபாஃபி செரிசிமி வைர துகு அந்துப்பூச்சி – புளுடெல்லாக் ஸைலோஸ்டெல்லா புகையிலை புழு – ஸ்போடோப்டெரலிடுரா	60	600	500	5
மிளகாய்	பேன்கள் – ஸ்கிர்டொதிரிப்ஸ் டோர்சலிஸ் காய் துளைப்பான் – ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மைகெரா புகையிலை தத்துப்பூச்சி – ஸ்போடோப்டெர லிடுரா	60	600	500	3
தக்காளி	இலைத் துளைப்பான் – லிரியோமய்ஸ ட்ரிரிஃபோலில் அசுவிணிகள் – அஃபிஸ் காஸ்ஸைபீ பேன்கள் – திரிப்ஸ் டபாசி வெள்ளை ஈ – பெமிசியே டபாசி பழம் துளைப்பான் – ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா	90	900	500	3
கோடை-வக்காய்	இலைத் துளைப்பான் – லிரியோமய்ஸ ட்ரிரிஃபோலில் சிவப்பு பூசணிவண்டு – அவுலகோபோரா ஃபோவிகோலிஸ் அசுவிணிகள் – அஃபிஸ் காஸ்ஸைபீ பேன்கள் – திரிப்ஸ்பால்மி வெள்ளை ஈ – பெமிசியே டபாசி பூசணி புழு – டயஃபானியா இண்டிகா பழ ஈ – பாக்ட்ரோசெரு குர்பிடேய்	90	900	500	5
வெண்டை	வெள்ளை ஈ – பிமிசியா டபாசி அசுவினி – அஃபிஸ் கோஸ்சைபீ குருத்து மற்றும் பழம் துளைப்பான் – இயரியஸ் விடெல்லா புகையிலை கம்பளிப்புழு – ஸ்பொடொப்டிரா லிடுரா பழம் துளைப்பான் – ஹெலிகொவெர்பா ஆர்மிகெரா	90	900	500	3
கத்தரி	வெள்ளை ஈ – பிமிசியா டபாசி குருத்து மற்றும் பழம் துளைப்பான் – லியுசினோட்ஸ் ஆர்பொனலிஸ் அசுவினி – அஃபிஸ் கோஸ்சைபீ பேன் – திரிப்ஸ் டபாசி	90	900	500	3
பருத்தி	வெள்ளை ஈ – பிமிசியா டபாசி அசுவினி – அஃபிஸ் கோஸ்சைபீ பேன் – திரிப்ஸ் டபாசி புகையிலை கம்பளிப்புழு – ஸ்பொடொப்டிரா லிடுரா காய்ப்புழு – ஹெலிகொவெர்பா ஆர்மிகெரா – இயரியஸ் விடெல்ல	90	900	500	7
பாகல்	பேன் – திரிப்ஸ் பல்மி வெள்ளை ஈ – பிமிசியா டபாசி அசுவினி – அஃபிஸ் கோஸ்சைபீ பூசணி கம்பளிப்புழு – டயஃபனியா இண்டிகா இலை துளைப்பான் – லிரியோமைஜி டிரைஃபோலி	90	900	500	5
பீர்க்கு	பேன் – திரிப்ஸ் பல்மி வெள்ளை ஈ – பிமிசியா டபாசி அசுவினி – அஃபிஸ் கோஸ்சைபீ பூசணி கம்பளிப்புழு – டயஃபனியா இண்டிகா இலை துளைப்பான் – லிரியோமைஜி டிரைஃபோலி	90	900	500	5
தர்ப்பூசணி	பேன் – திரிப்ஸ் பல்மி வெள்ளை ஈ – பிமிசியா டபாசி அசுவினி – அஃபிஸ் கோஸ்சைபீ இலை துளைப்பான் – லிரியோமைஜி டிரைஃபோலி	90	900	500	5

**ஒவ்வொரு லிட்டர் தயாரிப்புப் பொருளில் எடை/ கொள்ளளவு அடிப்படையில் சையாண்டிரானிலிப்ரோல் 10.26% எ/எ எஸ்சியில், 100 கிராம் செயற்படும் மூலப்பொருள் உள்ளது.

தெளிப்பு முறை மற்றும் காலம்: லேபில் அளவுகள் பிரகாரம் மட்டுமே கரைசலைத் தயாரித்து மருந்து கரைசலைத் தயாரித்த நான்கு மணி நேரத்திற்குள் பயன்படுத்த வேண்டும். சிறந்த பயன்களைப் பெற, ஆரம்ப பயிர் பருவத்தில் 7 – 10 நாட்கள் இடைவெளியில் இரண்டு முறை இலைத் தெளிப்பு செய்ய வேண்டும். மருந்து பயன்பாடு, பூச்சிகள் தாக்கும் பருவத்திற்கு ஆரம்ப நிலையிலேயே இருக்க வேண்டும். முட்டையிலிருந்து வெளிவந்த இளம் பருவ புழு மற்றும் பூச்சிகளின் மீது பயன்படுத்தும்போது அவை உண்பதை உடனடியாக நிறுத்துகின்றன. இதனால் பூச்சிகளின் மூலம் பரவும் வைரஸ் நோய்கள் பரவாமல் தடுக்கப்படுவதன் மூலம் வளமான பயிர் வளர்ச்சிக்கும் விளைச்சலுக்கும் வழி ஏற்படுகிறது.

தெளிப்பான் : நாப்சாக் ஸ்பிரேயர், தைவான் ஸ்பிரேயர் மற்றும் ஃபூட் ஸ்பிரேயர் போன்ற அதிக கொள்ளளவு தெளிப்பான்களை உபயோகித்து வயல் முழுவதும் ஒரே சீராகத் தெளிக்க வேண்டும்.

எதிர்ப்பு மேலாண்மை:

குழுமம்	28	பூச்சிக்கொல்லி

சையாண்டிரானிலிப்ரோல் மற்றும் இதர 28 குழும பூச்சிக்கொல்லிகளை மட்டுமே அடிக்கடி பயன்படுத்தினால், மருந்தை எதிர்த்து நிற்கும் ஆற்றல் பூச்சிகளிடம் அதிகரித்து பூச்சி ஒழிப்பு குறையும் வாய்ப்புகள் சில பயிர்களில் உண்டாகலாம். மருந்தை எதிர்த்து நிற்கும் பூச்சிகள் ஆற்றலைத் தடை செய்ய பூச்சிக்கொல்லி எதிர்ப்புத்திறன் நிருவாகத் திட்டத்தை (ஐஆர்எம்) செயல்படுத்த வேண்டும். அடுத்தடுத்த பூச்சிகள் ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளில் (அதே ஐஆர்ஏசி குரூப் நம்பர்) செயல்பாடுகளையுடைய மருந்துகளைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

- சையாண்டிரானிலிப்ரோல் மற்றும் இதர (குரூப் 28 பூச்சிக்கொல்லி) மருந்தை ஒரு பயிருக்கு 2 தடவைக்கும் மேற்பட்டு ஒரே பிரிவைச் சேர்ந்த பூச்சிகளை ஒழிக்கப் பயன்படுத்தக் கூடாது..
- சையான்டிரானிலிபுரோல் மருந்தை பயிரைத் தாக்கும் ஒரு தலைமுறை பூச்சி இனத்திற்கு இரண்டு தடவைக்கு மேல் தெளிக்கக் கூடாது. தலைமுறை வகையை அடையாளம் காணவியலாத பட்சத்தில், பரிந்துரைக்கப்பட்ட சாரளமாக சுமார் 30 நாட்களை 'சையான்டிரானிலிபுரோல் மருந்து' தெளிக்கும் காலமாகக் கருதலாம்.
- அடுத்தடுத்து உருவாகும் அதே வகை பூச்சிகளைப் பயனுள்ள விதத்தில் ஒழிக்க வேறு வகையில் செயல்படும் (குரூப் 28 பிரிவைச் சாராத) பூச்சிக்கொல்லி மருந்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- ரு பயிர் சுழற்சியில் சையான்டிரானிலிபுரோல் மருந்து பயன்பாட்டை 3 தடவைக்கும் மேல் செய்யக் கூடாது.
- சையான்டிரானிலிபுரோல் மருந்தை லேபிலில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அளவுகளைவிட குறைத்து பயன்படுத்தக் கூடாது
- சையான்டிரானிலிபுரோல் தயாரிப்புகளை பரிந்துரைக்கப்பட்ட சாரள காலத்தில் மட்டுமே ஒவ்வொரு பயிரிலும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பண்டங்கள், காலியான உணவுப் பாத்திரங்கள் மற்றும் விலங்கு தீவனங்களிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். 2.பூச்சிக்கொல்லி தெளிப்பு துளிகள் வாயில், கண்களில் மற்றும் சருமத்தில் படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும், மேலும் அந்த காற்றையும் சுவாசிக்கக் கூடாது. 3. முழுக்கை சட்டை, நீண்ட கால் சராய், வேதியியல் பொருள்களைத் தடுக்கும் கையுறைகள், காலணிகள் மற்றும் காலுறைகள் போன்ற பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். 4.கண்களில் மிதமான எரிச்சல் உணர்வை ஏற்படும் என்பதால், கண் மறைப்பு கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். 5.மருந்தைக் கையாண்ட பிறகு மாசுபட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடலுறுப்புகளை நன்றாகக் கழுவிக் கொள்ளவும். 6.மருந்து தெளிக்கும் சமயத்தில் சாப்பிட, குடிக்க அல்லது புகைபிடிக்கக் கூடாது.

முதலுதவி: விழுங்கியிருந்தால்: நோயாளி சுயநினைவுடன் விழிப்புடன் இருந்தால், வாயைக் கொப்பளிக்கச் செய்து 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கச் செய்யுங்கள். சுயநினைவு தவறியிருப்பவர்களுக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவரைக் கூப்பிட வேண்டும். மருத்துவரின் மேற்பார்வை இல்லாமல் நோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. சுவாசித்திருந்தால்: நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, உடல் தட்பவெப்பத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். ஒருவேளை நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், வாயுடன் வாய் வழியாக ஊதி செயற்கை சுவாசமளிக்க வேண்டும். மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். மருந்து சருமத்தில் பட்டிருந்தால்: நன்றாகக் குளிக்க வேண்டும். சோப்பு போட்டு நிறைய தண்ணீர் ஊற்றி குளிக்க வேண்டும். நக இடுக்குகள், முடி அனைத்தையும் நன்றாகச் சுத்தம் செய்து குளிக்க வேண்டும். வலி, கன்றுதல் அல்லது உறுத்தல் உணர்வுகள் தொடர்ந்திருந்தால், மருத்துவரிடம் சிகிச்சைபெற வேண்டும். மாசுபட்ட ஆடைகளை தனியாக நன்றாக சோப்பு போட்டு துவைத்த பிறகே மறுஉபயோகம் செய்ய வேண்டும். கண்களில் பட்டிருந்தால்: கண்களை நன்றாக அலம்பிக்கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து 15 நிமிடங்கள் வரை கண்களில் நிறைய தண்ணீர் ஊற்றி கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். வலி, உறுத்தல், கன்றுதல் அல்லது பிரகாசத்தை சகிக்க டியாத நிலைமை இருந்தால், கண் மருத்துவரிடம் சிகிச்சைபெற வேண்டும்.

நச்சு முறிவு: குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சைஅளிக்கவும்.

காலி கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல்: காலியான கொள்கலன்களை மறுஉபயோகம் செய்யக் கூடாது. இவற்றை மூன்று தடவை அலம்பி அலம்பிய தண்ணீரையும் கரைசலிலேயே கலந்துவிட வேண்டும். பயன்படுத்திய பாக்கெட்டுகளை உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதைக்க வேண்டும். உபயோகித்த பாக்கெட்டுகளை மறு முறை பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. பாக்கெட்டுகள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் எந்திரங்களை கழுவிய நீர் முதலியவற்றை சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் நீர் நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும்.

இருப்பு வைத்தல் : பூச்சிக்கொல்லிகள் இருக்கும் டப்பாக்களை, ஒரு தனி அறையில் அல்லது கட்டிடத்தில், குழந்தைகள், கால்நடைகளுக்கு எட்டாதவாறு மற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள், தீவனங்கள் போன்றவற்றைச் சேமித்து வைக்கும் இடங்களிலிருந்து அப்பாற்பட்ட இடத்தில் அல்லது பூட்டு வசதி இருக்கும்படியான ஒரு அலமாரியில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும். பூச்சிக்கொல்லிகள் சேமிப்பு இருப்பாக வைக்கப்படும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நன்றாகக் கட்டப்பட்டதாகவும்.

உலர்வாகவும், பிரகாசமுள்ளதாகவும், காற்றோட்டமானதாகவும், நல்ல நீள அகலம் உடையதாகவும், காற்றுடன் கலந்து மாசுபடுத்தாத விதத்தில் இருக்க வேண்டும்.

நச்சுபட்ட அறிகுறிகள் : கண்களில் மிதமான எரிச்சல் தோன்றும். நீண்ட காலத்திற்கு அல்லது மருந்து அடிக்கடி சருமத்தில் பட்டுக் கொண்டிருந்தால், சிலருக்கு சரும ஒவ்வாமை ஏற்படும்.

இரசாயனக் கலவை :

கூறுப் பொருள்கள்	% எ/எ
சையாண்டிரானிலிப்ரோல் ஏ.ஐ.	10.26
டோடிசைல் பென்ஸேன் சல்ஃபொனேட் இன் மிதைலேடெட் அண்ட்	
எதோக்ஸைலேடெட் சீட் ஆயில்	25.00
பாலியோக்ஸைதிலின் சார்பிடோல் ஃபேட்டி ஆசிட்	5.00
ஃபியூம்ட் சிலிகா	1.31
சிட்ரிக் ஆசிட்	0.02
தண்ணீர்	4.11
மிதைலேடெட் சீட் ஆயில்	மீதம் தேவைக்கு
மொத்தம்	100.00

உற்பத்தி : எஃப்எம்சி இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், டிசிஜி ஃபைனான்ஷியல் சென்டர், 2வது தளம், இ-53, பாந்திரா குர்லா காம்ப்ளெக்ஸ், பாந்திரா (கி), பாந்திரா சபர்பன், ம்பை - 400098, மகாராஷ்டிரா. தொழிற்சாலை: பிளாட் நெ. 11, ஜி.ஐ.டி.சி, சால்லி, கிராமம்:மஞ்சுசார், மாவட்டம்: வதோதரா-391775, குஜராத்.

ਬੇਨੇਵੀਆ®

ਸਾਈਐਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 10.26 % ਭ/ਭ ਓਡੀ
ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਸਾਈਐਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 10.26% ਭ/ਭ ਓਡੀ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਐਂਥਰਾਨੀਲੀਕਡਾਯਾਮਾਈਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਚੱਬਣ ਅਤੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ,ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਸਾ.ਪ੍ਰ. ਹੈ.			ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ (ਦਿਨ)
		ਗ੍ਰਾ. ਕਿ.ਤ./ %ਕੰਸੈਂ.	ਫ਼ਾਰਮੂ. (ਮਿਲੀ/ %ਕੰਸੈਂ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	
ਅੰਗੂਰ	ਪੱਤਾ ਜੂੰ – ਸਕੀਰਟੋਥ੍ਰਿਪਸ ਡੋਰਸੈਲੀਸ ਫ਼ਲੀ ਬੀਟਲ – ਸਕੇਲੋਡੋਂਟਾ ਸਟ੍ਰੀਗੀਕੋਲੀਸ	70	700	1000	5
ਅਨਾਰ	ਪੱਤਾ ਜੂੰ – ਸਕੀਰਟੋਥ੍ਰਿਪਸ ਡੋਰਸੈਲੀਮ ਅਨਾਰ ਦੀ	75 (0.0075%)	750 (0.075%)	1000	5
	ਬਟਰਫ਼ਲਾਈ – ਡੀਓਡੋਰੀਕਸੋ ਆਸੋਕਰੇਟਸ ਚੇਪਾ–ਏਫ਼ਿਸ ਪੂਨੀਸੀਆ ਸਫ਼ੇਦ ਮਖੀ – ਸਾਇਫ਼ੋਨਿਨਸ ਫ਼ਾਇਲੇਰੀਆ	90 (0.009%)	900 (0.09%)		
ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ	ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਚੇਪਾ – ਬ੍ਰੇਵੀਕੋਰੀਨੇਬ੍ਰੇਸੀਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਚੇਪਾ – ਲੀਪਾਫ਼ੀਸ ਰੇਸੀਮੀ ਚਮਕਦਾਰ ਭੰਵਟ – ਪਲੂਟੇਲਾ ਜ਼ਾਇਲੋਸਟੇਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ – ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾਲੀਟੂਰਾ	60	600	500	5
ਮਿਰਚ	ਪੱਤਾ ਜੂੰ – ਸਕੀਰਟੋਥ੍ਰਿਪਸ ਡੋਰਸੈਲੀਸ ਫਲ ਛੇਦਕ – ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪ੍ਰ ਆਰਮੀਜੇਰਾ ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ–ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾਲੀਟੂਰਾ	60	600	500	3
ਟਮਾਟਰ	ਪੱਤਾ ਸੁਰੰਗੀ – ਲੀਰੀਓਮਾਈਜ਼ਾਟਰੀਫੋਲੀ ਚੇਪਾ – ਏਫ਼ਿਸ ਗੌਸੀਪਿ ਪੱਤਾ ਜੂੰ – ਥ੍ਰਿਪਸਟੇਬੇਸੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ – ਬੇਮੇਸੀਏਟੇਬੇਸੀ ਫਲ ਛੇਦਕ – ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪ੍ਰਾ ਆਰਮੀਜੇਰਾ	90	900	500	3
ਘਰਕਿੰਸ (ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੀਰਾ)	ਪੱਤਾ ਸੁਰੰਗੀ – ਲੀ ਰੀਓਮਾਈਜ਼ਾ ਟਰੀਫ੍ਰੋਲੀ ਲਾਲ ਪੰਪਕਿਨ ਬੀਟਲ – ਔਲਾਕੋਫ਼ੋਰਾ ਫ਼ੋਵੀਕੋਲੀਸ ਚੇਪਾ – ਏਫ਼ਿਸ ਗੌਸੀਪੀ, ਪੱਤਾ ਜੂੰ – ਥ੍ਰਿਧਸ ਪਲਮੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ – ਬੇਮੇਸੀਏਟੇਬੇਸੀ ਪੰਪਕਿਨ ਸੁੰਡੀ–ਡਾਯਾਫ਼ੇਨੀਏਂਡੀਕਾ ਫਲ ਮੱਖੀ –ਬੈਕਟ੍ਰੋਸਰੇਕੁਕਰਬਿਟੇ	90	900	500	5
ਭਿੰਡੀ	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ–ਬੇਮਿਸੀਆ ਤਾਬਾਕੀ ਚੇਪਾ–ਏਫ਼ਿਸ ਗੌਸਿਪੀ ਤਣਾ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ– ਈਰੀਆਸ ਵਿਟੇਲਾ ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ–ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲੀਤੂਰਾ ਫਲ ਛੇਦਕ–ਹੇਲੀਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਗੇਰਾ	90	900	500	3
ਬੈਂਗਣ	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ–ਬੇਮਿਸੀਆ ਤਾਬਾਕੀ ਤਣਾ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ– ਲਿਊਸੀਨੋਡਸ ਔਰਬੋਨਾਲੀਸ ਚੇਪਾ–ਏਫ਼ਿਸ ਗੌਸਿਪੀ ਤੇਲਾ–ਥ੍ਰਿਪਸ ਤਾਬਾਕੀ	90	900	500	3
ਕਪਾਹ	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ–ਬੇਮਿਸੀਆ ਤਾਬਾਕੀ ਚੇਪਾ–ਏਫ਼ਿਸ ਗੌਸਿਪੀ ਤੇਲਾ–ਥ੍ਰਿਪਸ ਤਾਬਾਕੀ ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ–ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲੀਤੂਰਾ ਟੀਂਡਾ ਸੁੰਡੀ–ਹੇਲੀਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਗੇਰਾ ਅਤੇ ਈਰੀਆਸ ਵਿਟੇਲਾ	90	900	500	7
ਕਰੇਲਾ	ਤੇਲਾ–ਥ੍ਰਿਪਸ ਪਾਲਮੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ–ਬੇਮਿਸੀਆ ਤਾਬਾਕੀ ਚੇਪਾ–ਏਫ਼ਿਸ ਗੌਸਿਪੀ ਪੀਲਾ ਕੱਦੂ ਸੁੰਡੀ–ਡਾਯਾਫ਼ਾਨੀਆ ਇੰਡੀਕਾ, ਪੱਤਾ ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜਾ– ਲੀਰੀਓਮਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਫ਼ੋਲੀ	90	900	500	5
ਰਿੱਜ (ਦੰਦੇਦਾਰ) ਤੋਰੀ	ਤੇਲਾ–ਥ੍ਰਿਪਸ ਪਾਲਮੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ–ਬੇਮਿਸੀਆ ਤਾਬਾਕੀ ਚੇਪਾ–ਏਫ਼ਿਸ ਗੌਸਿਪੀ ਪੀਲਾ ਕੱਦੂ ਸੁੰਡੀ–ਡਾਯਾਫ਼ਾਨੀਆ ਇੰਡੀਕਾ, ਪੱਤਾ ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜਾ– ਲੀਰੀਓਮਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਫ਼ੋਲੀ	90	900	500	5
ਤਰਬੂਜ਼	ਤੇਲਾ–ਥ੍ਰਿਪਸ ਪਾਲਮੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ–ਬੇਮਿਸੀਆ ਤਾਬਾਕੀ ਚੇਪਾ–ਏਫ਼ਿਸ ਗੌਸਿਪੀ, ਪੱਤਾ ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜਾ–ਲੀਰੀਓਮਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਫ਼ੋਲੀ	90	900	500	5

★★ ਸਾਈਐਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 10.26% ਭ/ਭ ਓਡੀ ਵਿੱਚ ਵਜਨ / ਵਾਲਿਊਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾ. ਕਿਰਿਆਸੀ ਤੱਤ. ਪ੍ਰਤਿ ਲੀਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ : ਸਪ੍ਰੇ ਘੋਲ ਲੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਲਓ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜੇ ਲਈ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਦੋ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਦਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੀੜੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ / ਪੌਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਲਾਰਵਿਆਂ/ਨਿੰਫ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੀੜੇ ਖਾਣੋ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਜ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਛਿੜਕਾਅ ਉਪਕਰਨ : ਹਾਈ ਵਾਲਿਊਮ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵਰਤੋ ਜਿਵੇਂ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਤਾਈਵਾਨ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ, ਫ਼ੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਆਦਿ, ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਇਕਸਾਰ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਗਰੁੱਪ	28	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਸਾਈਐਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ 28 ਦੇ ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਆਈਆਰਐਮ) ਪੱਧਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾ (ਗਰੁੱਪ 28 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) ਨਾ ਵਰਤੋ
- ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਟ੍ਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ੨ ਛਿੜਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਟ੍ਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ੩੦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ।
- ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ (ਗੈਰ ਗਰੁੱਪ 28 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
- ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਇਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟ੍ਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ੩ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਰਤੋ।
- ਸਾਇੰਟ੍ਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਸੁਝਾਈ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤੋ।
- ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟ੍ਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : 1. ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 2. ਦਵਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਵਚਾ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾ ਲਓ। 3. ਸੁਰੱਖਿਆਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਲੰਮੀ ਪੈਂਟ, ਰਸਾਇਣ ਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ, ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ। 4.ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰੜਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋ। 5. ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਵਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। 6. ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾ ਹੀ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ।

ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ: ਜੇ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ੧ ਜਾਂ ੨ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਚਾਹੇ। **ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ:** ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। **ਚਮੜੀ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:** ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਗ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। **ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:** ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸੇ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ: ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਖੰਗਾਲ ਕੇ, ਖੰਗਾਲਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪ੍ਰੇ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਲਓ। 2. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 3.ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 4. ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਚ ਰਹੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਖੰਘਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਟੋਰੇਜ : 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। 2. ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ, ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਜਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਤਵਚਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ :	% ਭ/ਭ
ਸਾਈਐਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ ਕਿ.ਤ. :	10.26
ਡੋਡੀਸੀਲ ਬੇਨਜ਼ੀਨ ਸਲਫ਼ੋਨੇਟ ਇਨ ਮੇਥਾਈਲੇਟਡ ਅਤੇ	
ਈਥੋਕਸੀਲੇਟਡ ਬੀਜ ਤੇਲ:	25.00
ਪੋਲੀਔਕਸੀਥਾਈਲੀਨ ਸੋਰਬੀਟੋਲ ਫ਼ੈਟੀ ਏਸਿਡ:	5.00
ਫ਼ਿਊਮਡ ਸਿਲੀਕਾ:	1.31
ਸਿਟ੍ਰਿਕ ਏਸਿਡ:	0.02
ਪਾਣੀ:	4.11
ਮੇਥਾਈਲੇਟਡ ਬੀਜ ਤੇਲ :	ਕਿਊ.ਐਸ.
ਕੁੱਲ :	100.00

ਨਿਰਮਾਤਾ : ਐਫ਼ਐਮਸੀ ਇੰਡਿਯਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਟੀਸੀਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਯਲ ਸੈਂਟਰ, 2ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸੀ-੫੩, ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਾਂਦਰਾ(ਪੂ), ਬਾਂਦਰਾ ਸਬਰਬਨ, ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦੦੯੮, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ। **ਫ਼ੈਕਟਰੀ:** ਪਲਾਟ ਨੰ.11, ਜੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਸਾਵਲੀ, ਪਿੰਡ: ਮੰਜੂਸਾਰ, ਜ਼ਿਲਾ: ਵਡੋਦਰਾ-391775, ਗੁਜਰਾਤ ।

বেনেভিয়া®

সায়ানট্রানিলিপ্রোল ১০.২৬% ওজন/ওজন ওডি
অর্ন্তবাহী স্পর্শজনিত কীটনাশক

এক্ষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যানথ্রানিলিক ডায়ামাইড কীটনাশক যা চিবানো এবং চুষা কীট উভয় ক্ষেত্রেই সমান কার্যকরি। এটি একটি পোকার শারীরিক প্রণালী নির্ভর পদ্ধতিগত কীটনাশক যা পোকার শরীরের স্পর্শে এবং ভিতরে প্রবেশ করে কাজ করে

সতর্কীকরণ - এই দ্রব্যটি জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং মৌমাছিদের জন্য বিষাক্ত, তাই জলাশয়ের কাছে বা মৌমাছিদের খাবার সংগ্রহের সময় এর ব্যবহার না করাই ভালো।

সুপারিশ:

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	পরিমাণ প্রতি হেক্টর			অপেক্ষার সময় (দিন)
		স.উ. (গ্রাম %Conc.)	প্রস্তুতি (মিলি %Conc.)	জলে দ্রবনিয়তা (লিটার)	
আঙুর	থ্রিপস-স্কির্টোথ্রিপস ডরসালিস্ ফ্লি বিটল্ পোকা স্কেলোডোনটা স্ট্রিগিকলিস্	৭০	৭০০	১০০০	৫
ডালিম	থ্রিপস-স্কির্টোথ্রিপস ডর্সালিস ডালিম প্রাজাপতি ডিউডোরিক্স আইসোক্র্যাটিস্	৭৫ (০.০০৭৫%)	৭৫০ (০.০৭৫%)	১০০০	৫
	সাদা মাছি সিফোনিনাস্ ফিলিরিয়ে আফিড্স্-আফিস পিউনিসিয়ে	৯০ (০.০০৯%)	৯০০ (০.০৯%)		
বাঁধাকপি	বাঁধাকপি-আফিড ব্র্যাভিকরিনে ব্র্যাসিকে সরষে আফিড- লিপাফিস্ এরিসিমি ডায়মন্ড ব্যাকমথ প্লুটেল্লা জাইলোস্টেলা টোবাকো ক্যাটারপিলার- স্পোডোপটেরা লিটুরা	৬০	৬০০	৫০০	৫
কাঁচালঙ্কা	থ্রিপস- স্কিরটোথ্রিপস্ ডরসালিস্ ফল ছিদ্রকারী পোকা - হেলিকোর্ভাপা আর্মিজেরা টোবাকো ক্যাটারপিলার- স্পোডোপটেরা লিটুরা	৬০	৬০০	৫০০	৩
টমাটো	লিফ-মাইনর- লিরিওমাইজা ট্রাইফলি আফিড - অ্যাফিস্ গসিপি থ্রিপস - থ্রিপস্ ট্যাবাসি সাদা মাছি- বেমিসিয়া ট্যাবাসি ফলের পোকা - হেলিকোভার্পা আর্মিজেরা	৯০	৯০০	৫০০	৩
ঘারকিনস্	লিফ মাইনর- লিরিওমাইজা ট্রাইফলি, রেড পাম্পকীন বীটল- আওলাকোফোরা ফোবেইকলিস্, আ্যাফিড্স্-অ্যাফিস্ গসিপি, থ্রিপ্স-থ্রিপ্স পালমি সাদা মাছি-বেমিসিয়া ট্যাবাসি প্যাম্পকীন ক্যাটারপীলার- ডায়াফানিয়া ইন্ডিকা ফ্রুট ফ্লাই - ব্যাকট্রো সেরা কুকুরবিটে	৯০	৯০০	৫০০	৫
ঢেঁড়শ	সাদা মাছি - বেমিসিয়া টাবাটি আ্যফিড - আফিস গসিপি ডগা এবং ফল ছেদক - এরিয়াস ভিটেল্লা, টোব্যাকো ক্যাটারপিলার - স্পোডোপটেরা লিটুরা ফল ছেদক - হেলিকোভারপা আরমিগেরা	৯০	৯০০	৫০০	৩
বেগুন	সাদা মাছি - বেমিসিয়া টাবাটি ডগা এবং ফল ছেদক - লিউসিনোডেস অরবোনালিস, আফিড - আফিস গসিপি থ্রিপ্স-থ্রিপ্স টাবাচি	৯০	৯০০	৫০০	৩
কার্পাস	সাদা মাছি - বেমিসিয়া টাবাটি আফিড - আফিস গসিপি থ্রিপ্স- থ্রিপ্স টাবাচি টোব্যাকো ক্যাটারপিলার - স্পোডোপটেরা লিটুরা শুঁয়োপোকা - হেলিকোভারপা আরমিগেরা এবং এরিয়াস ভিটেল্লা	৯০	৯০০	৫০০	৭
করলা	থ্রিপ্স- থ্রিপ্স পালমি সাদা মাছি - বেমিসিয়া টাবাচি আফিড - আফিস গসিপি কুমরোর শুঁয়োপোকা - ডায়াফানিয়া ইন্ডিকা লিফ মাইনার - লিরিওমাইজ ট্রিফলি	৯০	৯০০	৫০০	৫
ঝিঙ্গে	থ্রিপ্স- থ্রিপ্স পালমি সাদা মাছি - বেমিসিয়া টাবাচি আফিড - আফিস গসিপি কুমরোর শুঁয়োপোকা - ডায়াফানিয়া ইন্ডিকা লিফ মাইনার - লিরিওমাইজ ট্রিফলি	৯০	৯০০	৫০০	৫
তরমুজ	থ্রিপ্স- থ্রিপ্স পালমি সাদা মাছি - বেমিসিয়া টাবাচি আফিড - আফিস গসিপি লিফ মাইনার - লিরিওমাইজ ট্রিফলি	৯০	৯০০	৫০০	৫

ওওসায়ানট্রানিলিপ্রোল ১০.২৬% ওজন/ ওজন ও.ডি.-এর মধ্যে লিটার পিছু ১০০ গ্রাম সক্রিয় উপাদান আছে ওজন প্রতি আয়তন হিসেবে।

প্রয়োগের সঠিক সময় আর পদ্ধতি : স্প্রে করার সঠিক মাত্রা পাত্রের গায়ে বা সঙ্গে প্রদান করা লেবেলে নির্দেশিত মাত্রা অনুযায়ী করতে হবে এবং স্প্রে করার রাসায়নিক ঘোলটি তৈরী করার চার ঘণ্টার মধ্যেই স্প্রে করা আবশ্যক। ভালো ফল পেতে গেলে সাত থেকে দশ দিনের অন্তরে ফসলের প্রাথমিক অবস্থায় ফসলের উপর সোজাসুজি স্প্রে করতে হবে।

পোকার আক্রমনের লক্ষণ দেখা দিলেই স্প্রে করতে হবে, পোকার বংশ বৃদ্ধি শুরু হওয়ার আগেই। স্প্রে করার লক্ষই হলো যাতে পোকার লার্ভা অবস্থায় যখন অনেক বেশী পরিমাণে তাদের খাদ্যের প্রয়োজন সেই সময় তারা যেন ফসলের খুব বেশী ক্ষতি করতে না পারে, সাথ সাথ এদের দ্বারা ভাইরাস বা না না ধরণের রোগ জীবাণু থেকে আপনার ফসলকে বাঁচাতে পারেন এবং দারুন ফসল আশা করতে পারেন।

স্প্রে করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম : বেশী মাত্রায় স্প্রে করার জন্যে ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, তাইওয়ান স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার ইত্যাদি করবেন যাতে ভালো এবং সমানভাবে সম্পূর্ণ ফসলের উপর স্প্রে করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ ম্যানেজমেন্ট

গ্রুপ	২৮	কীটনাশকে

সায়ানট্র্যানিলিপ্রোল এর অন্যান্য গ্রুপ ২৮ কীটনাশকের বার বার এবং এককভাবে ব্যবহারের ফলে কিছু ফসলের মধ্যে পোকা প্রতিরোধী ক্ষমতা উন্নয়ন হতে পারে। পোকার কীটনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে আটকাতে কীটনাশক প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (আইআরএম) অনুসরণ করতে হবে।

- ফসলের একই কীট প্রজাতির প্রতি প্রজন্মের ওপর সায়ানট্র্যানিলিপ্রোল এর অন্যান্য গ্রুপ ২৮ কীটনাশক ২ বারের বেশী প্রয়োগ করবেন না।
- একটি ফসলের প্রতি উৎপাদনে ধারাবাহিকভাবে ২ বারের বেশী সিয়ানট্র্যানিলিপোলে ব্যবহার করবান না। যদি একটি উৎপাদনে সম্ভব না হয়, তাহলে ৩০ দিন সময়কালে আরো একবার সিয়ানট্র্যানিলিপোলে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পরবর্তি প্রজন্মের নির্দিষ্ট কীটের ওপর অবশ্যই একটি কার্যকরি প্রোডাক্ট অন্য পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে (২৮ কীটনাশকের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন)।
- ফসল চক্রে ৩ বারের বেশী সিয়ান্ট্রানিলিপোলে ব্যবহার করবেন না।
- লেবেল রেটের পরামর্শের কম সিয়ান্ট্রানিলিপোল ব্যবহার করবেন না।
- প্রতি ফসলে পরামর্শ অনুযায়ী সিয়ানট্রানিলিপোল দ্রব্য ব্যবহার করুন।

সতর্কতা : ১. খাবার, খাবারের খালি পাত্র এবং পশুদের খাদ্য থেকে দূরে রাখুন। ২. কীটনাশক স্প্রেয়ের ধোঁয়া থেকে মুখ, চোখ, ত্বককে বাঁচিয়ে রাখুন এবং নিঃশ্বাসে যাতে চলে না যায় লক্ষ্য রাখুন। ৩. প্রতিরক্ষামূলক জামাকাপড় যেমন ফুলহাতা শার্ট, ফুল প্যান্ট, কেমিক্যাল প্রতিরোধকারী গ্লাভস্, জুতো ও মোজা ব্যবহার করুন ৪. প্রতিরক্ষামূলক চোখ ঢাকা ব্যবহার করুন কারন দ্রব্যটি সামান্য চোখের জন্য যন্ত্রনাদায়ক। ৫.ব্যবহারের পর ভালো করে দূষিত পোষাক ও শরীর ধুয়ে নেবেন। ৬. প্রয়োগের সময় খাবেন না, পান করবেন না, ধূমপান করবেন না।

প্রাথমিক চিকিৎসা : যদি মুখে চলে যায় - যদি ব্যাক্তি সচেতন থাকে তবে মুখ ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এবং ১ বা ২ গ্লাস জল খেতে দিতে হবে। অচৈতন্য ব্যক্তিকে কিছু খাওয়াতে যাবেন না। ডাক্তার ডাকুন। বমি করানোর চেষ্টা করবেন না যদি না তা প্রয়োজন পরে, চিকিৎসকের সাহায্য নিন। যদি নিঃশ্বাসে চলে যায় - রোগীকে খোলা হাওয়ায় নিয়ে যান এবং শরীরের তাপমাত্রার ওপর লক্ষ্য রাখুন। রোগী যদি শ্বাস না নেয় বা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহলে কৃত্তিম উপায়ে শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করুন, বিশেষত, মুখে মুখে শ্বাস প্রদান ক্রিয়া। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। যদি ত্বকে লেগে যায় - লেগে যাওয়া জায়গা অনেক জল ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। এমন কি চুল ও নখের ভেতরও। যদি ব্যাথা হয়, লাল হয়ে যায় বা জ্বালা করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সমস্ত লেগে যাওয়া জামা কাপড় আলাদা রাখতে হবে। পুনরায় ব্যবহারের আগে ভালো করে সাবান জলে ধুয়ে নিতে হবে। চোখে চলে গেলে - কমকরে ১৫ মিনিট ধরে চোখ জলে ধুতে হবে। যদি ব্যাথা হয়, জ্বালা করে, লাল হয় বা ঝাপসা দেখে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রতিষেধক: সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

খালি প্যাকের বিনষ্টিকরণ: ১.খালি প্রাত্র কখনই পুনর্ব্যবহার করবেন না। পাত্র তিনবার জলে ধুয়ে ফেলতে হবে, এবং ধোয়া জল স্প্রে মিক্সে মিশিয়ে নিতে হবে। ২.খালি প্যাক ভেঙ্গে, জনবসতী থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে। ৩.ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে তা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৪.প্যাক বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন ধোয়াধুয়ি করা তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে যাতে পরিবেশগত এবং জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়।

সংগ্রহস্থল : ১. কীটনাশক ধারণকারী প্যাকেজ শিশু এবং পশু খাদ্যের নাগালের বাইরে পৃথক আলমারিকে তালা চাবি দিয়ে রাখতে হবে। অন্য সামগ্রি জমা করার জন্য কক্ষ ব প্রাঙ্গন পৃথক কক্ষে সংরক্ষণ করতে হবে। ২. কীটশাশক সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কক্ষটি অবশ্যই ভালো করে বানানো, শুকনো, ভালো করে দরজা লাগানো, বায়ু চলাচলের উপযোগী এবং যথেষ্ট জায়গা নিয়ে তৈরী করতে হবে যাতে ঐ বাষ্প থেকে এড়ানো যায়।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : সামান্য চোখ জ্বালা করতে পারে। দীর্ঘায়িত বা ঘন ঘন চামড়ায় লাগলে কিছু ব্যক্তির এলার্জি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

রাসায়নিক উপাদান	**% ওজন*ওজন**
সায়ানট্রানিলিপ্রোল এ.আই.	১০.২৬
ডোডেসিলবেনজিন সালফোনেট মেথিলেটেড আর	
ইথক্সিলেটেড বীজ তেল	২৫.০০
পলিঅক্সিএথিলিন সরবিটল ফ্যাটি এ্যাসিড	৫.০০
বাস্পগত সিলিকা	১.৩১
সাইট্রিক এ্যাসিড	০.০২
জল	৪.১১
মেথিলেটেড বীজ তেল	পরিমাণ মতো
মোট	১০০.০০%

প্রস্তুতকর্তা : এফএমসি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, টিসিজী ফাইনেন্সিয়েল সেংটর, ২ম তল, সী-৫৩, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পু.), বান্দ্রা সবর্বন, মুম্বই - ৪০০০৯৮, মহারাষ্ট্র। **ফ্যাক্টরি:** প্লট নং. ১১, জি.আই.ডি.সি., সাভলি, গ্রাম: মঞ্জুসার, জেলা: ভাদোদরা-৩৯১৭৭৫, গুজরাট।

ಬೆನೆವಿಯಾ®

ಸಿಯಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 10.26% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓಡಿ
ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ ಕೀಟನಾಶಕ

ಸಿಯಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 10.26% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓಡಿ ಒಂದು ಎಂಥ್ರನಿಲಿಕ್ ಡೈಅಮೈಡ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜಗಿಯುವ ಮತ್ತು ರಸಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಜಲಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೇನುಹುಳಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಜೀವಿಗಳ ಕೃಷಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಜೇನುಹುಳಗಳ ಮೇಯುವ ಸಕ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು :

ಬೆಳೆಗಳು	ಕೀಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ			ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಗ್ರಾ. ಸ.ಘ. % ಸಾರತೆ	ಸೂತ್ರಿಕರಣ % ಸಾರತೆ	ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರು(ಲೀಟರ್)	
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ–ಸ್ಕಿರಿಯೊಟೊಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಡೊರ್ಸಾಲಿಸ್, ಬಂಗಾರು ದುಂಬಿ– ಸ್ಕೆಲೆಡೊಂಟಾಸ್ಟ್ರಿಗಿಕೊಲಿಸ್	70	700	1000	5
ದಾಳಿಂಬೆ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ –ಸ್ಕಿರಿಯೊಟೊ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಡೊರ್ಸಾಲಿಸ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಪತಂಗ – ಡ್ಯುಡೊರಿಕ್ಸ್ಐಸೊಕ್ರೇಟ್ಸ್,	75 (0.0075%)	750 (0.075%)	1000	5
	ಬಿಳಿ ನೊಣ – ಸೈಫೊನೈನಸ್ ಫಿಲಿರೀಮಿ, ಗಿಡಹೇನು–ಎಫಿಸ್ ಪುನಿಕೇ	90 (0.009%)	900 0.09%)	1000	5
ಎಲೆ ಕೋಸು	ಎಲೆಕೋಸು ಹೇನು – ಬ್ರಾವಿಕೊರಿನೆಬ್ರಾಸಿಯೇ, ಸಾಸಿವೆ ಹೇನು – ಲಿಪಫಿಸೆರಿಮಿ, ವಜ್ರದ ಗುರುತಿನ ಬೆನ್ನುಳ ಚಿಟ್ಟೆ – ಪ್ಲುಟೆಲಾಕ್ಸಿಯೊಸ್ಟೆಲ್ಲಾ, ರಬ್ಬರ ಹುಳು – ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾಲಿಟುರೆ	60	600	500	5
ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ – ಸ್ಕಿರಿಯೊಟೊಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಡೊರ್ಸಾಲಿಸ್, ಕಾಯಿ ಕೊರಕ – ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ, ರಬ್ಬರ ಹುಳು – ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾಲಿಟುರೆ	60	600	500	3
ಟೊಮೇಟೊ	ರಂಗೋಲಿ ಹುಳು– ಲಿರಿಯೊಮೈಝುಟ್ರಿಫೊಲಿ, ಗಿಡಹೇನು –ಎಫಿಸ್ ಗೊಸ್ಸಿಪಿ, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ –ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಬಾಸಿ, ಬಿಳಿನೊಣ–ಬೆಮಿಸಿಯಾಟಬಾಸಿ, ಕಾಯಿ ಕೊರಕ– ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ	90	900	500	3
ಮಿಡಿ ಸವತೆ	ಎಲೆ ಸುರಂಗವಾಸಿ ಹುಳು – ಲಿರಿಯೊಮೈಸಟ್ರಿಫೊಲಿ, ಗಿಡಹೇನು – ಎಫಿಸ್ ಗೊಸ್ಸಿಪಿ, ಕೆಂಪು ಕುಂಬಳ ದುಂಬಿ – ಡೌಲಕೊಫೊರಾಫೊವೈಕೊಲ್ಲಿಸ್, ಥ್ರಿಪ್ –ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಪಾಲ್ಮಿ, ಬಿಳಿನೊಣ –ಬೆಮಿಸಿಯಾಟಾಬಾಸಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಂಬಳಿಹುಳ– ಡೈಯಾಫೇನಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ– ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರೊಸಿರೆಕ್ಯುಕುರ್ಬಿಟೇ	90	900	500	5
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಬಿಳಿನೊಣ –ಬೆಮೀಸಿಯಾ ಟಬಾಕಿ ಗಿಡಹೇನು– ಎಫಿಸ್ ಗಾಸಿಪೀ ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಕೊರಕ– ಈರಿಯಾಸ್ ವಿಟೆಲ್ಲಾ, ರಬ್ಬರ/ ಲದ್ದಿಹುಳ–ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ ಕಾಯಿಕೊರಕ– ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ	90	900	500	3
ಬದನೆ	ಬಿಳಿನೊಣ –ಬೆಮೀಸಿಯಾ ಟಬಾಸಿ ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಕೊರಕ– ಲ್ಯೂಸಿನೋಡೆಸ್ ಓರ್ಬೋನಾಲಿಸ್ ಗಿಡಹೇನುಗಳು– ಎಫಿಸ್ ಗಾಸಿಪೀ ಸೀರು – ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಬಾಸಿ	90	900	500	3
ಹತ್ತಿ	ಬಿಳಿನೊಣ –ಬೆಮೀಸಿಯಾ ಟಬಾಕಿ, ಗಿಡಹೇನುಗಳು– ಎಫಿಸ್ ಗಾಸಿಪೀ ಸೀರು – ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಬಾಸಿ, ರಬ್ಬರ/ ಲದ್ದಿಹುಳ–ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ ಕಾಯಿ ಕೊರಕಗಳು– ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ ಮತ್ತು ಈರಿಯಾಸ್ ವಿಟೆಲ್ಲಾ	90	900	500	7
ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ	ಸೀರು –ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಪಾಮ್ಮೈ, ಬಿಳಿನೊಣ –ಬೆಮೀಸಿಯಾ ಟಬಾಕಿ, ಗಿಡಹೇನುಗಳು– ಎಫಿಸ್ ಗಾಸಿಪೀ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಂಬಳಿಹುಳ– ಡೈಯಾಫೇನಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ,ರಂಗೋಲಿ ಹುಳ– ಲಿರಿಯೋಮೈಸ್ ಟ್ರೈಫೋಲೈ	90	900	500	5
ಹೀರೆಕಾಯಿ	ಸೀರು –ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಪಾಮ್ಮೈ, ಬಿಳಿನೊಣ –ಬೆಮೀಸಿಯಾ ಟಬಾಕಿ, ಗಿಡಹೇನುಗಳು– ಎಫಿಸ್ ಗಾಸಿಪೀ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಂಬಳಿಹುಳ– ಡೈಯಾಫೇನಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ,ರಂಗೋಲಿ ಹುಳ– ಲಿರಿಯೋಮೈಸ್ ಟ್ರೈಫೋಲೈ	90	900	500	5
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು	ಸೀರು – ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಪಾಮ್ಮೈ, ಬಿಳಿನೊಣ –ಬೆಮೀಸಿಯಾ ಟಬಾಕಿ, ಗಿಡಹೇನುಗಳು– ಎಫಿಸ್ ಗಾಸಿಪೀ, ರಂಗೋಲಿ ಹುಳ– ಲಿರಿಯೋಮೈಸ್ ಟ್ರೈಫೋಲೈ	90	900	500	5

*ಸಿಯಾಂಟ್ರನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 10.26% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ/ಪರಿಮಾಣದ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾ. ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ ವಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ : ಕೇವಲ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ, ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದರಂತೆ, ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಚಕ್ರದ ಆದಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7-10 ದಿನಗಳ ಅಂತರಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ. ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಟಗಳ ದಟ್ಟತೆ ನೆಲೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಅವುಗಳ ಹಾವಳಿ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಸಿಂಪರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಮರಿಹುಳುಗಳು/ ಅಪ್ಸರೆ ಕೀಟಗಳತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಭಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಇದರಿಂದ ಕೀಟವಾಹಕವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸಬಲ್ಲ ವೈರಾಣು ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಪ್ರಮೇಯ ಉಂಟಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಪರಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಂತಹ ಅಧಿಕ ಸಿಂಪರಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಏಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿಂಪರಣೆ ದೊರೆಯುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿ.

ಕೀಟಗಳ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ :

ಗ್ರೂಪ್	28	ಕೀಟನಾಶಕ

ಸಿಯಾಂಟ್ರನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಗ್ರೂಪ್ 28 ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಗೂ ಏಕಮಾತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕೀಟಗಳ ಸಮೂಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಕೀಟಗಳ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಐಆರ್‌ಎಮ್)ಯ ಉಪಾಯವನ್ನು, ಈ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

- ಒಂದರ ನಂತರ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕೀಟಗಳ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನ (ಗ್ರೂಪ್ 28 ಕೀಟನಾಶಕ) ಹೊಂದಿದ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಕೀಟ ಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಯಾನ್ಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್‌ನ್ನು 2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಎಡೆಬಿಡದ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾನ್ಟ್ರಾನಿಪ್ರೊಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸುಮಾರು 30 ದಿನದ ಸಕ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಾಂತರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಿಸಿದ ಕೀಟಗಳ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದ (ಗ್ರೂಪ್ 28 ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಸೇರದವು) ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ.
- ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಚಕ್ರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬಳಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸ್ಯಾನ್ಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್‌ನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಿತ ದರದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾನ್ಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್‌ನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಪರಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪರಣಾ ಹನಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಕೀಟನಾಶಕ ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. 3. ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಪ್ಯಾಂಟ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಕೈಚೀಲ, ಬೂಟು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಚೀಲಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂಗಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 4. ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಕೆರೆತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 5. ಪ್ರಯೋಗ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 6. ಕೀಟನಾಶಕ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ : ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಬಳಿಕ 1 ಅಥವಾ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. **ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಸೇರಿದಲ್ಲಿ:** ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ರೋಗಿಯ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರು ಜಿಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದಲ್ಲಿ:** ಔಷಧ ತಗುಲಿದ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇರಳನೀರು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಉರಿ ವಾಸಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. **ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ** : ಕನಿಷ್ಠ15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೋವು, ಕೆಂಗಣ್ಣು, ಉರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ನೋಡಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ : 1. ಖಾಲಿ ಡಿಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಮರು ಬಳಸಬಾರದು. ಈ ಡಿಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ತೊಳೆದು, ಆ ತೊಳೆನೀರನ್ನು ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2.ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. 3. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರುಉಪಯೋಗಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 4. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕಳಿದ ಪದಾರ್ಥ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರು– ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕವಿರುವ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಟಕದಂತೆ, ಜಾನುವಾರು, ಪಶು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 3. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು. ಹಬೆಯಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದಂತಾಗಲು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣುರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :	**% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ**
ಸಿಯಾಂಟ್ರನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ ಸ.ಘ.	10.26
ಮಿಥಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಡ್	25.00
ಆಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೊಡೆಸೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	5.00
ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿ ಇಥಿಲಿನ್ ಸಾರ್ಬಿಟೋಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್	1.31
ಫ್ಯೂಮ್ಡ್ ಸಿಲಿಕಾ	0.02
ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್	4.11
ಮಿಥಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.
ಒಟ್ಟು	100.00

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಫ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ ಲಿ., ಟಿಸಿಜಿ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ-53, ಬಾಂದ್ರಾಕುರ್ಲಾಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪೂ), ಬಾಂದ್ರಾಸಬರ್ಬನ್, ಮುಂಬಯಿ-400098, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. **ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ:** ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 11 ಜಿಐಡಿಸಿ, ಸಾವ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ : ಮಂಜುಸಾರ್, ಜಿಲ್ಲೆ : ವಡೋದರ-391 775, ಗುಜರಾತ್.

APPLY 2 TIMES

Benevia®
INSECTICIDE

powered by CYAZYPYR® ACTIVE INGREDIENT

FMC

Benevia® and Cyazypyr® are trademarks of FMC Corporation or an affiliate

To verify the authenticity of the product, send the alphanumeric code on Izon® by sms to + 91-9211700500.

FMC

Customer Cell ✆ : **1800 102 6545** or
✉: **Ask@fmc.com** or write us at
FMC India Private Limited,
TCG Financial Centre, 2nd Floor,
C-53, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Bandra Suburban,
Mumbai – 400098, Maharashtra.