కొరజన్®

క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% బ/బ ఎస్‌సి

(విస్తృత చర్య గల కీటకనాశిని)

క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు ఎస్‌సి (20%డబ్ల్యు /వి) అనేది అంత్రనిలిక్ డై ఎమైడ్ ఓ కొత్త విస్తృత చర్య గల కీటకనాశి, దీన్ని వరి, క్యాబేజీ, పత్తి, చెరకు, టమాట, మిరప, సోయాబీన్, వంగ, కంది, శనగ, మినుము, కాకర, బెండ, మొక్కజొన్న మరియు వేరుశనగ పంటలనాశించే చీడపీడలను అరికట్టుటకై సిఫారసు చేయబడుతుంది.

పంట	పిడపేడల్ని సామాన్యంగా పిలిచేపేరు	హెక్టారుకు మోతాదు స.ప. (గ్రాముల్లో)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.లలో)	వాడాల్సిన నీటి మోతాదు (లీటర్లలో)	చివరి స్ప్రే నుండి కోతకాలం వరకూ వేచివుండాల్సిన సమయం (రోజుల్లో)
వరి	కాండముతొలుచు పురుగులు మరియు ఆకుముడత పురుగులు లేదా ఆకుచుట్టు పురుగులు లేదా నాముతెగులు	30	150	500	47
క్యాబేజీ	డైమండ్ బ్యాక్ మాత్ (వజ్రకారపు వీపు పురుగు)	10	50	500	3
ప్రత్తి	కాయతొలుచు పురుగులు ఈలనత్త పురుగులు లేదా మచ్చల పురుగులు పొగాకులద్దె పురుగులు	30	150	500	9
చెరకు	చెద పురుగులు పీక పురుగులు మొవ్వచచ్చు పురుగులు లేదా దవ్వచచ్చు పురుగులు లేదా దవ్వతొలుచు పురుగులు	100-125 75 75	500-625 375 375	1000 1000 1000	208
టమోటా	కాయతొలుచు పురుగు (హెలికోవెర్ప ఆర్మిగెరా)	30	150	500	3
మిరప	కాయతొలుచు పురుగు (హెలికోవెర్ప ఆర్మిగెరా, గొంగళిపురుగులు స్పొడొప్టెరా లిటురా, స్పొడొప్టెరా ఎక్సిగుఆ)	30	150	500	3
సోయాబీన్	దాసరి పురుగు (క్రిసోడెక్సిస్ ఎక్యుటా), కాండము ఈగ, పెంకు పురుగు	30	150	500-750	29
వంకాయ	కాండము మరియు కాయతొలుచు పురుగు	40	200	500-750	3
కంది	కాయతొలుచు పురుగు (హెలికోవెర్ప ఆర్మిగెరా), కాయఈగ (మెలానొగ్రొమిజా ఒబ్ట్యూసా)	30	150	500-750	22
శనగ	కాయతొలుచు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిగెరా, స్పొడొప్టెరా జాతి)	25	125	500	11
మినుము	కాయతొలుచు (మరోకా జాతి, స్పొడొప్టెరా జాతి)	20	100	500	20
కాకర	కాయతొలుచు మరియు ఆకుతినే గొంగళిపురుగులు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిగెరా, డయాఫానియా ఇండికా)	20-25	100-125	500	7
బెండ	కాయతొలుచు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిగెరా, ఇరియాస్ విటెల్లా	25	125	500	5
మొక్కజొన్న	మచ్చల మొవ్వు పురుగు (ఛిలో పార్టెలస్) గులాబి రంగు పీకపురుగు (సెసమియా ఇన్ఫెరెన్స్)	40	200	500	10
వేరుశనగ	పొగాకులద్దె పురుగులు	30	150	500	28

ఒక కిలోగ్రామ్ క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% ఎస్‌సి నందు 185 గ్రాముల క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ టెక్నికల్ స.ప. కలదు.

ఈ కరపత్రంలో సూచించబడ్డ పంటలకు తప్ప, వేరే పంటలకు దీన్ని వాడరాదు

వాడుకకు సూచనలు: (వాడే విధానము మరియు వాడే సమయము).

చెరకు: చెరకు పంటను సర్వనాశనం చేసే చెద పురుగులు మరియు పీక పురుగులు, అలాగే మొవ్వచచ్చు పురుగులు లేదా దవ్వతొలుచు పురుగుల్ని అరికట్టుటకై పురుగులు పాదిగే 3వ, 4వ మరి 5వ దశను అరికట్టుటకై జూన్ నెలలో నేలతడుపుడుగా లేదా మొక్క తడుపుడుగా దీన్ని వాడాలని సిఫారసుచేయబడుతుంది.

ఇతర పంటలు: (వరి, పత్తి, వరి, క్యాబేజీ, టమాట, మిరప, సోయాబీన్, వంగ,కంది, శనగ, మినుము, కాకర, బెండ, మొక్కజొన్న మరియు వేరుశనగ) దీన్ని ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయి వద్ద కీటకాల సంఖ్యను అరికట్టుటకై పంటపై పిచికారి చేసుకోవాలి.

పిచికారి పరికరాలు: న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్.

ఐఆర్‌ఎసి గ్రూప్ కోడ్ : 28

చర్యవిధానము: రైనోడైన్ రిసెప్టర్ మాడ్యులేటర్స్

కెమికల్ సబ్‌గ్రూప్: అంత్రానిలిక్ డైఎమైడ్స్

మొక్కలపై విషప్రభావము: సిఫారసుచేయబడిన రీతిలోని మోతాదులలో వాడితే, మొక్కలపై ఏ విషప్రభావం వుండదు.

ఐఆర్‌ఎమ్ ప్రకటన: లేబుల్‌లో సూచించిన విధంగా పంటలు మరి వాటి నాశించే కీటకాల విషయంలో ప్రత్యేకించి వివరణ ఇవ్వబడి వుంటే తప్ప, క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% ఎస్‌సి మరియు గ్రూపు 28 కీటకనాశనుల వలన కీటకాలను తట్టుకోగల శక్తి పెరగకుండా అరికట్టుటకు మరియు ఆలస్యం చేయుట కోసం ఈ క్రింద నివ్వబడిన సూచనలను పాటించాలి. అవేమంటే: ● క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% ఎస్‌సి లేదా ఇతర గ్రూప్ 28 కీటకనాశనులను విండో అంటే, కీటకాల ప్రవేశ మార్గాన్ని అరికట్టే విధంగా వాడినట్లయితే అదే చర్య విధానంతో ఆ తరువాయి తరంలో అంటే రాబోయే కీటకాలను కూడా అరికట్టుకోవచ్చు. కీటకాల తరం ఒకటే అయితే క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5% ఎస్‌సి తిరిగి వాడితే మంచి ఫలితం వుంటుంది. ఇలా విండో వాడకాన్ని తిరిగి వాడినట్లయితే వివిధ చర్యల విధానాలతో కీటకాలను అతిప్రభావవంతంగా అరికట్టుకోవచ్చు. ● ఈ విండో వాడకం యొక్క గడువు, గురిచూపబడిన కీటకాల యొక్క ఒక తరంనకు సమానంగా వుండాలి. గ్రూప్ 28 యాక్టివ్ విండోస్ యొక్క పూర్తి ప్రభావపు గడువు పంట యొక్క కాలచక్రంలో (అంటే; విత్తనాలు విత్తినప్పటి నుండి కోత కాలం వరకూ) 50% కన్నా అధిగమించరాదు. ● ఐపిఎమ్ (సమగ్ర సస్యరక్షణ యాజమాన్య) పద్ధతులనన్నింటిని సమగ్రంగా అనుసయిస్తూ వుండాలి. ● క్షేత్రస్థాయి సామర్ధ్య క్షీణతకు కీటక సంతతి జనాభాను పర్యవేక్షణ చెయ్యాలి.

ముందుజాగ్రత్తలు: 1. మందు చీటి మరియు కరపత్రంలో ఇవ్వబడిన సూచనలను బాగా చదివి, వాటిని తప్పక పాటించాలి. ఒకవేళ ఏమైనా విషప్రమాదం సంభవిస్తే, డాక్టర్‌గార్కి చూపించడంకోసం ఖాళీ డబ్బాను, లేబుల్‌ను జాగ్రత్తగా దాచివుంచాలి. 2. దీన్ని పీల్చరాదు. దీన్ని వాడేటప్పుడు చేతికి రబ్బర్ తొడుగులు, కళ్ళకు నల్ల కళ్ళద్దాలు, ముఖపు తొడుగు, శరీరానికి గౌనులాంటివి ధరించాలి. దీన్ని చల్లేటప్పుడు గాలి వాటాన్ని చూసుకొని చల్లుకోవాలి. తద్వారా దీని తుంపర్లు మీదపడకుండా కాపాడుకోవచ్చు. 3. దీన్ని చల్లేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, త్రాగటం, పొగత్రాగటం లేదా తమలపాకులు నమలడం మొదలగు పనులు చేయరాదు. 4. స్ప్రే ట్యాంకును 3/4 వంతులకు మించి నింపరాదు. పూడుకుపోయిన నాజిల్‌ను ఏదైనా సన్నని వైరుతో లేదా పిన్‌తో పొడిచి శుభ్రపర్చుకోవాలే గానీ, నోటితో ఊదరాదు. 5. ఒకవేళ ఏమైనా తుంపర్లు శరీరం మీద పడితే, వెంటనే శుభ్రమైన నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. 6. ఈ కీటకనాశనిని చల్లుకున్న వెంటనే బట్టల్ని తీసివేసి శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. 7. ఏదైనా తినడం, త్రాగటం లేదా పొగత్రాగటానికి ముందు మరియు చల్లుకున్న పిదప వెంటనే చేతుల్ని మరియు కప్పుకొనని శరీర భాగాలను శుభ్రపర్చుకోవాలి. 8. కలుషితమైన బట్టల్ని తిరిగి వాడుటకు ముందు తప్పక ఉతుక్కోవాలి. 9. ఈ మందును చల్లేవారు లేదా ఈ మధ్యే చల్లిన వారికి ఏమైనా విషలక్షణాలు కనబడుతుంటే వెంటనే డాక్టర్‌గార్ని సంప్రదించాలి.

నిల్వ మరియు నిర్వహణ: దీన్ని ఆహారపదార్థాలు నిల్వచేసేచోట నిల్వచేయకండి. అలాగే దీని వలన కలుషితమైన ఏరియాలలో ఏదైనా తినడం, త్రాగటం లేదా పొగత్రాగటంలాంటి పనులు చేయరాదు. ఈ కీటకనాశనిని వాటియొక్క ఒరిజినల్ డబ్బాలలోనే నిల్వచేసి వుంచాలి. డబ్బాల మూతగట్టిగా బిగించివుంచి, మంచి గట్టి కట్టడాలలో, చల్లగా, పొడిగాఉన్న, బాగా గాలీ వెలుతురు ప్రసరించే చోట నిల్వచేయాలి. ఇలా నిల్వ చేయడం ద్వారా వీటి ఆవిరి వలన పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఈ కీటకనాశనిగల డబ్బాలను వాటి యొక్క పరిమాణము మరియు నైజాన్నిబట్టి వేరువేరు అలమారాలలో పెట్టి తాళం వేసి బిగించాలి. అంతేగాక దీన్ని ఆహారపదార్థలను, పశువులదాణా, ఇతర కీటకనాశనులు మరియు ఫెర్టిలైజర్స్‌కు దూరంగా నిల్వ చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయు విధానము: ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏ విధంగానూ వాడరాదు. ఖాళీ డబ్బాలను పగులకొట్టి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా 1/2 మీటరు లోతులో గొయ్యి త్రవ్వి పాతిపెట్టాలి. దీన్ని నిల్వచేయడం లేదా పారవేయుట ద్వారా పరిసరాలు, నీరు, నీటి వొనరులు, కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి. దీన్ని చెరువుల్లో, నదులు లేదా వాగుల్లో అలాగే శానిటరీ మురుగు కాలవల్లో వదలరాదు.

రసాయనిక మిశ్రమము :	% బ/బ
క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ స.ప.:	18.5
మిథైల్ మెథాక్రైలేట్ ఎథోక్సిలేటెడ్ : గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమార్	3.0
ఎథిలోని ఆక్సైడ్/ ప్రొపైలేని : ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కోపాలిమార్ మరియు ఎథోక్సిలేటెడ్ ఆల్కహాల్	2.0
అట్టపుల్గైటే క్లే:	1.0
గ్జాంథాన్ బంక:	0.3
1,2 బెంజిసోథియాజోలిన్-3-వన్:	0.1
సిలికాన్ ఎమల్‌సన్:	0.5
ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్:	6.8
నీరు:	తయారీకి చాలినంత
మొత్తం:	100

విషలక్షణాలు: ఓ మోస్తరుగా కళ్ళలో దురదతోపాటు మసక మసకగా వుంటుంది. దీని ఆవిరి పీల్చినట్లయితే, నాసికరంధ్రాలనుంచి నీరు కారుతుంది.

ప్రథమ చికిత్స: చర్మానికి అంటితే: చర్మానికి అంటితే వెంటనే సబ్బుతో, నీటితో శుభ్రపర్చుకోవెను, కంటికి అంటతే, 15 నిమిషాలపాటు శుభ్రమైన నీటితో కడుగుకోవలెను. ఒకవేళ పీల్చతే గాలి, వెలుతురు గల (ప్రదేశంలో) ఉంచవలెను. ఒకవేళ ఇంకా శ్వాస పీల్చుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే కృత్రిమంగా శ్వాస అందించవలెను. ఒకవేళ మ్రింగితే ఒకటి నుండి రెండు గ్లాసుల నీటిని త్రాగించి వాంతి చేయించవలెను. ఒకవేళ అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతి చేయించరాదు. ఇటువంటి పరిస్థితిలో వెంటనే వైద్యునితో చికిత్స చేయించవలెను.

విరుగుడు: విషలక్షణాలనుబట్టి చికిత్స జరిపించాలి.

హెచ్చరిక: లేబుల్/కరపత్రం మీద వున్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడరాదు.

తయారు చేయువారు: ఎఫ్ ఎమ్ సి ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, టిసిజి ఫైనాన్షియల్ సెంటర్, 2వ అంతస్తు, సి-53, బాంద్ర కుర్ల కాంప్లెక్స్, బాంద్ర (తూర్పు) బాంద్ర సబర్బన్, ముంబాయి - 400098, మహారాష్ట్ర. **ఫ్యాక్టరీ:** ప్లాట్ నం.-11, జి. ఐ. డి. సి., సావ్లి, గ్రామం: మంజుసర్, జిల్లా: వదోద్ర-391775, గుజరాత్.

கோராஜென்®

குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% எ/எ எஸ்சி

(பரந்து செயலாற்றும் பூச்சிக்கொல்லி)

குளோரன்ழரானிலிப்ரோல் 18.5%தீ/தீ எஸ்.சி (20% டபுள்யூ/வி) ஒரு நவீன அந்த்ரானிலமைட் பூச்சிக்கொல்லி. இது ஒரு பரந்த செயலாற்றலுள்ள பூச்சிக்கொல்லியாக நெற்பயிர், முட்டைகோசு, பருத்தி, கரும்பு, தக்காளி, மிளகாய், சோயாபீன், கத்தரிக்காய் மற்றும் துவரை (துவரம் பருப்பு), கொண்டைக் கடலை, உளுந்து, பாகற்காய், வெண்டைக்காய், மக்காச்சோளம் மற்றும் நிலக்கடலை செடிகளைத் தாக்கும் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த பயன்படுகிறது.

பயிர்	பூச்சியின் பெயர்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு அளவு தீ.மூ. (கிராம்)	கலவை (மி.லி.)	கரைக்கும் நீர் அளவு (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
நெல்	தண்டு துளைப்பான் (ஸ்கிர்போபாகா இன்செர்டுலாஸ்) மற்றும் இலை சுருட்டுப்புழு (க்நாபாலோரோசிஸ் மெடினாலிஸ்)	30	150	500	47
முட்டைக்கோஸ்	வைரமுதுகு அந்துப் பூச்சி (ப்ளுடெல்லா ஸைலோஸ்டெல்லா)	10	50	500	3
பருத்தி	அமெரிக்கன் காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிசெரா) புள்ளிக்காய்ப்புழு (ஈரியாஸ் விட்டெல்லா) புகையிலைப் புழு (ஸ்போடோப்டெரா லிடுரா)	30	150	500	9
கரும்பு	கரையான் (ஓடோன்டோடெர்மஸ் ஒபேசஸ்/ மைக்ரோடெர்மஸ் ஒபேஸி) இளங் குருத்துப் புழு (கைலோ இன்ஃபஸ்கேடெல்லஸ்) நுனி குருத்துப் புழு (ஸ்கிர்போபாகா எக்ஸெர்ட்டாலிஸ்)	100-125 75 75	500-625 375 375	1000 1000 1000	208
தக்காளி	காய் துளைப்பான் (ஹெலிகோவெர்பா அமிகெரா)	30	150	500	3
மிளகாய்	காய் துளைப்பான் (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிகெரா), புகையிலைப்புழு (ஸ்போடோப்டெரா லிடுரா, எஸ். எக்ஸிகுவா)	30	150	500	3
சோயாபீன்	பச்சைக் காவடிப் புழு (கிரிஸோடெக்ஸிஸ் அகுடா) தண்டு ஈ கிர்டில் வண்டு	30	150	500-750	29
கத்தரிக்காய்	காய் மற்றும் குருத்துப் புழு (லியூசினோய்ட்ஸ் ஆர்போனாலிஸ்)	40	200	500-750	3
துவரை	துவரைக் காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிகெரா) காய் ஈ (மெலனோக்ரோமிஸா அப்ருசா)	30	150	500-750	22
கொண்டைக் கடலை	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிகெரா மற்றும் ஸ்போடொப்டெரா எஸ்பிபி.)	25	125	500	11
உளுந்து	காய்ப்புழு (மாருகா எஸ்பிபி. மற்றும் ஸ்போடொப்டெரா லிடுரா)	20	100	500	20
பாகற்காய்	காய் துளைப்பான் மற்றும் இலைப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிகெரா மற்றும் டையஃபானியா இண்டிகா)	20-25	100-125	500	7
வெண்டைக்காய்	காய் துளைப்பான் (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிகெரா மற்றும் எரியாஸ் விட்டெல்லா)	25	125	500	5
மக்காச்சோளம்	புள்ளியிட்ட தண்டு துளைப்பான் (சிலோ பார்டில்லஸ்)இளஞ்சிவப்பு தண்டு துளைப்பான் (செசாமியா இன்ஃபெரன்ஸ்)	40	200	500	10
நிலக்கடலை	புகையிலைப் புழு (ஸ்போடோப்டெரா லிடுரா)	30	150	500	28

குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% தீ/தீ எஸ்சி ஒரு கிலோ தயாரிப்பில் குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் தீவிர மூலப்பொருள் 185 கிராம் அடங்கியுள்ளது.

இந்த கையேட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பயிர்களைத் தவிர வேறு எதற்கும் இதைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

உபயோக வழிமுறைகள்: (முறை மற்றும் தெளிப்பு காலம்) கரும்பு: கரையான்கள், இளங் குருத்துப் புழு மற்றும் நுனி குருத்துப்புழுவைக் கட்டுப்படுத்த கரும்பு பயிருக்கு கரணை நனைப்பு/மண் நனைப்பு செய்யுங்கள். கரும்பு பயிரில் 3வது, 4வது மற்றும் 5வது நிலை நுனி குருத்துப் புழுவைக் கட்டுப்படுத்த ஜூன் மாதத்தில் மண் நனைப்பாகச் செய்யப்பட வேண்டும்.

இதர பயிர்கள்: (நெல், பருத்தி, முட்டைகோசு, தக்காளி, மிளகாய், சோயாபீன், கத்தரிக்காய், துவரை, கொண்டைக் கடலை, உளுந்து, பாகற்காய், வெண்டைக்காய், மக்காச்சோளம் மற்றும் நிலக்கடலை) பொருளாதார சேத நிலையை பார்த்தவுடன் இலை தெளிப்பாக மருந்தை தெளிக்க வேண்டும். தெளிக்கும் கருவிகள்: நாப்சாக் ஸ்பிரேயர், ஃபூட் ஸ்பிரேயர்.

ஐஆர்ஏசி குரூப் கோட்: 28

செயல்படும் விதம்: ரையானோடைன் ரிசெப்டர் மாடுலேட்டர்ஸ்.

இரசாயன உப குழு: ஆன்த்ரானிலிக் டையமைட்ஸ் தாவரங்களுக்கு விஷத்தன்மை: பரிந்துரைக்கப்படும் அளவில் பயன்படுத்தப்படும் போது எந்த விஷத்தன்மையும் இல்லை.

ஒருங்கிணைந்த எதிர்ப்பு நிர்வாக விளக்கம்: லேபிலில் பயிர்/பூச்சி பிரிவில் எதுவும் தெரிவிக்காத பட்சத்தில் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வழிமுறைகளால் குளோரன்ழரானிலிப்ரோல் 18.5%தீ/தீ எஸ்.சி னுக்கும் 28 குழுமத்தல் உள்ள மற்ற பூச்சிக் கொல்லிகளுக்கும் எதிர்ப்பு தன்மை ஏற்படுவதை தடுக்கவும் எதிர்ப்பு ஏற்படாமல் நீட்டிக்கவும் உதவும். 1] பூச்சிகளின் ஒரு சந்ததியில் பலமுறை ஒரே செயல்முறை கொண்ட குளோரன்ழரானிலிப்ரோல் 18.5%தீ/தீ எஸ்.சி மற்றும் இதர 28 குழும பூச்சி மருந்துகறை பயன்படுத்தாமல் இருக்க சாளர முறையை பயன்படுத்த வேண்டும். 2] குளோரன்ழரானிலிப்ரோல் 18.5%தீ/தீ எஸ்.சி ஒரு பூச்சியின் ஒரு சந்ததி காலத்தில் பலமுறை பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகிறது. சாளர முறையில் குளோரன்ழரானிலிப்ரோல் 18.5%தீ/தீ எஸ்.சி மற்றும் இதர 28 குழும பூச்சிக மருந்துகளை பயன்படுத்திய பின் சுழற்சி முறையில் மற்ற செயல்திறன் உள்ள பூச்சி மருந்துகளை பயன்படுத்தவும். 3] சாளர நாட்களில் தாக்கப்பட வேண்டிய புழுக்களின் ஒரு சந்ததியின் வாழ்நாள் அளவே இருக்க வேண்டும். 28 குழும பூச்சி மருந்துகளின் சாளர நாட்கள் பயிரின் விதை முதல் விளைச்லச வரையிலான நாட்களில் 50% மேல் இருக்கக் கூடாது.

ஒருங்கிணைந்த பூச்சி நிருவாக உத்திகளை ஒட்டுமொத்த பூச்சி ஒழிப்பு திட்டத்தில் ஓர் அங்கமாகச் செயல்படுத்த வேண்டும். கோராஜெனின் கள நிலை செயல்பாட்டில் தொய்வு உள்ளதா என்பதை அறிய பூச்சிகளின் எண்ணிக்கையை கண்காணிக்கவும்.

முன் எச்சரிக்கைகள்: 1. லேபில் மற்றும் குறிப்பேட்டில் உள்ள அனைத்து குறிப்புகளையும் கவனமாகப் படித்து பின்பற்றுங்கள். தற்செயலாக விஷப் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் மருத்துவரிடம் காட்ட டப்பா மற்றும் லேபிலை பத்திரமாக வைத்திருங்கள். 2. டப்பாவில் உள்ள மருந்தை உட்சுவாசிக்காதீர்கள். மருந்தை கலக்கும்போதும், தெளிக்கும்போதும் ரப்பர் கை உறைகள், கண்ணாடிகள், முக கவசம் மற்றும் பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியுங்கள். பூச்சி மருந்து தெளிக்கும்போது காற்றால் மருந்து திவலைகள் உடல் மீது படியாமல் தவிர்த்திடுங்கள். 3. மருந்தை தெளிக்கும்போது எதையாவது சாப்பிடுதல், குடித்தல், புகை பிடித்தல் அல்லது வெற்றிலைப் பாக்கு போடுதல் கூடாது. 4. தெளிப்பு டாங்கை அதன் 3/4 பங்கு கொள்ளளவுக்கு மேல் நிரப்பக் கூடாது. அடைபட்டுள்ள தெளிப்பானின் மூக்குத் துவாரத்தை ஒரு மெல்லிய வயர் அல்லது ஊசியால் துளைத்து சுத்தம் செய்யுங்கள். ஊதி சுத்தம் செய்யாதீர்கள். 5. உடலில் ஏதேனும் மருந்து சிந்தியிருந்தால், நிறைய தண்ணீரால் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். 6. எப்போதுமே பூச்சிக்கொல்லி தெளிப்பு முடிந்ததும் உடலை சுத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் இயன்றவரை விரைவாக குளித்து விடுங்கள். 7. எதையாவது சாப்பிடும், குடிக்கும் முன்பு அல்லது புகை பிடிக்கும் முன்பு கைகள் மற்றும் மூடப்படாது திறந்திருந்த உடல் பாகங்களைச் சுத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள். 8. மாசுபட்ட உடைகளை அகற்றிவிட்டு, மீண்டும் பயன்படுத்தும் முன்பு அவற்றை சுத்தம் செய்யுங்கள். 9. பூச்சிக்கொல்லியைப் பயன்படுத்துகிற அல்லது சமீபத்தில் பயன்படுத் தியுள்ள நபருக்கு ஏதேனும் விஷப் பாதிப்பு அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனே மருத்துவரை அழையுங்கள்.

பத்திரப்படுத்துதல் மற்றும் கையாள்தல்: இந்த பூச்சிக்கொல்லி அருகே உணவு, பானங்கள், குடிநீர் அல்லது புகையிலை வைக்கக் கூடாது. அவை மாசு பட்டுவிடும். பூச்சி மருந்தை அதன் அசல் டப்பாக்களில் மட்டுமே பயன்படுத்துங்கள். பூச்சிக்கொல்லியை டப்பாக்களில் இறுக மூடி வைத்து, மருந்து ஆவியாகி காற்றை மாசுபடுத்தாத விதத்தில் நல்ல கட்டுமானம், குளிர்ச்சி, உலர்வு, நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் போதிய காற்றோட்டமுள்ள இடத்தில் பத்திரமாக வையுங்கள். உணவு, கால்நடைத் தீவனம், இதர பூச்சிக் கொல்லிகள் மற்றும் உரங்கள் வைக்குமிடத்திற்கு அப்பால் பூச்சிக்கொல்லி டப்பாக்களை அலமாரியில் பூட்டி வைக்கவும்.

அப்புறப்படுத்துதல்: பயன்படுத்தியபின் காலி டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடாது. காலி டப்பாக்கள் சிதைக்கப்பட்டு, மனித குடியிருப்புகளுக்கு அப்பால் நிலத்தில் 1/2 மீட்டர் ஆழத்தில் புதைக்கப்பட வேண்டும். மருந்தை பத்திரப்படுத்துதல் அல்லது அப்புறப்படுத்துவதன் மூலம் சுற்றுப்புறச் சூழல், தண்ணீர் அல்லது உணவுகளை மாசுபடுத்தி விடாதீர்கள். தரையில் இந்த தண்ணீரை வீசியடிப்பதோ அல்லது ஸானிட்டரி ஸீவர் சிஸ்டத்தில் ஊற்றுவதோ கூடாது.

இரசாயனக் கலவை	% தீ/தீ
குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் தீ.மூ.	18.5
மெதைல் மெதாக்ரைலேட் எதோக்ஸிலேட்டட் க்ராஃப்ட் கோ-பாலிமர்	3.0
எதைலெனெனியோக்ஸைடு/ ப்ரொபைலெனியோக்ஸைடு ப்ளாக் கோ-பாலிமர் மற்றும் எதோக்ஸிலேட்டட் ஆல்கஹால்	2.0
ஆட்டாபல்கைட் க்ளே	1.0
ஷான்தான் கம்	0.3
1,2 - பென்ஜிஸோதியாஜோலின்-3-ஒன்	0.1
சிலிகோன் எமல்ஷன்	0.5
ப்ரொபைலின் கிளைக்கால்	6.8
தண்ணீர்	தேவைக்கேற்ப
மொத்தம்	100

அறிகுறிகள்: கண்பார்வை மங்கல் உடன் லேசான கண் எரிச்சல். ஆவியை உட்சுவாசித்தால் மூக்கில் நீர்சுரப்பு ஏற்படும்.

முதல் உதவி: உட்சுவாசித்து இருந்தால்: உட்சுவாசிப்பதால் எந்த அபாயமும் ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை என்பதால் குறிப்பாக எதும் காட்டப்படுவதில்லை. சருமத்தில் பட்டு இருந்தால்: சருமத்தில் படுவதால் எந்த அபாயத்தையும் ஏற்படுத்த சாத்தியம் இல்லை என்றாலும், கலக்கிய, தெளித்தபின் சருமத்தை சுத்தம் செய்தல் நல்லது. கண்களில் பட்டு இருந்தால்: கண்களில் மருந்து பட்டால் அபாயம் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. ஆனால் கண்ணில் நிறைய தண்ணீரை வாரியிறைத்து சுத்தம் செய்யுங்கள்.

நச்சு முறிவு: அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சைஅளிக்கவும்.

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிலில் / கையேட்டில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடா

உற்பத்தி : எஃப்எம்சி இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், டிசிஜி ஃபைனான்ஷியல் சென்டர், 2வது தளம், இ-53, பாந்திரா குர்லா காம்ப்ளெக்ஸ், பாந்திரா (கி), பாந்திரா சபர்பன், மும்பை - 400098, மகாராஷ்டிரா. தொழிற்சாலை: பிளாட் நெ.11, ஜி.ஐ.டி.சி, சாவ்லி, கிராமம்:மஞ்சுசார், மாவட்டம்: வதோதரா-391775, குஜராத்.

ಕೊರಾಜೆನ್®

ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ

(ವಿಶಾಲಶ್ರೇಣಿಯ ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ (20% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ) ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಎಸ್‌ಸಿ ಒಂದು ನವೀನ ಸಬ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಂಥ್ರಾನಿಲಿಕ್ ಡೈಅಮೈಡ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಿದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಬತ್ತ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹತ್ತಿ, ಕಬ್ಬು, ಟೊಮೇಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೋಯಬೀನ್, ಬದನೆ, ತೊಗರಿ, ಕಡಲೆ, ಉದ್ದು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆ, ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟಗಳನ್ನುನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಬೆಳೆಗಳು	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸ.ಫ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿ.ಲೀ)	ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನೀರು (ಲೀ)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (ಶಿರ್ಪೊಫಾಗಾ ಇನ್‌ಸೆರ್ಟುಲಸ್) ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಳು (ನಾಫಲೊ ಕ್ರೊಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್)	30	150	500	47
ಕ್ಯಾಬೇಜ್	ವಜ್ರಗುರುತಿನ ಬೆನ್ನುಳ್ಳ ಚಿಟ್ಟೆ	10	50	500	3
ಹತ್ತಿ	ಹಸಿರು ಕಾಯಿಕೊರಕ (ಹೆಲಿಕೊ ವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ) ಚುಕ್ಕೆಯುಳ್ಳ ಕಾಯಿಕೊರಕ (ಈರಿಯಸ್ ವಿಲೆಲ್ಲಾ), ರಬ್ಬರ (ಲದ್ದಿ) ಹುಳು (ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ)	30	150	500	9
ಕಬ್ಬು	ಗೆದ್ದಲು ಹುಳು (ಒಡೊಂಟೊಟರ್ಮಿಸ್ ಒಬೆಸಸ್/ ಮೈಕ್ರೊಟರ್ಮಿಸ್ ಒಬೆಸಿ), ಮೊದಲು ಬರುವ ಸುಳಿಕೊರಕ (ಸುಳಿ ಬಾಳುವದು) (ಚೈಲೊ ಇನ್ ಫುಸ್ಕಾಟೆಲ್ಲಸ್) ತುದಿ ಕೊರಕ (ಸರ್ಪೊಫಗಾ ಎಕ್ಸೆರ್ಪಾಟಲಿಸ್)	100-125 75 75	500-625 375 375	1000 1000 1000	208
ಟೊಮ್ಯಾಟೋ	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)	30	150	500	3
ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)	30	150	500	3
ಸೊಯಾಬೀನ್	ಹಸಿರು ಕೊಂಡಿ ಕೀಟ, (ಕ್ರೈಸೊಡೆಕ್ಸಿಸ್ ಆಕುಟಾ) ಕಾಂಡ ನೊಣ, ಕಾಂಡ ಸುತ್ತು ದುಂಬಿ	30	150	500-750	29
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಸುಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ (ಲುಸಿನೊಡಸ್ ಒರ್ಬಾನಾಲಿಸ್)	40	200 750	500-	3
ತೊಗರಿ	ಹಸಿರು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ) ಕಾಯಿ ನೊಣ (ಮೆಲಾನೊಗ್ರೊಮೈಜಾ ಆಪ್ಟುಸಾ)	30	150	500-750	22
ಕಡಲೆ	ಹಸಿರು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ) & ರಬ್ಬರ ಹುಳು (ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಸ್ಪೆ)	25	125	500	11
ಉದ್ದು	ಕಾಯಿಕೊರಕ (ಮರುಕಾ ಸ್ಪಿ & ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಸ್ಪಿ) (ಮರುಕಾ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ ಜಾತಿ)	20	100	500	20
ಹಾಗಲಕಾಯಿ	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಹುಳು (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ ಮತ್ತು ಡಯಾಫನಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ)	20-25	100-125	500	7
ಬೆಂಡೆ	ಕಾಯಿಕೊರಕ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ, ಇರಿಯಾಸ್ ವಿಟ್ಟೆಲ್ಲಾ)	25	125	500	5
ಜೋಳ	ಚಿತ್ತಾರದ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (ಚಿಲೊ ಪಾರ್ಟೆಲಸ್) ಪಾಟಲ ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (ಸಿಸೇಮಿಯಾ ಇನ್‌ಫೆರೆನ್ಸ್)	40	200	500	10
ನೆಲಗಡಲೆ	ರಬ್ಬರ (ಲದ್ದಿ) ಹುಳು (ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾ)	30	150	500	28

ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಎಸ್‌ಸಿಯು 185 ಗ್ರಾ. ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ ಸ.ಫ.ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ:

ಕಬ್ಬು : ಕಬ್ಬಿನ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವದು/ಕಬ್ಬಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಿಯುವದು- ಗೆದ್ದಲು ಮತ್ತು ಆದಿಯ ಸುಳಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ತುದಿಕೊರಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒದ್ದೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, 3ನೇ, 4ನೇ, ಮತ್ತು 5ನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಬ್ಬಿನ ಸುಳಿಕೊರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಬೆಳೆಗಳು: (ಬತ್ತ, ಹತ್ತಿ ಎಲೆಕೋಸು, ಟೊಮೇಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೊಯಾಬೀನ್, ಬದನೆ, ತೊಗರಿ, ಕಡಲೆ, ಉದ್ದು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ). ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಮಿತಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ.

ಸಿಂಪರಣಾ ಸಲಕರಣೆ : ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ **ಐಆರ್‌ಎಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೋಡ್ :** 28

ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನ: ರ್‍ಯಾನೊಡಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್

ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಗುಂಪು: ಏಂಥ್ರನಿಲಿಕ್ ಡೈ ಅಮೈಡ್ಸ್

ಬೆಳೆಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ: ಶಿಫಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ

ಐಆರ್ ಎಮ್ ಸೂಚನೆ : ಲೇಬಲ್‌ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳೆ/ಕೀಟಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಎಸ್‌ಸಿ ದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 28 ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದಾದರೊಂದರಂತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಕೀಟ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಎಸ್‌ಸಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಗ್ರೂಪ್ 28 ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಿ. ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಎಸ್‌ಸಿನ ಪದೇಪದೇ ಬಳಕೆಯು ಒಂದೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೊರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 18.5% ಎಸ್‌ಸಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಗ್ರೂಪ್ 28 ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಆವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿ. ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ವಿರಿಸಿದ ಕೀಟದ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಸಮವಿರಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ "ಗ್ರೂಪ್ 28 ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿ ಕಿಂಡಿಗಳು" ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ (ಸಸಿಯಿಂದ, ಕಟಾವಿನ ವರೆಗೆ) ಅವಧಿಯ 50% ಅನ್ನು ಮೀರಕೂಡದು. ಒಟ್ಟುಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಎಮ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರಿ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೀಟ ಸಂತತಿಗಳ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು : 1) ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ವಿಷ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 2) ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮೂಸಬೇಡಿ. ರಬ್ಬರ್ ಕೈಚೀಲಗಳು, ಗಾಗಲ್ಸ್, ಮೊಗಕಾಪು ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೀಟನಾಶಕಬಳಸಿದ ನಂತರ ಹಾಯುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯ ಬೇಡಿ 3) ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನ ಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯ ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕುಜಗಿಯಬೇಡಿ. 4) ಸಿಂಪರಣಾ ಟಾಂಕಿಯನ್ನು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ 3/4 ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಬೇಡಿ. ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಸಲನ್ನು ಸೂಜಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪಿನ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸ ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಎಂದೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. 5) ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಚೆಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. 6) ಕೀಟನಾಶಕದ ಸಿಂಹಡಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು. 7) ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗದ ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಊಟ, ಪೇಯ ಕುಡಿಯು ಪಿಕೆ, ಧೂಮ್ರಪಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು 8) ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಗೆಯತಕ್ಕದ್ದು 9) ಯಾವದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಳಸಿದವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಪ್ರಭಾವವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ.

ಶೇಖರಣೆ ಹಾಗೂನಿರ್ವಹಣೆ : ಈ ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಹಾರ, ಪೇಯ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಬೇಡಿ. ಮೂಲ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಿ. ಡಬ್ಬಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ, ತಂಪಾದ, ಶುಷ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯಬೆಳಕು ಇದ್ದು ಗಾಳಿಸಂಚಾರವಿರಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕದ ಹಬೆಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗದಂತಾಗಲು, ಶೇಖರಣೆಯ ಜಾಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪಶುಗಳ ಮೇವು, ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು.

ವಿಸರ್ಜನೆ : ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಖಾಲಿ ಡಿಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/2 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ಕುಳಿ ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು. ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಪರಿಸರ, ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:	% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ ಸ.ಫ	18.5
ಮಿಥೈಲ್ ಮಿಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಪಾಲಿಮರ್	3.0
ಇಥಿಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ / ಪ್ರೊಪಿಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಪಾಲಿಮರ್ ಹಾಗೂ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್	2.0
ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್	1.0
ಕ್ಸಾಂಥಾನ್ ಗಮ್	0.3
1,2 ಬೆಂಝಿಸೊ ಥಯೊಝೊಲಿನ್ -3- ಒನ್	0.1
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಮಲ್ಷನ್	0.5
ಪ್ರೊಪಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	6.8
ನೀರು	ಕಿ.ಖ ಮಾಡಲು
ಒಟ್ಟು	100

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮಸಕು ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಘುವಾದ ಕಣ್ಣು ಕೆರೆಯುವಿಕೆ. ಗಾಳಿವನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ: ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗು ವದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ : ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಸುವುದು ಒಳಿತು. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ: ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಈ ಪದಾರ್ಥವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಹೇರಳ ನೀರನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಫ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ ಲಿ., ಟಿಸಿಜಿ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ-53, ಬಾಂದ್ರಾಕುರ್ಲಾಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪೂ), ಬಾಂದ್ರಾಸಬರ್ಬನ್, ಮುಂಬಯಿ-400098, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. **ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ:** ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 11 ಜಿಐಡಿಸಿ, ಸಾವ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ: ಮಂಜುಸಾರ್, ಜಿಲ್ಲೆ: ವಡೋದರ-391775, ಗುಜರಾತ್.

ਕੋਰਾਜਨ®

ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 18.5% ਵ/ਵ ਐਸਸੀ

(ਬਹੁਉਪਯੋਗੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 18.5% ਵ/ਵ ਐਸ ਸੀ (20% ਵ/ਵ) ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਸੰਪੂਰਨ ਐਂਥਰਾਨੀਲਾਮਾਈਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਉਪਯੋਗੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਝੋਨੇ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨੇ, ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚ, ਸੋਇਬੀਨ, ਬੈਂਗਣ, ਅਰਹਰ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਮਾਂਹ, ਕਰੇਲੇ, ਭਿੰਡੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਮਾਤਰਾ ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫ਼ਾਰਮੂ. (ਮਿਲੀ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲਿ.)	ਆਖ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
ਝੋਨਾ	ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ	30	150	500	47
ਬੰਦ ਗੋਭੀ	ਚਮਕਦਾਰ ਭੰਵਟ (ਡੀ.ਬੀ.ਐਮ)	10	50	500	3
ਕਪਾਹ	ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਚਿੱਤਕਬਰੀ ਸੁੰਡੀ ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ	30	150	500	9
ਗੰਨਾ	ਦੀਮਕ ਅਗੇਤੀ ਫੋਟ ਦਾ ਗੰਡੂਆ ਆਗ ਦਾ ਗੰਡੂਆ	100-125 75 75	500-625 375 375	1000 1000 1000	208
ਟਮਾਟਰ	ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ (ਹੈਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਆਰਮੀਜੇਰਾ)	30	150	500	3
ਮਿਰਚਾ	ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ (ਹੈਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਆਰਮੀਜੇਰਾ)ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ (ਸਪਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟਓਰਾ, ਸਪਡੋਪਟੇਰਾ ਐਕਸੀਗੁਆ)	30	150	500	3
ਸੋਆਬੀਨ	ਹਰਾ ਸੈਮੀਲੂਪਰ (ਕਰੈਈਸੋਡੈਕਸੀਸ ਐਕਓਟਾ) ਤਨਾਂ ਮੱਖੀ, ਗਰਡਲ ਬੀਟਲ	30	150	500-750	29
ਬੈਂਗਣ	ਫ਼ਲ ਤੇ ਤਨਾਂ ਛੇਦਕ ਲਿਓਸਿਨੋਇਡਜ਼ ਓਰਬੋਨੈਲੀਸ	40	200	500-750	3
ਅਰਹਰ	ਦਾਲ ਫ਼ਲੀ ਛੇਦਕ (ਹੈਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਆਰਮੀਜੇਰਾ)ਫ਼ਲੀਆ ਮੱਖੀ (ਮੇਲਾਨੋਗ੍ਰੋਮਾਇਜ਼ਾ ਓਬਟਓਸਾ)	30	150	500-750	22
ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ	ਫਲੀ ਛੇਦਕ (ਹੈਲੀਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਜੇਰਾ ਅਤੇ ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਸਪ.)	25	125	500	11
ਮਾਂਹ	ਫਲੀ ਛੇਦਕ (ਮਾਰੂਕਾ ਸਪ. ਅਤੇ ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟਓਰਾ)	20	100	500	20
ਕਰੇਲਾ	ਫਲ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਸੁੰਡੀ (ਹੈਲੀਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਜੇਰਾ ਅਤੇ ਡਾਇਆਫੇਨੀਆ ਇੰਡੀਕਾ)	20-25	100-125	500	7
ਭਿੰਡੀ	ਫਲ ਛੇਦਕ (ਹੈਲੀਕੋਵਰਪਾ ਆਰਮੀਜੇਰਾ ਅਤੇ ਇਰਿਆਸ ਵਿਟੇਲਾ)	25	125	500	5
ਮੱਕੀ	ਚਿੱਤੀਦਾਰ ਤਣਾ ਛੇਦਕ (ਚੀਲੋ ਪਰਟੇਲੀਅਸ) ਗੁਲਾਬੀ ਤਣਾ ਛੇਦਕ (ਸੀਸੇਮੀਆ ਇਨਫ਼ਰਨਾਸ)	40	200	500	10
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੰਡੀ	30	150	500	28

ਇਕ ਕਿਲੋ ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 18.5% ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ 185 ਗ੍ਰਾ. ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿ.ਤ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤੋ।ਫ਼ੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਆਦਿ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ: (ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ)

ਗੰਨਾ : ਸੈਂਟ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ/ਮਿੱਟੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਦੀਮਕ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀ ਫੋਟ ਦਾ ਗੰਡੂਆ ਅਤੇ ਆਗ ਦਾ ਗੰਡੂਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਆਗ ਦਾ ਗੰਡੂਆ ਦੇ 3ਜੇ, 4ਥੇ, ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਈ ਏ ਆਰ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਡ : 28

ਹੋਰ ਫਸਲਾ: (ਝੋਨਾਂ, ਕਪਾਹ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਟਮਾਟਰ , ਮਿਰਚਾਂ,ਸੋਆਬੀਨ, ਬੈਂਗਣ, ਅਰਹਰ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਕਾਲੇ ਮਾਹਂ, ਕਰੇਲਾ, ਭਿੰਡੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ) ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ।

ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਰਾਇਨੋਡਾਇਨ ਰੀਸੈਪਟਰ ਮਾਡੂਲੇਟਰਜ

ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਗਰੁੱਪ: ਐਂਥਰਾਨਾਈਲਿਕ ਡਾਯਾਮਾਈਡਜ਼

ਵਨਸਪਤਿਕ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਣ: ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਣ ਨਹੀਂ।

ਆਈ ਆਰ ਐਮ ਬਿਆਨ: ਜਦ ਤਕ ਲੇਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਸਲ/ਕੀਟ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰੂਪਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 18.5% ਵ/ਵ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ28 ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ : ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 18.5% ਵ/ਵ ਐਸ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ28 ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ''ਵਿੰਡੋ'' ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ (ਅਸਰ) ਤੋਂ ਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਕੋਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 18.5% ਵ/ਵ ਐਸ ਸੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਰਤਣਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ 18.5% ਵ/ਵ ਐਸ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ28 ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ''ਵਿੰਡੋ'' ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਕ ਵਿੰਡੋ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ (ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ) ਵਰਤੀ ਗਈ ''ਗਰੁੱਪ28 - ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਿੰਡੋ'' ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਪੀ ਐਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਖੇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1. ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਲੇਬਲ ਸਹਿਤ ਕੰਟੇਨਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵੱਸ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੋ। 2. ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੰਘੋ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਗਾਗਲਜ਼, ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੋ। ਹਵਾ ਵਗਣ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਬਚਾਓ। 3. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ। 4. ਸਪ੍ਰੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ 3/4 ਥੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਭਰੋ। ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਸੂਈ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਅਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 5. ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। 6. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਪੜੇ ਬਦਲੋਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹਾ ਲਓ। 7. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣਢੱਕੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। 8. ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਓ। 9. ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਟੋਰ ਕਰੋਅਤੇ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾ ਹੀ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਠੰਢੇ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂਕਿ ਹਵਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਕੇ ਰੱਖੋ।

ਨਿਪਟਾਰਾ: ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ 1/2 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਵਹਾਓ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ	% ਵ/ਵ
ਕਲੋਰੈਂਟਰਾਨੀਲੀਪ੍ਰੋਲ ਕਿ.ਤ.	18.5
ਮੇਥਾਈਲ ਮੇਥਾਕ੍ਰਾਈਲੇਟ ਈਥਾਕਸੀਲੇਟਿਡ ਗ੍ਰਾਫ਼ਟ ਕੋ-ਪੋਲੀਮਰ	3.0
ਈਥਾਈਲੇਨੋਕਸਾਈਡ/ਪ੍ਰੋਪਾਈਲੇਨੋਕਸਾਈਡ ਬਲਾਕ ਕੋ-ਪੋਲੀਮਰ ਅਤੇ ਈਥਾਕਸੀਲੇਟਿਡ ਅਲਕੋਹਲ	2.0
ਅਟਾਪੁਲਜਾਈਟ ਕਲੇ ਮਿੱਟੀ	1.0
ਜ਼ੈਂਥੇਨ ਗੂੰਦ	0.3
1,2-ਬੇਨਜ਼ੀਸੋਥਾਯਾਜ਼ੋਲੀਨ-3-ਵੰਨ	0.1
ਸਿਲੀਕੋਨ ਇਮਲਸ਼ਨ	0.5
ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	6.8
ਪਾਣੀ	ਕਿਊ.ਐਸ. ਜੋਬਣਾਏ
ਕੁੱਲ	100

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਇਲਾਮਤਾਂ: ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰੜਕ। ਭਾਫ਼ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਨੱਕ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਟ ਏਡ: ਸੁੰਘਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ: ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਵਚਾ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ: ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਲਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ: ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਵਰਤੋ।

ਨਿਰਮਾਤਾ : ਐਫ਼ਐਮਸੀ ਈਡਿਯਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਟੀਸੀਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਯਲ ਸੇਂਟਰ, ੨ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸੀ-੫੩, ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਾਂਦਰਾ(ਪੂ), ਬਾਂਦਰਾ ਸਬਬਰਨ, ਮੁੰਬਈ - ੪੦੦੦੯੮, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰ। **ਫ਼ੈਕਟਰੀ:** ਪਲਾਟ ਨੰ.11, ਜੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਸਾਵਲੀ, ਪਿੰਡ: ਮੰਜੂਸਾਰ, ਜ਼ਿਲਾ: ਵਡੋਦਰਾ-391775, ਗੁਜਰਾਤ ।

কোরাজেন®

ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% ওজন / ওজন এসসি

বহুমুখী কীটনাশক

ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% ওজন/ওজন এসসি (২০% ওজন/ওজন) একটি আদর্শ প্রতিস্থাপক এনথ্রানিলামাইড কীটনাশক। এটি একটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার যোগ্য কীটনাশক যা ধান, বাঁধাকপি, তুলো, আখ, টমাটো, লঙ্কা, সোয়াবিন, বেগুন, অরহর, ছোলার ডাল, কলাই ডাল, করলা, ঢ্যাঁড়শ, মোক্কা এবং চীনেবাদাম ইত্যাদি ফসলের কীটের আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করো

ফসল	পোকার সাধারণ নাম	হেক্টর পিছু মাত্রা সঃ উঃ (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মিঃলিঃ)	তরলীকরণের জল (লিটার)	শেষ স্প্রে এবং ফসল তোলার মধ্যে অপেক্ষাকাল (দিন)
ধান	মাজরা পোকা (স্কিরফোফাগা ইনসার্টুলাস) এবংপাতামোড়া পোকা (ন্যাফালোক্রোসিস মেডিনালিস)	৩০	১৫০	৫০০	৪৭
বাঁধাকপি	হীরকপৃষ্ঠ মথ (প্লুটেলা জাইলোস্টেলা)	১০	৫০	৫০০	৩
তুলো	আমেরিকান বোলওয়ার্ম (হেলিকোভের্পা আর্মিগেরা) দাগযুক্ত বোলওয়ার্ম (ইয়ারিয়াস ভিটেলা) তামাকের শুঁয়োপোকা (স্পোডোপ্টেরা লিটুরা)	৩০	১৫০	৫০০	৯
আখ	উইপোকা (ওডোন্টোটার্মেস ও বেসাস/মাইক্রোটার্মেস ওবেসি) জলদি ডাঁটাছিদ্রক পোকা (চিলো ইনফুস্ক্যাটেলাস) ডগা ছিদ্রক পোকা (স্কিরপোফাগা এক্সসার্পটালিস)	১০০-১২৫ ৭৫ ৭৫	৫০০-৬২৫ ৩৭৫ ৩৭৫	১০০০ ১০০০ ১০০০	২০৮
টমেটো	ফলছেদক (হেলিকোভারপা আর্মিজেরা)	৩০	১৫০	৫০০	৩
লঙ্কা	ফলছেদক (হেলিকোভারপা আর্মিজেরা, স্পোডোপটেরা লিটুরা, স্পোডোপটেরা এক্সিগুয়া)	৩০	১৫০	৫০০	৩
সোয়াবিন	গ্রীন সেমিলুপার (ক্রাইসোডেক্সিস একুটা), স্টেম ফ্লাই, গীরডল্ বীটল্	৩০	১৫০	৫০০-৭৫০	২৯
বেগুন	ডগা এবংফল ছিদ্রকারী পোকা (লিউসিনোড্স আরবোনালিস্)	৪০	২০০	৫০০-৭৫০	৩
অরহর	গ্রামপড বোরার (হেলিকোভারপা) আর্মিজেরা) পড ফ্লাই (মেলানোগ্রোমাইজা অবটুসা)	৩০	১৫০	৫০০-৭৫০	২২
ছোলার ডাল	শুঁটি পোকা (হেলিকোভার্পা আর্মিগেরা এন্ড স্পডোপ্টেরা এসপিপি)	২৫	১২৫	৫০০	১১
খোসাযুক্ত কলাই ডাল	শুঁটি পোকা (মারুকা এসপিপি, এন্ড স্পডোডোপ্টেরা লিটুরা)	২০	১০০	৫০০	২০
করলা	ফলের পোকা এবংপাতার শুঁয়োপোকা (হেলিকোভার্পা) আর্মিগেরা এন্ড জ ডিয়াফানিয়া ইন্ডিকা)	২০-২৫	১০০-১২৫	৫০০	৭
ঢ্যাঁড়শ	ফলের পোকা (হেলিকোভার্পা) আর্মিগেরা এন্ড ইয়ারিয়াস ভিটেল্লা)	২৫	১২৫	৫০০	৫
মোক্কা	দাগী কান্ডের চোষক (চিলো পার্টেলাস) গোলাপী কান্ডের চোষক (সেসামিয়া ইনফারেন্স)	৪০	২০০	৫০০	১০
চীনেবাদাম	তামাকের শুঁয়োপোকা (স্পোডোপ্টেরা লিটুরা)	৩০	১৫০	৫০০	২৮

এক কিলোগ্রাম ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% এসসি'তে আছে ১৮৫ গ্রাম ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল টেকনিক্যাল সঃ উঃ।

এই প্রচারপত্রে উল্লেখ করা ফসল ব্যাতিত অন্য কোনো ফসলে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

ব্যবহারের নির্দেশ: (প্রয়োগের পদ্ধতি এবংসময়)

আখ : উইপোকা ও জলদি ডাঁটাছিদ্রক পোকা তথা ডগাছিদ্রক পোকা দমনের জন্যে আখের ফসলে আখের দণ্ডগুলো ভেজানো/মাটি ভেজানো। আখের ডগাছিদ্রক পোকার ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম দশা দমনের জন্যে জুন মাসে মাটি ভেজানো হিসাবে প্রয়োগ করতেই হবে।

অন্যান্য ফসল : (ধান, তুলো, বাঁধাকপি, টমাটো, লঙ্কা, সোয়াবিন, বেগুন, কড়াইশুঁটি, ছোলার ডাল, খোসাযুক্ত কলাই ডাল, করলা এবংঢ্যাঁড়শ, মোক্কা, চীনেবাদাম) কীটপতঙ্গের ওপর ইটিএল-এ ফলিওর স্প্রে হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। স্প্রে করার সরঞ্জাম: ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ফুট স্প্রেয়ার।

আইআরএসি গ্রুপ কোড: ২৮

ক্রিয়ার ধরণ: রিয়ানোডাইন রিসেপ্টার মড্যুলেটর্স

কেমিক্যাল সাবগ্রুপ: অ্যান্থ্রানিলিক ডায়ামাইডস

বিষক্রিয়া: সুপারিশকৃত মাত্রাতে কোনও বিষক্রিয়া নেই।

আইআরএম বিবৃতি: নির্দেশিত না থাকলে, অন্যথায় লেবেলের সুনির্দিষ্ট ফসল/পোকার বিভাগে নিম্নলিখিত অভ্যাসগুলো সুপারিশকৃত হয় ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% ওজন/ওজন এসসির প্রতি এবংগ্রুপ ২৮ পোকাদের প্রতি কীটনাশক প্রতিরোধের বিকাশ প্রতিহত বা বিলম্বিত করতে:)একই ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% ওজন/ওজন এসসি ক্রিয়ার প্রতি ধারাবাহিক পোকামাকড়ের প্রজন্মের প্রকটিত হওয়া এড়াতে একটা 'উইণ্ডো'' প্রচেষ্টা ব্যবহার করে ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% ওজন/ওজন এসসি বা অন্যান্য গ্রুপ ২৮ কীটনাশক প্রয়োগ করবেন। ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% ওজন/ওজন এসসির বহুবিধ ধারাবাহিক প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য হয়, যদি ঐগুলো একক পোকার প্রজন্মকে সামলাতে ব্যবহৃত হয়। ফারটেরা বা অন্যান্য গ্রুপ ২৮ কীটনাশকের একটা ''উইণ্ডো'' অনুসরণ করে, ভিন্ন ধরণের ক্রিয়া সহযোগে প্রভাবদায়ক নানান কীটনাশকের একটা ''উইণ্ডো'' পালাক্রমে প্রয়োগ করবেন।)একটা ''উইণ্ডো''-র দৈর্ঘ্য হতে হবেই চিহ্নিত করা পোকার একটা প্রজন্মের ব্যাপ্তির সমতুল্য। ফসলের সমগ্র চক্রে (চারা থেকে ফসল তোলা) প্রয়োগিত সমস্ত ''গ্রুপ ২৮-সক্রিয় উইণ্ডো'র মোট প্রকটিক সময়কাল, ফসলের চক্রের ৫০%-এর অধিক অবশ্যই হওয়া চলবে না।) সার্বিকভাবে পোকা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কার্যক্রমে আইপিএম কৌশলাদি সংযুক্ত করবেন।) ক্ষেতী ফলপ্রদতা নষ্ট হওয়ার জন্যে পোকার জন্মসংখ্যা নিরীক্ষণ করবেন।

সতর্কতা: ১. লেবেল এবংনির্দেশপত্রের সকল নির্দেশ মন দিয়ে পড়বেন তথা মেনে চলবেন। দুর্ঘটনাবশতঃ বিষাক্ততার ক্ষেত্রে চিকিৎসককে দেখানোর জন্যে লেবেল-সহ পাত্রটি সুরক্ষা করবেন। ২. পদার্থটি শুঁকবেন না। নাড়াচাড়া করার সময়ে রবারের হাতমোজা, রোদচশমা, মুখোশ এবংসুরক্ষামূলক পোশাক পরবেন। বাতাসের অনুকূলে কীটনাশক প্রয়োগ করার দ্বারা স্প্রে-কণার এসে পড়া এড়াবেন। ৩. স্প্রে করার সময়ে খাওয়া, পানীয় পান, ধূমপান বা পান চেবানো নিষেধ। ৪. স্প্রে-ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতার ৩/৪র্থ অংশের অধিক ভরবেন না। বন্ধ হওয়া নজল ফুঁ মেরে পরিষ্কার করার বদলে সরু তার বা পিন দিয়ে করবেন। ৫. শরীরে ছিটকে আসার ক্ষেত্রে, প্রচুর জল দিয়ে অবশ্যই ধুয়ে ফেলবেন। ৬. সর্বদা কীটনাশক দিয়ে পরিচর্যা করা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে পোশাক বদলাবেন এবংস্নান করবেন। ৭. খাওয়া, পানীয় পান বা ধূমপান করার পূর্বে এবংনাড়াচাড়া করার পূর্বে হাত ও দেহের উন্মুক্ত অংশগুলো ধুয়ে নেবেন। ৮. পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে দূষিত পোশাক খুলে, ধুয়ে নেবেন। ৯. এই কীটনাশক ব্যবহার করছেন বা সম্প্রতি ব্যবহার করেছেন এমন ব্যক্তির মধ্যে বিষাক্ততার কোনও লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে একজন চিকিৎসককে ডাকবেন।

মজুতকরণ ও নাড়াচাড়া করা: এই পদার্থ দ্বারা দূষিতে পরিণত হতে পারে এমন স্থানে খাদ্য, পানীয় বা তামাক মজুত বা সেবন করবেন না। কীটনাশক কেবলমাত্র মূল পাত্রেই মজুত করবেন। খুব এঁটে বন্ধ করে, সুনির্মিত, ঠাণ্ডা, শুকনো স্থানে, সুআচ্ছাদিত ও বাতায়িত এবংঅবশ্যই বাষ্পতার দ্বারা হওয়া দূষণ এড়াতে পর্যাপ্ত আয়তনযুক্ত স্থানে মজুত করতে হবে। পদার্থটি খাদ্য, পশুখাদ্য, অন্যান্য পোকানাশক এবংসার থেকে দূরে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে।

বিনষ্ট করণ: পাত্র পুনরায় ব্যবহার করবেন না। খালি পাত্রাদি অবশ্যই ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে ১/২ মিটার গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। বিনষ্ট করণের পদার্থ মজুত করার দ্বারা পরিবেশ, জল বা খাদ্য দূষিত করবেন না। জলতল বা পয়ঃ-নিকাশী প্রণালীতে ফেলবেন না।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ :	% ওজন / ওজন
ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল সঃ উঃ	১৮.৫
মিথাইল মেথাক্রাইলেট ইথক্সিলেটেড গ্রাফ্ট কো-পলিমার	৩.০
ইথাইলিনঅক্সাইড / প্রপাইলিনঅক্সাইড ব্লক কো-পলিমার এবং ইথক্সিলেটেড অ্যালকহল	২.০
আটাপুলগাইট মাটি	১.০
জ্যান্থান আঠা	০.৩
১,২-বেঞ্জিসোথিয়াজোলাইন-৩-ওয়ান	০.১
সিলিকন ইমালসন	০.৫
প্রপাইলিন গ্লাইকল	৬.৮
জল	বানাতে যথেষ্ট পরিমাণে
মোট	১০০

লক্ষণসমূহ: ঝাপ্সা দৃষ্টি সহ চোখে মৃদু অস্বস্তি। বাষ্পতা শ্বাসে গেলে পরিণামস্বরূপ নাক দিয়ে জল পড়বে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: শ্বাসে গেলে: সুনির্দিষ্ট কোনও হস্তক্ষেপে নির্দেশিত হয় না, যেহেতু পদার্থটির শ্বাসের পক্ষে বিপজ্জনকের সম্ভাবনা নেই। ত্বকে লাগলে : ত্বকের সংস্পর্শে পদার্থটির বিপজ্জনক হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ব্যবহারের পরে ত্বক পরিষ্কার করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। চোখে লাগলে: চোখের ক্ষেত্রে পদার্থটির বিপজ্জনক হবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু সংস্পর্শ ঘটলে, চোখে প্রচুর জলের ঝাপ্টা দেবেন।

প্রতিষেধক: লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

সাবধানতা: এই লেবেল/লিফ্লেটে নির্দিষ্ট ফসল ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

প্রস্তুতকর্তা : এফএমসি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, টীসীজী ফাইনেন্সিয়েল সেংটর, ২ম তল, সী-৫৩, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূ.), বান্দ্রা সবর্বন, মুম্বই - ৪০০০৯৮, মহারাষ্ট্র॥ **ফ্যাক্টরি:** প্লট নং. ১১, জি.আই.ডি.সি., সাভলি, গ্রাম: মঞ্জুসার, জেলা: ভাদোদরা-৩৯১৭৭৫, গুজরাট।