টোপরামিজোন ৩৩৬ গ্রাঃ/লিঃ(ওজন/পরিমাণ) এসসি

গিলারডো

নির্বাচিত আগাছানাশক

টোপরামিজোন ৩৩৬ গ্রাঃ/লিঃ ওজন/পরিমাণ এসসি হচ্ছে ভুট্টার চাষে নানা ঘাস এবং চওড়া পাতার আগাছা দমনের জন্যে সুপারিশকৃত হয়।

সংমিশ্রণ :

ক্র. নং	উপাদানসমূহ	গ্রাঃ/লিঃ
১.	টোপরামিজোন সঃ উঃ	৩৩৬.০
২.	১,২-প্রোপাইলিন গ্লাইকল	৭০.০
৩.	পলিপ্রোপাইলিন গ্লাইকলের সঙ্গে ইথাইলিন অক্সাইডের অ্যাডাক্ট	৩০.০
৪.	ফেনোসালফোনেট, ইউরিয়া, ফেনল এবং ফর্মালডিহাইডের এক ঘনীভবন উৎপাদের সোডিয়াম লবণ	২০.০
৫.	জলীয় অবদ্রবে পলিডাইমিথাইলসিলক্সেন	৫.০
৬.	পলিস্যাকারাইড	৩.০
৭.	১,২-বেঞ্জিসোথিয়াজোলিন-৩-ওয়ান প্লাস ২-মিথাইল-৪-আইসোথিয়াজোলিন-৩-অন	২.০
৮.	জল	পর্য্যাপ্ত পরিমাণ
	মোট	১০০০.০

ঘনত্ব : ১.১৩ গ্রাঃ/বর্গ সেঃমিঃ^{3}

প্রয়োগ এবং ব্যবহারের জন্যে সুপারিশ :

নিম্নে প্রদত্ত সুপারিশ অনুসারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে, টোপরামিজোন ৩৩৬ গ্রাঃ/লিঃ ওজন/পরিমাণ এসসি ভুট্টার চাষে নানা ঘাস এবং চওড়া পাতার আগাছার গজানো-পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

ফসল	আগাছা	মাত্রা/হেক্টর			শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষার সময়কাল (PHI)
		সঃ উঃ (গ্রাঃ)	ফর্মুলেশন (মিঃলিঃ)	তরলীকরণের জল (লিঃ/হেঃ)	
ভুট্টা	• কোদাই, • কেওয়াই, • মাকড়া • শ্যামা ঘাস • ক্লোরিস বারবাটা • পার্থেনিয়াম হিস্টেরোফোরাস • লাটামারি, • জংলী নটে, • বনটেপারী, • ছাঁচি, • সিলোসিয়া আর্জেন্টী	২৫.২ থেকে ৩৩.৬ গ্রাঃ সঃ উঃ+হেঃ + MSO সংবাহক @ ২ মিঃলিঃ+লিঃ জল	৭৫ থেকে ১০০ মিঃলিঃ + MSO সংবাহক @ ২ মিঃলিঃ+ লিঃ জল	৩৭৫	৮৩

প্রয়োগের সময় ও ফসলের পর্য্যায় : টোপরামিজোন ৩৩৬ গ্রাঃ/লিঃ ওজন/পরিমাণ এসসি হচ্ছে জলদি গজানো-পরবর্তী আগাছানাশক, যা MSO সংবাহক @ ২.০ মিঃলিঃ/লিঃ জলের সঙ্গে একত্রে আগাছাদের ২-৩ পাতার পর্য্যায়ে হওয়ার সময়ে প্রয়োগ করতে হবে।

আবহাওয়ার অবস্থা : বৃষ্টিপাত হওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রয়োগিত হবে না।

মাটি : প্রয়োগের পূর্বে উপযুক্তভাবে চষা এবং আর্দ্রতার মাত্রা বজায় রকাত হবে।

প্রয়োগের কৌশল, সরঞ্জামের প্রকার, নজল্ প্রকার : ফ্ল্যাট ফ্যান নজল্ লাগানো ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করে আগাছানাশক স্প্রে করতে হবে। আগাছার লতাপাতার আগাগোড়া আওতাভুক্তা সুনিশ্চিত করতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল ব্যবহার করে MSO সংবাহকের সঙ্গে একত্রে সুপারিশকৃত পরিমাণে আগাছানাশক প্রয়োগ করবেন।

মাত্রা : ৭৫ থেকে ১০০ মিঃলিঃ ফর্মুলেশন + MSO সংবাহক @ ২ মিঃলিঃ/লিঃ জল প্রতি হেক্টর।

মেশানোর জন্যে নির্দেশ : প্রতি ১৫ লিটার জলে ৩-৪ মিঃলিঃ টোপরামিজোন ৩৩৬ গ্রাঃ/লিঃ ওজন/পরিমাণ এসসি দিয়ে মজুত দ্রবণ প্রস্তুত করুন এবং ইহাতে ৩০ মিঃলিঃ MSO সংবাহক মেশান আর উপযুক্তভাবে ঘুলান।

রি-এন্ট্রী সময়কাল : ২৪ ঘণ্টা পরে।

PHI : ৮৩ দিন।

স্প্রে করার সর্বাধিক সংখ্যা সমেত পুনঃপুনঃতা : মাত্র ১ স্প্রে সুপারিশকৃত।

যেসব পর্য্যায় চলাকালীন কোনও ফসলের ওপর আগাছানাশক প্রয়োগিত হবেই না : ফসলের পর্য্যায়ের জন্যে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। গজানো-পরবর্তী প্রয়োগ হিসাবে আগাছাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হবে।

এই লেবেল/লিফলেটে উল্লেখিত ছাড়া অন্য কোনও ফসলে ব্যবহৃত হবে না।

মজুতকরণের অবস্থা : ১. আগাছানাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য পদার্থ মজুতের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে অথবা পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে। ২. আগাছানাশক মজুতকরণের ঘর বা স্থানটি ভালো হ'তে হবে সুনির্মিত, শুকনো, সুআলোকিত, বাতায়িত এবং বাষ্পতার দ্বারা হওয়া সংক্রমণ এড়াতে পর্য্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

সুরক্ষা সাবধানতা : ১. মেশানো এবং স্প্রে করার সময়ে সুরক্ষামূলক পোশাক পরতেই হবে। ২. প্রয়োগের পরে দূষিত পোশাক ও দেহাংশ ধোবেন। ৩. প্রয়োগ চলাকালীন শ্বাসে যাওয়া এড়াবেন, কোনও ধূমপান, পানীয় পান, কোনও খাদ্য খাওয়া ও চেবানো নিষেধ।

বিষাক্ততার লক্ষণাদি : প্রারম্ভিক লক্ষণ হিসাবে গাবমি, বমি করা, নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধামন্দ, মাথাধরা, চোখ ও ত্বকের অস্বস্তির যেকোন সমন্বয় ঘটতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা : ত্বকের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে পরিধেয় দূষিত পোশাক ছাড়িয়ে দেবেন। সাবান ও জল দিয়ে ভালোভাবে দূষিত ত্বক ধোবেন। শ্বাসে গেলে, রোগীকে শান্ত রাখবেন এবং মুক্ত বায়ুতে সরিয়ে নেবেন। চোখের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে চোখেরপাতা খোলা রেখে আক্রান্ত চোখ কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে চালু জল দিয়ে ধোবেন। গিলে ফেললে, অবিলম্বে মেডিক্যাল শরণাপন্ন হবেন এবং লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

চিকিৎসকের প্রতি পরামর্শ : বিষাক্ততার ক্ষেত্রে লক্ষণমূলক থেরাপী প্রয়োগ করুন।

প্রতিষেধক : সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণাদি অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করাবেন।

সতর্কীকরণ : খালি পাত্রাদি পুনর্ব্যবহার করা বিপজ্জনক।

ব্যবহৃত পাত্রাদির নিরাপদ বিনষ্টিকরণ : ১. প্যাকগুলো বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন এবং পাত্রাদি ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্টকরতে হবে, যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

উত্তাপ এবং উন্মুক্ত শিখা থেকে দূরে রাখবেন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখবেন।

Bengali

ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ୩୩୬ ଗ୍ରା./ଲି. (ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍) ଏସ୍‌ସି

ଗିଲାରଡୋ

ବାଛି ବାଛି ମାରୁଥିବା କ୍ଷୁପନାଶକ

ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ୩୩୬ ଗ୍ରା./ଲି. (ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍) ଏସ୍‌ସି ହେଉଛି ଗଜେଇବା-ପର କ୍ଷୁପନାଶକ, ଯାହାକୁ ମକା ଫସଲରେ ଘାସ ଓ ଚଉଡ଼ା ପତ୍ରିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ।

ସଂରଚନା :

କ୍ରମାଙ୍କ	ଉପାଦାନ	ଗ୍ରା./ଲି.
୧.	ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ସ.ଉ.	୩୩୬.୦
୨.	୧,୨-ପ୍ରପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍	୭୦.୦
୩.	ଆଡକ୍ଟ ଅଫ ଇଥାଇଲିନ୍ ଅକ୍‌ସାଇଡ୍ ଟୁ ପଲିପ୍ରପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍	୩୦.୦
୪.	ସୋଡିଅମ ସଲ୍ଟ ଅଫ ଏ କଣ୍ଡେନ୍‌ସେଶନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଫେନଲ୍‌ସଲ୍‌ଫୋନେଟ୍, ୟୁରିଆ, ଫେନଲ୍ ଓ ଫର୍ମାଲ୍‌ଡିହାଇଡ୍	୨୦.୦
୫.	ପଲିଡାଇମିଥାଇଲ୍‌ସିଲୋକ୍‌ସେନ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ୱସ୍ ଇମଲ୍‌ଶନ୍	୫.୦
୬.	ପଲିସାଚାରାଇଡ୍	୩.୦
୭.	୧,୨-ବେଞ୍ଜୁସୋଥିଆଜୋଲିନ୍-୩-ଓ୍ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୨-ମିଥାଇଲ୍-୪-ଆଇସୋଥିଆଜୋଲିନ୍-୩-ଅନ୍	୨.୦
୮.	ପାଣି	ଶତାଂଶର ବାକି ମାତ୍ରା
	ମୋଟ	୧୦୦୦.୦

ଘନତା : ୧.୧୩ ଗ୍ରାମ/ଶେଣ୍ଟିମିଟର^{3}

ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବହାର ସୁପାରିଶ :

ତଳଲିଖିତ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଉପଯୋଗ କରାଗଲେ, ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ୩୩୬ ଗ୍ରା./ଲି. ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏସ୍‌ସି ମକା ଫସଲରେ ଘାସ ଓ ଚଉଡ଼ା ପତ୍ରିଆ ବାଳୁଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।

ଫସଲ	ବାଳୁଙ୍ଗା	ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାତ୍ରା			ଅନ୍ତିମ ସିଞ୍ଚନ ଠାରୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର (PHI)
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରାମ)	ଫର୍ମୁଲେସନ୍ (ମି.ଲି.)	ମିଶେଇବା ପାଣି (ଲିଟର)	
ମକା	• ଏଲୁସାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିକା, • ଡିଜିଟାରିଆ ସାଙ୍ଗୁଇନାଲିସ୍, • ଡାକ୍‌ଟିଲୋକ୍‌ଟେନିଅମ୍, • ଏଜିପ୍ଟିଅମ୍, • ଏକିନୋକ୍ଲୋଆ ଏସ୍‌ପିପି, • କ୍ଲୋରିସ୍ ବାର୍ବାଟା, • ପାର୍ଥେନିଅମ୍ ହିଷ୍ଟେରୋଫୋରସ୍, • ଡାଇଜେରା ଆର୍ଭେନ୍‌ସିସ୍, • ଅମରାନ୍ଥସ୍ ଭିରିଡିସ୍, • ଫିସାଲିସ୍ ମିନିମା, • ଅଲଟରନାନ୍‌ଥେରା ସେସିଲିସ୍, • ସେଲୋସିଆ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିଆ	୨୫.୨ ରୁ ୩୩.୬ ଗ୍ରା. ସ.ଉ./ ହେକ୍ଟର + MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ @୨ ମି.ଲି./ ଲି. ପାଣି	୭୫ ରୁ ୧୦୦ ମି.ଲି. + MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ @୨ ମି.ଲି./ ଲି. ପାଣି	୩୭୫	୮୩

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ଓ ଫସଲ ଅବସ୍ଥା : ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ୩୩୬ ଗ୍ରା./ଲି. ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏସ୍‌ସି ବାଳୁଙ୍ଗା ଗଜେଇବା ପରେ ସହଳ ମାରୁଥିବା କ୍ଷୁପନାଶକ ହୋଇଥିବାରୁ, ତାକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ୨-୩ ପତ୍ରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ @ ୨.୦ ମି.ଲି./ଲି. ପାଣି ସାଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଦରକାର। **ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି :** ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସ୍ଥିତିର ୨ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ।

ମୃତ୍ତିକା : ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଆଗରୁ ବିଲ ମାଟିକୁ ହଳ କରାଯାଇଥିବ ଓ ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ବଜାୟ ଥିବ।

ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି, ଉପକରଣ ପ୍ରକାର, ନୋଜଲ୍ ପ୍ରକାର : ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ୍ ଲଗା ନାପ୍‌ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁପନାଶକ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମପାରୂପା ମାତ୍ରାର କ୍ଷୁପନାଶକ ସହିତ MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ସାଥିରେ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯେପରି ବାଳୁଙ୍ଗା ପତ୍ରସବୁ ଭଲଭାବେ ଭିଜିବ।

ମାତ୍ରା : ହେକ୍ଟର୍ ପିଛା ୭୫ ରୁ ୧୦୦ ମି.ଲି. ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ + MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ @ ୨.୦ ମି.ଲି./ଲି. ପାଣି।

ମିଶାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣି ପାଇଁ ୩-୪ ମି.ଲି. ଟୋପ୍ରାମେଜୋନ୍ ୩୩୬ ଗ୍ରା./ଲି. ଓଜନ/ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏସ୍‌ସି ର ଷ୍ଟକ୍ ସଲ୍ୟୁଶନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ୩୦ ମି.ଲି. MSO ଆଡ୍‌ଜୁଭାଣ୍ଟ ମିଶାଇ ଭଲକରି ଗୋଳାନ୍ତୁ।

ବିଲରେ ପ୍ରବେଶ ଅବଧି : ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।

PHI : ୮୩ ଦିନ।

ପ୍ରୟୋଗ ଥର ଓ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସିଞ୍ଚନ : କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଞ୍ଚନ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ।

କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଫସଲରେ କ୍ଷୁପନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ନିଷେଧ : ଫସଲର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ଏହି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଅନ୍ତରାୟ ନୁହେଁ। ବାଳୁଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗଜେଇବା-ପର ପ୍ରୟୋଗ ରୂପେ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ।

ଏହି ଲେବେଲ/ପତ୍ରିକାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଫସଲ ଉପରାନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ।

ମହଜୁଦକରଣ : ୧) କ୍ଷୁପନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ କୋଠରୀ ବା ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଏକ ଅଲଗା ଆଲମାରିରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଦରକାର। ୨) କ୍ଷୁପନାଶକ ରଖାଯିବା ସ୍ଥାନ/କୋଠରୀଟି ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା, ଆଲୋକିତ, ବାୟବୀୟ ଆଉ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ।

ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା : ୧) ମିଶାଇବା ଓ ସିଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ। ୨) ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟା ଓ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଲକରି ଧୋଇ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ୩) ଉପଯୋଗ କଲାବେଳେ ଏହା ଶ୍ୱାସରେ ଯିବା ଅନୁଚିତ, ତଥା ସେତେବେଳେ ଖାନ-ପାନ, ଧୂମପାନ କି କିଛି ଚୋବେଇବ। ମନା।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ : ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ବାନ୍ତି ଉଠିବା, ନିଦ ନହେବା, ଡିସ୍‌ଫୋନିଆ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଆଖି ଆଉ ତ୍ୱଚା ଜଳାପୋଡ଼ା ହେବା ଦେଖାଦେଇ ପାରେ।

ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର : ଦେହରେ ଲାଗିଲେ/ପଡ଼ିଲେ, ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସଂକ୍ରମିତ ଅଙ୍ଗକୁ ସାବୁନରେ ସଫାକରି ଧୁଅନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥିଲେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତୁରନ୍ତ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ତାକୁ ସଫା ପାଣିରେ ବା ନଳ ପାଣିରେ ଅନ୍ତତଃ ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ।

ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ : ବିଷାକ୍ତତା ଘଟିଥିଲେ, ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବିଷଘ୍ନ : କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ-ନିବାରକ ଜଣାନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ।

ସତର୍କବାଣୀ : ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ କୌଣସି କାମରେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଖାଲି ପାତ୍ରଙ୍କ ନିରାପଦ ଭାବେବିଧ୍ୱଂସିକରଣ : ୧) ଏହାର ପ୍ୟାକେଜ୍, ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ପାତ୍ର ଆଦିର ଧୁଆ ପାଣିକୁ ନିରାପଦରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ପାଣି କି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ୨) ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ବା ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ଭୁଲରେ କାମରେ ଲଗାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ୩) ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁ ଲୋକବସ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଭାଙ୍ଗି ପୋତିଦେବା ଉଚିତ।

ଉତ୍ତାପ ଓ ଖୋଲା ନିଆଁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ହାତପାଆନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।

Oriya

ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ 336 ಗ್ರಾ/ಲೀ (ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ) ಎಸ್‌ಸಿ

ಗಿಲಾರ್ಡೋ

ಆಯ್ದು ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ ಕಳೆನಾಶಕ

ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ 336 ಗ್ರಾ/ಲೀ (ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ) ಎಸ್‌ಸಿ, ಇದೊಂದು ಆಯ್ದು ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ, ಮೊಳಕೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆಯ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟಕಗಳು	ಗ್ರಾ/ಲೀ
1	ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ ಸ. ಘ.	336.0
2	1, 2-ಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	70.0
3	ಪೊಲಿಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್‌ಗೆ ಇಥೈಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಆ್ಯಡಕ್ಟ್	30.0
4	ಫಿನೊಸಲ್ಫೊನೇಟ್‌ನ ಒಂದು ಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್ ಉತ್ಪಾದನದ ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಯೂರಿಯಾ, ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತು ಫೊರ್ಮಾಲ್‌ಡಿಹೈಡ್	20.0
5	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಮಲ್ಶನ್‌ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್‌ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	5.0
6	ಪೊಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್	3.0
7	1, 2-ಬೆನ್ಜಿಐಸೊಥಿಯಾಝೋಲಿನ್-3-ವನ್ ಪ್ಲಸ್ 2-ಮಿಥೈಲ್-4-ಐಸೊಥಿಯಾಝೋಲ್-3-ಆನ್	2.0
8	ನೀರು	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್
	ಒಟ್ಟು	1000.0

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 1.13 ಗ್ರಾ/ಸೆಮೀ^{3}

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸಿನ ಅನುಸಾರ ಬಳಸಿದಾಗ, ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ 336 ಗ್ರಾ/ಲೀ (ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ) ಎಸ್‌ಸಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಳೆಯ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು ಮೊಳತ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆ	ಕಳೆ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಅಂತಿಮ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿಲೀ)	ಬೆರೆಸ ಬೇಕಾದ ನೀರು (ಲೀ/ಹೆ)	
ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ	• ಎಲ್ಯುಸೈನ್ ಇಂಡಿಕಾ, • ಡಿಜಿಟಾರಿಯಾ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿನಾಲಿಸ್, • ಡಾಕ್ಟಿಲೋಕ್ಟೆನಿಯಮ್ ಏಜಿಪ್ಟಿಯಮ್, • ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ, • ಕ್ಲೋರಿಸ್ ಬಾರ್ಬಟಾ, • ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಹಿಸ್ಟರೋಫೋರಸ್, • ಡೈಜೆರಾ ಆರ್ವಾನ್ಸಿಸ್, • ಅಮರಾಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್, • ಫೈಸಾಲಿಸ್ ಮಿನಿಮಾ, • ಅಲ್ಟರ್ನಾಂಥೆರಾ ಸೆಸ್ಸಿಲಿಸ್, • ಸೆಲೋಸಿಯಾ ಅರ್ಜೆಂಟಿಯಾ	25.20ರಿಂದ 33.6 ಗ್ರಾ/ಸ.ಘ./ಹೆ + ಎಮ್ ಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ @ 2 ಮಿಲೀ/ ಲೀ ನೀರು	75ರಿಂದ 100 ಮಿಲೀ + ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ @ 2 ಮಿಲೀ/ ಲೀ ನೀರು	375	83

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯ ಹಂತ : ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ 336 ಗ್ರಾ/ಲೀ (ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ) ಎಸ್‌ಸಿ ಕಳೆಯ ಮೊಳಕೆಯ ನಂತರ ಬೇಗನೇ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಳೆಗಳು 2-3 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ @ 2.0 ಮಿಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. **ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ :** ಮಳೆ ಬರುವ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ, ಆ ಸಮಯದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಮಣ್ಣು : ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಹೊಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತು ತೇವದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ, ಉಪಕರಣದ ಮಾದರಿ, ನಾಝಲ್ ಮಾದರಿ : ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಝಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆವರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.

ಡೋಸೇಜ್ : 75ರಿಂದ 100 ಮಿಲೀ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ + ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ : 2 ಮಿಲೀ/ಲೀ ನೀರು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ.

ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಗಳು : ಪ್ರತಿ 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗಾಗಿ 3-4 ಮಿಲೀ ಟೊಪ್ರಾಮೆಝೋನ್ 336 ಗ್ರಾ/ಲೀ (ಡಬ್ಲ್ಯು/ವಿ) ಎಸ್‌ಸಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್ ತಯಾರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 30 ಮಿಲೀ ಎಮ್‌ಎಸ್‌ಒ ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸಿರಿ.

ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ

ಪಿಎಚ್‌ಐ: 83 ದಿನಗಳು

ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಡುವಿನ ಕಾಲಾಂತರಗಳು : ಕೇವಲ 1 ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು : ಬೆಳೆಯ ಹಂತದ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆಗಳು ಮೊಳತ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಲೇಬಲ್/ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು : 1. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ವಂತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಬಾಟನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಒಣದಾಗಿದ್ದು ಗಾಳಿ ಆಡ್ಡಾಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಪದಿಂದ ಪ್ರದೂಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರಬೇಕು.

ಸುರಕ್ಷೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಮಿಶ್ರಯ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪೋಷಾಕನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. 2. ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರಿ, ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ಜಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಲ್ಲದು.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಓಕ್ರೋದ್ರೇಕ, ವಾಂತಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಡೈಸ್ಫೋನಿಯಾ, ತಲೆ ನೋವು, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಚರ್ಮ ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಳಚಿರಿ. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಚರ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾವಗೊಂಡ ಕಣ್ಣನ್ನು, ರೆಪ್ಪೆ ತೆರೆದು ನೀರಿನ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಹೇರಳ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಗ್ರ ನಡುಕಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಡಾಕ್ಟರ್‌ರಿಗೊಂದು ಸಲಹೆ: ವಿಷತಗಲಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧಿ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಬರಿದಾದ ಧಾರಕಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಮಶೀನ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಕಂಟೇನರುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟಕದಂತೆ ಇರಿಸಿರಿ

Kannada

టోప్రామెజోన్ 336 గ్రా/లీ (బ/ప) ఎస్‌సి

గిలార్డో

విచక్షణకల కలుపునాశని

టోప్రామెజోన్ 336 గ్రా/లీ (బ/ప) ఎస్‌సి అనేది మొక్కజొన్నలో గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపులను నియంత్రించేందుకు సిఫారసు చేయబడుతున్న విచక్షణకల మొలక-అనంతర కలుపునాశని.

మిశ్రమం:

వ.సంఖ్య	ఇన్‌గ్రీడియంట్‌లు	గ్రా/లీ
1.	టోప్రామెజోన్ ఎ.ఐ.	336.0
2.	1, 2-ప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్	70.0
3.	ఎథిలీన్ ఆక్సైడ్‌ని పాలిప్రొపిలీన్ గ్లైకోల్‌కి కలపడం	30.0
4.	ఫెనోసల్ఫోనేట్, యూరియా, ఫినాల్ మరియు ఫార్మల్‌డిహైడ్ యొక్క కండెన్సేషన్ ఉత్పాదన యొక్క సోడియం సాల్ట్	20.0
5.	అక్వేయస్ ఎమల్షన్‌లో పాలిడైమిథైల్‌సిలోక్సేన్	5.0
6.	పాలిసాకరైడ్	3.0
7.	1, 2-బెంజిసోథయాజోలిన్-3-ఒన్ ప్లస్ 2-మిథైల్-4-ఐసోథయాజోలిన్-3-ఆన్	2.0
8.	నీళ్ళు	కావలసినన్ని
	మొత్తం	100.00

సాంద్రత: 1.13 గ్రాములు/సిఎం^{3}

వినియోగం మరియు ఉపయోగించేందుకు సిఫారసు:

ఈ కింద ఇవ్వబడిన సిఫారసుల ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు, మొక్కజొన్నలో మొలక అనంతరం గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపులను టోప్రామెజోన్ 336 గ్రా/లీ (బ/ప) ఎస్‌సి నియంత్రిస్తుంది.

పంట	కలుపులు	ఒక్కో హెక్టారుకు మోతాదు			
		ఎ.ఐ. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు/ హెక్టారుకు)	ఆఖరి పిచికారి నుంచి పంట కోత వరకు వేచి వుండవలసిన సమయం (పిహెచ్ఐ)
మొక్క జొన్న	• ఎలూసిన్ ఇండికా, • డిజిటారియా సంగునాలిస్ • డాక్టిలోక్టేనియమ్ ఏజిప్టియమ్ • ఎకినోక్లోవా ఎస్‌పిపి • క్లోరిస్ బార్బటా • పార్థేనియమ్ హిస్టరోఫోరస్ • డిజెరా అర్వెన్సిస్ • అమరాంతస్ విరిడిస్ • ఫైసాలిస్ మినిమా • ఆల్టర్‌నాంథెరా సెసిలిస్ • సెలోసియా అర్జెంటియా	25.2 నుంచి 33.6 గ్రా ఎ.ఐ/ హెక్టారుకు + ఎంఎస్‌ఒ అడ్జువంట్‌ని లీటరు నీటికి 2 మి.లీ. చొప్పున	75 నుంచి 100 మి.లీ + ఎంఎస్‌ఒ అడ్జువంట్‌ని లీటరు నీటికి 2 మి.లీ చొప్పున	375	83

వినియోగించవలసిన సమయం మరియు పంట దశ: టోప్రామెజోన్ 336 గ్రా/లీ (బ/ప) అనేది లీటరు నీటికి 2.0 మి.లీ చొప్పున ఎంఎస్‌ఒ అడ్జువంట్‌తో పాటు 2-3 ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు వినియోగించవలసిన మొలక అనంతరం కలుపునాశని.

వాతావరణ పరిస్థితులు: మందు పిచికారి చేసిన తరువాత కనీసం 2 గంటలు వర్షం లేకుండా చూసుకోవలెను.

నేల: నేలను సరిగ్గా దున్నాలి మరియు వినియోగించడానికి ముందు తేమ స్థాయిని నిర్వహించాలి.

వినియోగించవలసిన టెక్నిక్, పరికరాల రకం, నాజిల్ రకం: ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్ బిగించిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ని ఉపయోగించి కలుపునాశనిని పిచికారి చేయాలి. కలుపుల ఆకుల కవరేజి క్షుణ్ణంగా ఉండేందుకు తగిన పరిమాణంలో నీటిని ఉపయోగించి ఎంఎస్‌ఒ అడ్జువంట్‌తో పాటు సిఫారసు చేసిన పరిమాణంలో కలుపునాశనిని వినియోగించండి.

మోతాదు: 75 నుంచి 100 మి.లీ. ఫార్ములేషన్ + ఎంఎస్‌ఒ అడ్జువంట్‌ని లీటరు నీటికి 2 మి.లీ. చొప్పున ఒక్కో హెక్టారుకు వినియోగించాలి.

మిశ్రమం చేయడానికి నిర్దేశనం: ఒక్కో 15 లీటర్ల నీటికి టోప్రామెజోన్ 336 గ్రా/లీ (బ/ప) 3-4 మి.లీ. చొప్పున స్టాక్ ద్రావకం తయారుచేసి దానికి 30 మి.లీ ఎంఎస్‌ఒ అడ్జువంట్‌ని కలిపి సరిగ్గా కలియబెట్టండి.

పునఃప్రవేశ కాలం: 24 గంటల తరువాత

పిహెచ్ఐ: 83 రోజులు

గరిష్ఠ పిచికారిల సంఖ్యతో సహా తరచుదనం: ఒకే 1 పిచికారి సిఫారసు చేయబడుతోంది.

కలుపునాశనిని ఏ పంటపై కూడా వినియోగించని దశలు: పంట దశకు ఆంక్షలు లేవు. కలుపులు మొలక వచ్చిన అనంతరం వాటిని నియంత్రించేందుకు ఉపయోగించాలి.

ఈ లేబుల్/కరపత్రంపై పేర్కొన్న వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలకు ఉపయోగించకూడదు.

నిల్వచేసే పరిస్థితులు: 1. ఈ కలుపునాశని గల ప్యాకేజీలను ఇతర పదార్థములకు ముఖ్యంగా ఆహారపదార్థములకు లేదా ప్రత్యేక గదులు లేదా ఆవరణాలల్లో గాకుండా వేరువేరు గదులు లేదా ఆవరణాలల్లో కలుపునాశనుల పరిమాణాన్నిబట్టి ప్రత్యేక అలమార్లలో పెట్టి తాళంవేసి బిగించి మాత్రమే ఉంచాలి. 2. వీటిని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణాలు మంచి గట్టికట్టడముల్తై, విశాలంగా, పొడిగా, మంచిగాలీ, వెలుతూరు ప్రసరించేలా వుండాలి, తద్వారా దీని ఆవిరివల్ల పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చును.

సురక్షిత ముందుజాగ్రత్తలు: 1. మిశ్రమం మరియు పిచికారి చేసేటప్పుడు రక్షణాత్మక దుస్తులు ధరించాలి. 2. వినియోగించిన తరువాత మలినపడిన బట్టలను ఉతకాలి మరియు శరీర భాగాలను కడగాలి. 3. వినియోగించేటప్పుడు పీల్చకండి, ధూమపానం, మద్యపానం చేయకండి, తినకండి మరియు ఏదీ నమలకండి.

విషపు లక్షణాలు: ప్రారంభ లక్షణాల్లో వికారం, వాంతులు, నిద్రమత్తు, డైస్ఫోనియా, తలనొప్పి, కంటి మరియు చర్మ చికాకు కలగవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స : ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే వెంటనే మలినపడిన దుస్తులు తొలగించండి. మలినపడిన చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో క్షుణ్ణంగా కడగండి. ఒకవేళ పీల్చితే, రోగిని మౌనంగా ఉంచండి, తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి. ఒకవేళ కంటికి తగిలితే ప్రభావిత కంటికి కనీసం 15 నిమిషాల పాటు కనురెప్పలు తెరచివుంచి నీళ్ళు చల్లుకోండి. ఒకవేళ మింగితే, వెంటనే నోటిని కడగండి మరియు తరువాత నీళ్ళు బాగా తాగండి. అపస్మారకంగా ఉన్న లేదా మూర్ఛలు కలిగినా ఎప్పుడూ వాంతులు తెప్పించవద్దు. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందండి. ఒకవేళ మింగితే, వెంటనే వైద్య సహాయం కోరండి మరియు లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఫిజీషియన్‌కి సలహా: విషం కలిగితే లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

విరుగుడు: నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏమిటో తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి రోగికి చికిత్స చేయండి.

హెచ్చరిక: ఖాళీ డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

వాడిన డబ్బాలను సురక్షితంగా విసర్జించుట: 1. ప్యాకేజిలని లేదా మిగులు మెటీరియల్‌ని మరియు యంత్రాలు కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యంలను నిరోధించేందుకు వీలుగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలెను. 2. వాడిన ప్యాకేజిలని మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించాలంటే ఆరుబయట వదిలేయకూడదు. 3. ప్యాకేజిలని పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతానికి దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

వేడికి మరియు బహిరంగ మంటకు దూరంగా ఉంచండి. పిల్లలకు అందుబాటులో లేకుండా ఉంచండి

Telugu

டோப்ராமிஜோன் 336 g/l (w/v) எஸ்சி

கிளாநதோ

தேர்ந்தெடுத்த களைக்கொல்லி

டோப்ரமிஜோன் 336 g/l (w/v) எஸ்சி ஒரு தேர்வுநிலை களைக்கொல்லி, மக்காச்சோளப் பயிரில் முளைவிட்டிருக்கும் புற்கள், அகன்ற இலைக் களைகள் போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்த சிறப்பாகப் பயன்படும்.

சேர்க்கை அமைப்பு :

வ. எண்.	கூறுப்பொருள்கள்	g/l
1.	டோப்ராமிஜோன் ஏ.ஐ.	336.0
2.	1,2-புரொபைலின் கிளைகோல்	70.0
3.	அடக்ட் ஆஃப் எதிலின் ஆக்ஸைடு டு பாலிபுரொபைலின் கிளைகோல்	30.0
4.	சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் புராடெக்ட் ஆஃப் ஃபினோல்சல்ஃபோனேட், யூரியா, ஃபினோல் அண்ட் ஃபார்மல்டிஹைட்	20.0
5.	பாலிடிமிதைல்சிலோக்ஸேன் இன் அக்விவஸ் எமல்ஸன்	5.0
6.	பாலிசாச்சரைட்	3.0
7.	1,2-பென்ஜிசோதியாஜோலின் -3-ஒன் பிளஸ் 2-மிதைல்-4-ஐசோதியாஜோலின் -3-ஆன்	2.0
8.	தண்ணீர்	தேவைக்கு ஏற்ப
	மொத்தம்	1000.0

அடர்த்தி : 1.13 கிராம்/செ.மீ.^{3}

பயன்படுத்தும் முறையும் பரிந்துரைகளும்:

கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பரிந்துரைகளைப் பின்பற்றி பயன்படுத்தும்போது, டோப்ராமிஜோன் 336 g/l (w/v) எஸ்சி மக்காச்சோளப்பயிரில் தோன்றும் புற்களையும் அகன்ற இலைக் களைகளையும் முளைவிட்டிருக்கும் பருவத்தில் சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தும்.

பயிர்	களைகள்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு மருந்தளவு			
		ஏ.ஐ. (கி)	தயாரிப்பு (மிலி)	நீர்க் கரைசல் (லிட்./ ஹெக்.)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (PHI)
மக்காச் சோளம்	• எலுசின் இண்டிகா • அரிசிப்புல் வகை • காக்காகால் புல் • குதிரைவாலி வகை • க்ளோரிஸ் பார்படா • பார்தினியம் ஹிஸ்டிரோ ஃபோரஸ் • டைஜிரா அர்வென்சிஸ் • அமரந்தஸ் விரிடிஸ் • பைசாலிஸ் வகை • ஆல்டர்நேந்ரா சொசில் • பண்ணைக்கீரை	25.2 முதல் 33.6 வரை கிராம் ஏ.ஐ/ஹெக் + MSO துணை ஊக்கியாக 2 மிலி / லிட். தண்ணீரில்	75 முதல் 100 மிலி + MSO துணை ஊக்கியாக 2 மிலி/ லிட். தண்ணீரில்	375	83

மருந்து தெளிக்கும் காலம் மற்றும் பயிர் வளர்ச்சி நிலை: களைகள் 2-3 இலை விட்டு வளர்ந்திருக்கும் நிலையில் டோப்ராமிஜோன் 336 g/l (w/v) எஸ்சி மருந்தை MSO துணை ஊக்கியாக 2.0 மிலி/ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும். பருவ நிலை: 2 மணி நேரத்தில் மழை பெய்யக் கூடும் என்ற பருவ நிலையில் மருந்தைத் தெளிக்க கூடாது.

மண் அமைப்பு: நிலத்தை உழுது மருந்து தெளிக்கும்போது மண் ஈரப்பதம் கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ளவும்.

மருந்து தெளிக்கும் முறை, பயன்படும் கருவிகள், கூம்பு முனை வகை: தட்டை விசிறி கூம்பு முனையுள்ள நாப்சாக் ஸ்பிரேயரைப் பயன்படுத்தி களைக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கவும். தேவையான மருந்தை MSO துணை ஊக்கியாக போதுமான தண்ணீருடன் கலந்து, களைகள் நன்றாக நனையும் விதத்தில் தெளிக்கவும்.

மருந்தளவு: ஒரு ஹெக்டேருக்கு 75 முதல் 100 மிலி தயாரித்த மருந்து + MSO துணையூக்கியாக 2 மிலி/ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் விதம் பயன்படுத்தவும்.

மருந்து கலக்கும் குறிப்பு: 3-4 மிலி டோப்ராமிஜோன் 336 g/l (w/v) எஸ்சி மருந்தை பிரதி 15 லிட்டர் தண்ணீரில் பொதுக் கரைசலாகவும், 30 மிலி MSO துணையூக்கியை அதில் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்க வேண்டும்.

மறுஉபயோகம் செய்யும் காலம்: 24 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு

பிஎச்ஐ: 83 நாட்கள்

அதிகபட்சம் எவ்வளவு முறை தெளிக்கலாம்: ஒரே ஒரு தெளிப்பு மட்டும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

எந்தப் பருவத்தில் மருந்து தெளிப்பு செய்யக் கூடாது: பயிர் வளர்ச்சியைப் பொருத்த மட்டில் எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை. களைகள் முளைவிட்ட பிறகே இந்த மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும்.

இந்த லேபிளில்/துண்டு பிரசுரத்தில் பரிந்துரை செய்யப்படாத பயிர்கள் மீது இந்த மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.

சேமிப்பு விதிமுறைகள்: 1. களைக்கொல்லி உள்ள கலன்களை தனி அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் முக்கியமாக உணவு சம்பந்தமான பொருட்கள் வைத்துள்ள இடத்தில் இருந்து தூரத்தில் சேமித்து வைப்பது நலம். மற்றும் களைக்கொல்லி அளவைப் பொறுத்து தனி அலமாரியில் பூட்டி வைப்பது நல்லது. 2. களைக்கொல்லி சேமித்து வைத்துள்ள இடம் நல்ல வெளிச்சம், நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, இதமான காற்றோட்ட முள்ள மற்றும் நிறைவான பரப்பளவு உள்ளதாக அமைந்திருத்தல் அவசியம். அதன்மூலம் மருந்து ஆவியால் கலப்படம் ஆகாமல் தடுக்கலாம்.

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. மருந்தைக் கலக்கும் போதும் தெளிக்கும் போதும் முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிந்துகொள்ள வேண்டும். 2. மருந்தைத் தெளித்த பிறகு, மாசுபட்ட ஆடைகளையும் சருமத்தையும் நன்றாகச் சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும். 3. மருந்து காற்றைச் சுவாசிக்கக் கூடாது. மருந்து தெளிக்கும் போது, புகைபிடித்தல், குடித்தல் அல்லது வாயில் மெல்லுதல், சாப்பிடுதல் கூடாது.

நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: குமட்டல், வாந்தி, தூக்கமின்மை, பார்வை மங்குதல், தலைவலி, கண் மற்றும் சரும எரிச்சல் அறிகுறிகள் பலவாறு சேர்ந்திருக்கும் ஆரம்ப அறிகுறிகள் தெரிய வரும்.

முதல் உதவி : சருமத்தில் மருந்து பட்டிருந்தால் மருந்து பட்ட துணிகளை உடனே அகற்றவும், மருந்து பட்ட சருமத்தை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் நன்கு சுத்தம் செய்யவும். மருந்தை உட்சுவாசித்து இருந்தால், நோயாளியை அமைதியாக இருக்கச் செய்து, காற்றோட்டமான இடத்துக்கு கூட்டிச் செல்லுங்கள். கண்களில் மருந்து பட்டிருந்தால், குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்கள் குழாயிலிருந்து விழும் நீரில் கண்களை திறந்து வைத்தபடி கண்களை சுத்தம் செய்யுங்கள். ஒருவேளை விழுங்கியிருந்தால், தாமதிக்காமல் மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும். அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

மருத்துவருக்கு ஆலோசனை: நச்சுபட்ட அறிகுறிகள் இருந்தால், அறிகுறிகளுக்கேற்ப நச்சுமுறிவு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட நச்சுமுறிவு எதுவுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

எச்சரிக்கை: காலி கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்துவது அபாயம்.

காலிபாத்திரங்களைப் பாதுகாப்பாக அகற்றுதல்: 1. சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க அல்லது எஞ்சிய மருந்து மற்றும் எந்திரங்கள் மற்றும் தெளிப்பான்கள் மற்றும் டப்பாக்களை கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க, அவற்றை வெளியில் விட்டுவைக்கக் கூடாது. 3. காலி டப்பாக்கள் உடைக்கப்பட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

வெப்பம் மற்றும் அணைக்கப்படாத தீயிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். குழந்தைகளுக்கு எட்டாத இடத்தில் வைக்கவும்

Tamil

ٹوپرامیزون336گرام/لیٹر/ (وزن/حجم)ایس سی

گِلارڈو

منتخبہ نباتات کش

ٹوپرامیزون 336 گرام/لیٹر (وزن/حجم) ایس سی ایک ایسا نباتات کش ہے جس کی سفارش مکئی کی فصل میں ظاہر ہونے والی گھاس پھوس اور بڑے پتوں والی ویڈس کو قابو میں کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔

مرکب اجزا:

نمبر شمار	اجزا	g/l
1	ٹوپرامیزون اے۔آئی۔	336.0
2	1،2۔ پروپیلین گلائیکول	70.0
3	پولی پروپیلین گلائیکول کے اتھائلین آکسائڈ کا ایڈکٹ	30.0
4	فینول سلفونیٹ، یوریا، فینول اور فارمل ڈی ہائڈ کے کنڈینسیشن پروڈکٹ کا سوڈیم نمک	20.0
5	ایکویس املزن میں پولی ڈائی میتھائل سیلوکسین	5.0
6	پولی سیکرائڈ	3.0
7	1،2۔ بینزی سوتھیازولین۔3۔ ون پلس 2۔ میتھائل۔4۔ آئسوتھیازولین۔3۔ آن	2.0
8	پانی	q.s.
	کل	1000.0

کثافت: 1.13 g/cm^{3}

چھڑکاؤ اور استعمال کے لئے سفارش:

نیچے دی گئی سفارش کے مطابق استعمال کرنے پر، ٹوپرامیزون 336 گرام/لیٹر (وزن/حجم) ایس سی جس کی سفارش مکئی کی فصل میں ظاہر ہونے والی گھاس پھوس اور چوڑے پتوں والی ویڈس کو قابو میں کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔

فصل	ویڈس	خوراک فی ہیکٹیر			گزشتہ چھڑکاؤ اور فصل کے درمیان انتظار کی مدت (PHI)
		اے آئی گرام / ہیکٹیر	مرکب گرام / ہیکٹیر	پانی میں محلول (لیٹر)	
مکئی	• ایلوسائن انڈیکا • ڈیجیٹاریا سانگوئنالس • ڈکٹائلوکٹینیم ایجپٹیم • اچینوکلوا ایس پی پی • کلورس باربانا • پارتھینیم ہسٹیروفورس • ڈائگیرا آروینسس • امارانتھس ویریڈیس • فیزالیس منیما • الٹرنانتھیرا سیسیلس • سیلوسیا ارجنٹیا	25.2 سے 33.6 g a.i/ha +MSO ایڈ جوینٹ پانی @2ml	75 سے 100ml + MSO ایڈ جوینٹ پانی @2ml	375	83

استعمال کا وقت اور فصل کا مرحلہ: ٹوپرامیزون 336 گرام/لیٹر (وزن/حجم) ایس سی ظاہر ہونے والے ابتدائی مرحلے میں عمل کرنے والا ایک ایسا نباتات کش ہے جس کا استعمال اس وقت کرنا چاہئے جب گھاس پھوس میں صرف 2-3 پتیاں پیدا ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا استعمال MSO ایڈ جوینٹ @ 2.0 ml فی لیٹر پانی کے ساتھ کرنا چاہئے۔

موسم کی حالت: اگر بارش متوقع ہو تو اس کے 2 گھنٹوں کے اندر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

مٹی: استعمال سے قبل زمین کی اچھی طرح جتائی کریں اور زمین ہموار کریں۔

استعمال کی تکنیک، آلے کا سائز، نوزل کی قسم: نباتات کش کے چھڑکاؤ کے لئے فلیٹ فین نوزل سے فٹ نیپ سیک اسپریئر کا استعمال کریں۔ گھاس پھوس فولیج کا مکمل طور پر احاطہ کرنے کے لئے حسب خواہ پانی کی مقدار استعمال کرتے ہوئے MSO ایڈ جوینٹ کے ساتھ نباتات کش کی تجویز کردہ مقدار استعمال کریں۔

مقدار: 75 سے 100 ملی لیٹر فارمولیشن + MSO ایڈ جوینٹ 2ml فی لیٹر پانی فی ہیکٹیر۔

مکسنگ کے لئے ہدایت: فی 15 لیٹر پانی 3-4 ملی لیٹر ٹوپرامیزون 336 گرام/لیٹر (وزن/حجم) ایس سی لے کر اس کا اسٹاک تیار کریں اور اس میں 30 ملی لیٹر MSO ایڈ جوینٹ ملا کر اچھی طرح ملائیں۔

دوبارہ داخل ہونے کی مدت: 24 گھنٹے بعد

فصل کا وقفہ: 83 دن

چھڑکاؤ کی زیادہ سے زیادہ تعداد اور فریکوینسی: صرف 1 چھڑکاؤ کی سفارش کی جاتی ہے۔

وہ مراحل جس دوران کسی بھی فصل پر نباتات کش کا استعمال نہیں کرنا چاہئے: فصل کے مرحلے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ گھاس پھوس کے ظاہر ہونے پر ان کے کنٹرول کے لئے استعمال کی جائے۔

احتیاط: "اس لیبل / پرچے میں بتائی گئی فصلوں کے علاوہ کسی اور فصل پر استعمال نہ کریں۔"

ذخیرہ: 1۔ نباتات کش کے پیکیٹوں کو دیگر اشیاء کے ذخیرے کے لئے استعمال ہونے والے کمروں یا جگہوں سے دور علیحدہ کمروں اور جگہوں پر منقفل الماریوں میں رکھنا چاہئے، اس کا دار و مدار نباتات کش کے مقدار اور اس کی فطرت پر ہوتا ہے۔ 2۔ نباتات کش کو ذخیرہ کرنے کے لئے بنے کمرے اور جگہیں مضبوط، خشک، روشن اور ہوادار اور حسب خواہ رقبے کے ہونے چاہئیں۔ اسٹور کی کیفیت خشک اور ٹھنڈی ہونی چاہئے۔

حفاظتی اقدامات: 1۔ مکسنگ اور چھڑکاؤ کے وقت حفاظتی کپڑے پہننا چاہئے۔ 2۔ استعمال کے بعد آلودہ کپڑے اور جسم کے آلودہ حصوں کو دھوئیں۔ 3۔ سانس کے ذریعے جسم میں جانے سے بچائیں، استعمال کے وقت سگریٹ نوشی، پینے، کھانے اور چبانے سے گریز کریں۔

زہر کی علامات: اس کی ابتدائی علامات میں متلی، قے، بے خوابی، ڈسفونیا، سر درد، آنکھ اور جلد میں کھجلی جیسی ملی جلی کیفیات شامل ہیں۔

ابتدائی طبی تدابیر: اگر جلد کے رابطے میں آ گئے ہوں، تو آلودہ کپڑوں کو فوری طور پر نکالیں۔ آلودہ جلد کو صابن اور ڈھیر سارے پانی سے دھوئیں۔ اگر نگل لیا گیا ہو تو مریض کو اطمینان دلائیں اور اسے باہر تازہ ہوا میں لائیں۔ اگر آنکھیں آلودہ ہو گئی ہوں، تو متاثرہ آنکھوں کو صاف چلتے پانی سے، آنکھیں کھلی رکھ کر کم از کم 15 منٹوں تک دھوئیں۔ اگر پیٹ میں داخل ہو جائے، تو فوری طور پر طبی مدد حاصل کریں اور علامات کے مطابق علاج کریں۔

ڈاکٹر کو مشورہ: زہر کی علامت ظاہر ہونے پر، علامت کے مطابق علاج کریں۔

تریاق: کسی خاص تریاق کا علم نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

انتباہ: خالی ڈبوں کا دوبارہ استعمال خطرناک ہے۔

استعمال شدہ ڈبوں کا محفوظ طریقے سے زیاں: 1۔ نباتات کش کے استعمال شدہ پیکیٹوں یا اضافی مال اور مشینوں کی واشنگ کو ایسے محفوظ طریقے سے ضائع کریں کہ اس سے ماحولیاتی یا آبی آلودگی نہ ہو۔ 2۔ دوبارہ استعمال سے بچنے کے لئے استعمال شدہ پیکیٹ کو باہر نہیں چھوڑنا چاہئے۔ 3۔ پیکیٹوں کو توڑ کر انسانی آبادی سے دور دفن کر دینا چاہئے۔

گرمی اور آگ کی کھلی لپٹوں سے دور رکھیں۔

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

Urdu

Topramezone 336 g/l (w/v) SC

GILARDO®

Selective Herbicide

टोपरामिझोन ३३६ ग्रा/ली (भार/आयतन) एस सी

गिलारडो

चुनिंदा खरपतवारनाशक

ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. (ਵ/ਵਾ) ਐਸਸੀ

ਗਿਲਾਰਡੋ

ਚੋਣਾਤਮਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

Read Instructions carefully before use.
प्रयोग के पहले सूचनाएँ ध्यानपूर्वक पढ़ लिजिए।

Manufactured by :
IPT (VTA) Pergande, GmbH, Wilfried Pergande
Platz 106369 WeiBandt-Golzau, Germany.

निर्माता :
आई.पी.टी. (वी टी ए) परगन्धी, जीएमबीएच, वील्फ्रीड परगन्धी
प्लट्ज १०६३६९ वीईबंड-गोलझाउ, जर्मनी.

Supplier : BASF, SE, Germany.
सप्लायर : बी ए एस एफ, एस ई, जर्मनी.

Imported and Re-packed by :
BASF India Limited.
Registered office :
1st Floor, Vibgyor Towers, Plot No.62, "G" Block, BKC,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Factory: Unit No. 4 ,Village Nimbua,
P. O Mubarakpur - 140201,
Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab.

आयातकर्ता तथा पुनःपैकिंगकर्ता :
बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय :
१ ली मंजिल, वीबजॉर टॉवर्स, प्लॉट नं. ६२, ''जी'' ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई – ४०० ०५१.
फैक्टरी : यूनिट नं. ४, गांव निंबुआ,
पो. मुबारकपूर – १४०२०१,
तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

Marketed by:

Marketed by: FMC India Private Limited, Embassy Star 8,
1st Floor, Palace Road, High Grounds, Bangalore,
Karnataka - 560052, India

Consumer Care Cell:
Manager Consumer cell,

विपणनकर्ता:

विक्रेता : एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ऐम्बेसी स्टार ८,
फर्स्ट फ्लोर, पैलेस रोड, हाई ग्राउंडस, बेंगलौर,
कर्नाटका – ५६००५२, भारत।

GILARDO® is a registered trademark of BASF group company