ਕਿਵਾਲੋ®

ਫ਼ਲੁਓਪਾਇਰਮ ੧੭.੭% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ + ਟੇਬੁਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੧੭.੭% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐਸ. ਸੀ.

(ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ)

ਫ਼ਲੁਓਪਾਇਰਮ ੧੭.੭% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ + ਟੇਬੁਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੧੭.੭% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐਸ. ਸੀ. ਇੱਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਉਡਰ ਵਰਗੀ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਟਿੱਕਾ ਰੋਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਲੋ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ੧੭੭ ਗ੍ਰਾਮ ਫ਼ਲੁਓਪਾਇਰਮ ਅਤੇ ੧੭੭ ਗ੍ਰਾਮ ਟੇਬੁਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਦੇ ਕ੍ਰੀਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿ ਲੀਟਰ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ੨੦੦ ਗ੍ਰਾਮ ਫ਼ਲੁਓਪਾਇਰਮ ਅਤੇ ੨੦੦ ਗ੍ਰਾਮ ਟੇਬੁਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਕ੍ਰੀਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ :

ਘਟਕ	ਮਾਤਰਾ (ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ)
ਫ਼ਲੁਓਪਾਇਰਮ (ਕ੍ਰੀਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ)	੧੭.੭੦%
ਟੇਬੁਕੋਨਾਜ਼ੋਲ (ਕ੍ਰੀਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ)	੧੭.੭੦%
ਜ਼ੈਂਥਮ ਗੱਮ	੦.੧੨%
ਓਕਸੀਰੇਨ, ੨ – ਮਿਥਾਇਲ –, ਪੋਲੀਮਰ ਓਕਸੀਰੇਨ (ਡਿਸਪਰਸੈਂਟ)	੨.੨੧%
ਫੋਰਮਲਡੀਹਾਇਡ (ਡਿਸਪਰਸੈਂਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਪਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟਸ ਕੰਡੈਂਸਡ	੦.੭੧%
ਪ੍ਰੋਪੀਲੇਨ ਗ਼ਲਾਇਕੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥੋਕਸੀਲੇਟੇਡ ਪੋਲੀਮੇਥਾਸਾਇਲੇਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਡਿਸਪਰਸੈਂਟ)	੩.੫੪%
ਪੋਲੀਸਿਲੋਕਸੇਨਸ, ਡਿ–ਮੀ (ਐਂਟੀਫੋਮ)	੦.੩੫%
੧, ੨ ਬੇਂਜ਼ੀਸੋਥਿਯਾਜ਼ੋਲ – ੩, (੨ ਐਚ) –ਵੱਨ (ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ)	੦.੦੯%
੧, ੨ ਪ੍ਰੋਪੇਨੇਡਿਯਲ (ਐਂਟੀਫ੍ਰੀਜ਼)	੨.੨੧%
ਡੀ –ਗ਼ਲੁਕੋਪਾਇਰਾਨੋਸ, ਉਲੀਗੋਮੇਰਿਕ , ਡੀਸਾਇਲ ਓਕਟਾਇਲ ਗ਼ਲਾਇਕੋਸਾਇਡਸ (ਡਿਸਪਰਸੈਂਟ)	੫.੭੩%
ਪੋਲੀ (ਔਕਸੀ–੧,੨ –ਏਥੇਨਸ਼ਿਯਲ), α ਆਇਸੋਟ੍ਰਿਡੇਸਾਇਲ –ω–ਹਾਇਡ੍ਰੋਕਸੀ (ਡਿਸਪਰਸੈਂਟ)	੨.੨੧%
ਪਾਣੀ, ਡੀਮਿਨਰਲਾਇਜ਼ਡ (ਘੁਲਸ਼ੀਲ)	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ
ਕੁਲ	੧੦੦.੦੦ %

ਘਨਤਾ ੨੦ ਡਿਗਰੀ ਤੇ : ੧.੧੩੦ ਗ੍ਰਾਮ / ਮਿ.ਲੀ.

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ :

ਫਸਲ	ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਹੇਕਟਰ			ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ. ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿ.)	
ਅੰਗੂਰ	ਪਾਉਡਰ ਵਰਗੀ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਟਿੱਕਾ ਰੋਗ	ਫ਼ਲੁਓਪਾਇਰਮ ੧੧੨.੫+ ਟੇਬੁਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੧੧੨.੫	੫੬੨.੫	੭੫੦– ੧੦੦੦	੧੦
ਮਿਰਚ	ਪਾਉਡਰ ਵਰਗੀ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਟਿੱਕਾ ਰੋਗ	ਫ਼ਲੁਓਪਾਇਰਮ ੧੦੦+ ਟੇਬੁਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੧੦੦	੫੦੦	੫੦੦	੫

ਪੋਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਹਾਈ ਵੋਲਯੂਮ ਵਾਲੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ੧ਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ੧੦ – ੧੫ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਚੇਤਾਵਨੀ : ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਪਾਲਨ / ਅੰਤਰ ਫ਼ਸਲ ਮੱਛੀਪਾਲਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : ਖਾਦਯ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ, ਚਿੰਗਮ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਮੈਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਨ : ਸਿਰ ਪੀੜ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਅਕੜਾਅ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ : ਮੈਲੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਓ। **ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਉਣ ਤੇ** : ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਟਾ ਦਿਉ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਓ। **ਚਮੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ** : ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿਉ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਓ। **ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ** : ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। **ਨਿਗਲ ਲੀਤੇ ਜਾਉਣ ਤੇ** : ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਲੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਦਿਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ–ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਭੰਡਾਰਣ : ੧. ਜਿਹੜੇ ਡਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨. ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਬਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਭਾਫ਼ / ਹਵਾ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ੧. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ੨. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ੩. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਧੋਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸੱਕੇ।

ਸਾਵਧਾਨੀ : ਇਸ ਲੇਬਲ / ਪਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਵਰਤੋ।

কিবালো®

ফ্লুঅ'পাইৰাম ১৭.৭% ডব্লিউ / ডব্লিউ + টেবুক'নাজল ১৭.৭% ডব্লিউ / ডব্লিউ এচচি

(সাশৰীৰ ভেঁকুৰনাশক)

ফ্লুঅ'পাইৰাম ১৭.৭% ডব্লিউ / ডব্লিউ +টেবুক'নাজল ১৭.৭% ডব্লিউ / ডব্লিউ এচচি হৈছে এবিধ সাশৰীৰ ভেঁকুৰনাশক যিটো আঙুৰ আৰু জলকীয়াত হোৱা পাউডাৰি মাইল্ডিউ আৰু অ্যান্থ্ৰেকনোজ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অনুমোদন কৰা হয় । ইয়াৰ প্ৰতি কিলো সূত্ৰবদ্ধত ১৭৭ গ্ৰাম ফ্লুঅ'পাইৰাম আৰু ১৭৭ গ্ৰাম টেবুক'নাজল সক্ৰিয় উপাদান থাকে যিটো প্ৰতি লিটাৰ সূত্ৰবদ্ধত ২০০ গ্ৰাম ফ্লুঅ'পাইৰাম আৰু ২০০ গ্ৰাম টেবুক'নাজল সক্ৰিয় উপাদানৰ সমান ।

ৰাসায়নিক গঠন:

উপাদান	অন্তৰ্ভুক্ত (ডব্লিউ/ ডব্লিউ)
ফ্লুঅ'পাইৰাম (সক্ৰিয় উপাদান)	১৭.৭০%
টেবুক'নাজল (সক্ৰিয় উপাদান)	১৭.৭০%
জান্থাম গাম (থিক্নাৰ)	০.১২%
অক্সিৰেন, ২ -মিথাইল-, পলিমাৰ অক্সিৰেন (ডিস্পাৰ্চেন্ট)	২.২১%
ফৰ্মেলডিহাইড (ডিস্পাৰ্চেন্ট) সহ নেপথালিন চালফোনেট কনডেন্স্‌ড	০.৭১%
প্ৰপিলিন গ্লাইকোল আৰু পানীৰ মিশ্ৰণত ইথক্সিলেটেড পলিমিথাক্ৰাইলেট (ডিস্পাৰ্চেন্ট)	০.৫৪%
পলিচিলোক্সেন্‌চ, ডাই-মি (এৰ্ন্টিফোম)	০.৩৫%
১, ২-বেঞ্জিচথিয়াজ'ল-৩ (২ এইচ) ওৱান (প্ৰিজাৰ্ভেটিভ)	০.০৯%
১,২ -প্ৰপেনডায়োল (এৰ্ন্টিফ্ৰিজ)	২.২১%
ডি-গ্লুক'পাইৰান'জ, অলিগোমেৰিক, ডেকাইল অক্টাইল গ্লাইকোচাইড্‌চ (ডিস্পাৰ্চেন্ট)	৫.৭৩%
পলি (অক্সি)- ১,২-ইথেনডাইল), আল্ফা-আইচ'ট্ৰাইডেকাইল-অমেগা-হাইড্ৰক্সি-(ডিস্পাৰ্চেন্ট)	২.২১%
পানী, ডিমিনাৰেলাইজ্‌ড (দ্ৰাৱক)	পৰ্য্যাপ্ত পৰিমাণ
মুঠ	১০০.০০%

ঘনত্ব ২০ ডিগ্ৰীত : ১.১৩০ গ্ৰাম / মিলি

প্ৰয়োগৰ বাবে অনুমোদন:

শস্য	ৰোগৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা প্ৰতি হেক্টৰ			শেষৰবাৰ ছটিওৱাৰ পৰা শস্য চপোৱালৈকে প্ৰতীক্ষাৰ সময় (দিনত)
		সক্ৰিয় উপাদান (গ্ৰাম)	সূত্ৰবদ্ধ (মিলি)	পানীত মিশ্ৰণ (লিটাৰ)	
আঙুৰ	পাউডাৰি মাইল্ডিউ আৰু অ্যান্থ্ৰেকনোজ	ফ্লুৰ'পাইৰাম ১১২.৫ + টেবুক'নাজল ১১২.৫	৫৬২.৫	৭৫০– ১০০০	১০
জলকীয়া	পাউডাৰি মাইল্ডিউ আৰু অ্যান্থ্ৰেকনোজ	ফ্লুৰ'পাইৰাম ১০০ + টেবুক'নাজল ১০০	৫০০	৫০০	৫

উদ্ভিদ সুৰক্ষা সঁজুলি আৰু প্ৰয়োগৰ সময়: ভেঁকুৰনাশক ছটিয়াবৰ বাবে উচ্চ আয়তনৰ নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰক । ৰোগ দেখাৰ লগে লগে অতি সোনকালে ১ম বাৰ ছটিয়াওক আৰু নজৰ দি থাকক তথা ৰোগৰ জটিলতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ১০–১৫ দিনত এবাৰ বা দুবাৰ আকৌ ছটিয়াওক

সাৱধান: যি অঞ্চলত মীনপালন / আন্ত: ফচল মীনপালন হয় তাত এই উৎপাদন নছটিয়াব । এই উৎপাদন মাছৰ বাবে বিষাক্ত ।

সতৰ্কতাসমূহ: খোৱাবস্তু, পানীয় আৰু পশুৰ দানাৰ পৰা দূৰৈত ৰাখক আৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পাব নোৱাৰাকৈ থওক । ছাল, চকু আৰু কাপোৰত লাগিবলৈ নিদিব । প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত তথা খোৱাৰ আগতে চাবোন আৰু পানীৰে হাত ভালদৰে ধুই ল'ব । এই উৎপাদন প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত ব্যক্তিগতভাৱে সুৰক্ষামূলক পোছাক পৰিধান কৰি ল'ব । লেতেৰা হোৱা কাপোৰ ততালিকে সলাই পেলাওক আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ধুই ল'ব ।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ: মূৰৰ বিষ, ওকালি, বমি, মূৰ ঘূৰণি, দুৰ্বলতা, অত্যন্ত ভাগৰ লগা, অপশ্বাস, ব্যাক্ষোভ ।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা: লেতেৰা কাপোৰ ততালিকে সলাই পেলাওক আৰু সুৰক্ষিত ঠাইত থওক । **উশাহত ভিতৰলৈ যোৱা:** কেনেবাকৈ উশাহত গ'লে ৰোগীক বিশুদ্ধ বতাহ চলাচল কৰা ঠাইলৈ নিয়ক, ঠাণ্ডা লাগিবলৈ নিদিব আৰু জিৰাবলৈ দিয়ক । ততালিকে চিকিৎসকক মাতক । **ছালত লাগিলে:** কেনেবাকৈ ছালত লাগিলে, কাপোৰ সলাই পেলাওক গাটো চাবোন আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে ধুই পেলাওক । চিকিৎসকক মাতক । **চকুত লাগিলে:** কেনেবাকৈ চকুত লাগিলে, প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে ধোৱক আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । **পেটলৈ গ'লে:** যদি কেনেবাকৈ পেটলৈ যায় বমি নকৰোৱাব । মুখখন ভালকৈ ধোৱাওক আৰু এঢোকমান পানী গিলিবলৈ দিয়ক । চিকিৎসকৰ সহায় লওক ।

বিষ প্ৰতিষেধক: কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্টচিকিৎসাৰ বিষয়ে জনা নাযায় । লক্ষণগতভাৱে চিকিৎসা কৰাওক ।

সংগ্ৰাহলয়: ১. ভেঁকুৰনাশক থকা পেকেটবোৰ অন্য সামগ্ৰী বিশেষকৈ খাদ্যবস্তু থোৱা কোঠালি বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰত সুকীয়া কোঠালি বা চৌহদত জমা কৰি থোৱা উচিত বা ভেঁকুৰনাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সুকীয়া আলমাৰিত তলা মাৰি থোৱা উচিত । ২. ভেঁকুৰনাশক সংগ্ৰহ কৰি ৰখা কোঠা বা চৌহদ ভালকৈ নিৰ্মিত, পোহৰ পৰা, শুকান, বতাহ চলাচল কৰিব পৰা যথেষ্ট আহল-বহল হ'ব লাগে যাতে এই সামগ্ৰীত জলবাষ্প লাগি নষ্ট নহয় ।

খালী পাত্ৰসমূহৰ নিষ্পত্তি: ১. খালী পাত্ৰবোৰ জনবসতিপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা আঁতৰত ভাঙি-ছিঙি পুতি থ'ব লাগে । ২. ব্যৱহৃত পেকেটবোৰ যাতে পুন:ব্যৱহাৰ নহয় তাৰ বাবে এইবোৰ বাহিৰত থ'ব নেলাগে । ৩. পেকেটবোৰ বা অতিৰিক্ত সামগ্ৰী আৰু মেছিন তথা পাত্ৰ ধোৱা পানী সুৰক্ষিতভাৱে নিষ্পত্তি কৰিব যাতে বাতাবৰণ তথা পানী প্ৰদূষিত নহয় ।

সতৰ্কতা : এই লেবেলত / লিফ্লেটত উল্লেখিত শস্য বাদ দি আন শস্যত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় ।

কিবালো®

ফ্লুওপাইরাম ১৭.৭% ডব্লিউ / ডব্লিউ + টেবুকোনাজোল ১৭.৭% ডব্লিউ / ডব্লিউ এসসি

(পদ্ধতিমূলক ছত্রাকনাশক)

ফ্লুওপাইরাম ১৭.৭% ডব্লিউ / ডব্লিউ + টেবুকোনাজোল ১৭.৭% ডব্লিউ / ডব্লিউ এসসি হল একটি পদ্ধতিমূলক ছত্রাকনাশক যেটি আঙুর এবং লঙ্কা গাছের পাতার উপরে স্প্রে করার জন্যে ব্যবহার করা হয় পাউডারি মাইল্ডিউ এবং অ্যান্থ্রাকনোজ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্যে । এর প্রতি কেজি দ্রবণের মধ্যে ১৭৭ গ্রাম ফ্লুওপাইরাম এবং ১৭৭ গ্রাম টেবুকোনজোল সক্রিয় উপাদান আছে, যেটি ২০০ গ্রাম ফ্লুওপাইর‍্যাম এবং ২০০ গ্রাম টেবুকোনাজোল সক্রিয় উপাদানের এক লিটার দ্রবণের সমতুল্য ।

রাসায়নিক গঠন :

প্রক্রিয়া	পরিমাণ (ডব্লিউ/ডব্লিউ)
ফ্লুওপাইর‍্যাম (সক্রিয় উপাদান)	১৭.৭০%
টেবুকোনাজোল (সক্রিয়উপাদান)	১৭.৭০%
জ্যানাথন গাম (থিকনার)	০.১২%
অক্সিরেন, ২ – মিথাইল – পলিমার অক্সিরেন (ডিস্পার্স্যান্ট)	২.২১%
ন্যাপথেলিন সালফোনেটেস কন্ডেন্সড উইথ ফর্ম্যালডিহাইড) (ডিস্পার্স্যান্ট)	০.৭১%
এথক্সিলেটেড পলিমিথেক্রিলেট ইন প্রপিলিন গ্লাইকল এবং জল (ডিস্পার্স্যান্ট)	০.৫৪%
পলিসিলক্সেনেস, ডি-মি (অ্যান্টিফোম)	০.৩৫%
১,২ – বেনজিসোথিয়াজল – ৩ (২ এইচ) ওয়ান (প্রিজার্ভেটিভ)	০.০৯%
১,২ – প্রপেনিডিওল (অ্যান্টিফ্রিজ)	২.২১%
ডি – গ্লুকোপাইরেনোজ, অলিগোমেরিক, ডিসাইল অক্টাইল গ্লাইকোসাইডস (ডিস্পার্সেন্ট)	৫.৭৩%
পলি (অক্সি – ১,২ – ইথেনেডাইল)	
α আইসোট্রাইডেসাইল – ω হাইড্রক্সি – (ডিস্পার্সেন্ট)	২.২১%
জল, ডিমিনারেলাইজ্‌ড (সলভেন্ট)	কিউ.এস.
মোট	১০০.০০%

ঘনত্ব ২০° সে : ১.১৩০ গ্রাম / মিলি

ব্যবহারের জন্য সুপারিশকরণ:

শস্য	রোগের সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টরের জন্যে মাত্রা			শেষবার স্প্রে করা এবং ফসল তোলার সময়ের অপেক্ষা (দিনের হিসাবে)
		এ.আই (গ্রাম)	দ্রবণ (মিলি)	জলে দ্রবনীয় (লিটার)	
আঙুর	পাউডারি মাইল্ডিউ এবং অ্যান্থ্রেকনোজ	ফ্লুওপাইর‍্যাম ১১২.৫ + টেবুকোনেজোল ১১২.৫	৫৬২.৫	৭৫০– ১০০০	১০
লঙ্কা	পাউডারি মাইল্ডিউ এবং অ্যান্থ্রেকনোজ	ফ্লুওপাইর‍্যাম ১০০ + টেবুকোনেজোল ১০০	৫০০	৫০০	৫

গাছ সুরক্ষার সরঞ্জাম এবং ব্যবহারের সময়কাল : হাই ভলিউম দিয়ে ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার দিয়ে ছত্রাকনাশক স্প্রে করুন । যে মুহূর্তে রোগ দেখতে পাবেন, ১ম স্প্রে করতে হবে এবং রোগের কঠোরতার উপর নির্ভর করে ১০ – ১৫ দিনের অন্তরে আরো এক বা দুই স্প্রে করতে হবে ।

সতর্কতা : জলজ উদ্ভিদ বা অঞ্চল যেখানে জলজ প্রাণীর চাষ হয় বা এই ধরণের জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদের চাষ হয় এমন জায়গায় স্প্রে করবেন না । এই উৎপাদনটি মাছের জন্যে খুবই বিষাক্ত ।

সাবধানতা : খাদ্য, পানীয় এবং পশুর খাদ্য যেখানে থাকে এমন জায়গা থেকে এবং পশুর খাদ্য যেখানে থাকে, সেখান থেকে দূরে রাখুন । ত্বক, চোখ এবং পোশাকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন । ব্যবহারের পরে এবং খাবারের আগে, কিছু চিবানো বা তামাকের ব্যবহার করার আগে হাত সাবান এবং জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নেবেন । ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরে প্রোডাক্টটি ব্যবহার করবেন । উৎপাদন লেগে যাওয়া পোশাক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলুন এবং দ্বিতীয়বার ব্যবহারের আগে ধুয়ে নিন ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, বমি হওয়া, বমি পাওয়া, দুর্বলতা, ক্লান্তি, অসাড়ভাব, খিঁচুনি ।

প্রাথমিক চিকিৎসা : ছোঁয়াচ লাগা পোশাক সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলুন এবং নিরাপদে নষ্ট করে ফেলুন । **শ্বাসগ্রহণ :** যদি নিঃশ্বাসের সাথে ভিতরে চলে যায়, তবে রোগীকে তাজা বাতাসের মধ্যে নিয়ে যান এবং রোগীকে উষ্ণ রাখুন এবং বিশ্রাম দিন । অবিলম্বে কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান । **ত্বকের সাথে ছোঁয়াচ :** ত্বকের ছোঁয়াচ লাগলে, পোশাক খুলে ফেলুন, ত্বকে সাবান এবং প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন । **চোখের সাথে ছোঁয়াচ :** চোখের সাথে ছোঁয়াচ লাগার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন এবং ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন । **হজম :** যদি দুর্ঘটনাবশত গলা দিয়ে চলে যায়, তবে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না । মুখ ধুয়ে দিন এবং অল্প অল্প করে চুমুক দিয়ে জল খেতে থাকুন । ডাক্তারের সাহায্য নিন ।

প্রতিষেধক : বিশেষ কোন প্রতিষেধক জানা নেই । উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন ।

সংগ্রহ : ১. যে প্যাকেজের মধ্যে ছত্রাকনাশক আছে সেগুলিকে আলাদা ঘর অথবা জায়গায় রাখতে হবে, এবং যে ঘরে অন্যান্য বস্তু রাখা হয়, সেই জায়গা থেকে দূরে সংগ্রহ করতে হবে আলাদা ঘরে বা আলমারীতে তালা চাবি দিয়ে ছত্রাকনাশকের ধরণ এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে । ২. যে ঘরে ছত্রাকনাশক রাখবেন সেটি যেন দৃঢ় পোক্ত, আলোহাওয়াযুক্ত, শুকনো এবং যথেষ্ট আয়তনযুক্ত হয় যাতে জলীয়বাষ্পের সাহায্যে ছড়িয়ে না পড়ে ।

খালি পাত্র বর্জন : ১. খালি পাত্র ভেঙে ফেলে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে । ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে দ্বিতীয়বার ব্যবহার এড়ানোর জন্যে বাইরে ফেলে রাখবেন না । ৩. প্যাকেজগুলি অথবা অতিরিক্ত অব্যবহৃত বস্তু এবং মেশিন ধোয়া জল নিরাপদে নষ্ট করতে হবে যাতে পরিবেশ এবং জলদূষণ না হয় ।

সাবধানতা : এই লেবেল / লিফ্লেটে নির্দিষ্ট ফসল ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করা উচিৎ নয় ।

କିବାଲୋ®

ଫ୍ଲୁଓପାଇରମ୍ ୧୭.୭% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୧୭.୭% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍‌ସି

(ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଫିମ୍ପିନାଶକ)

ଫ୍ଲୁଓପାଇରମ୍ ୧୭.୭% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୧୭.୭% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍‌ସି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଫିମ୍ପିନାଶକ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଙ୍ଗୁର ଓ ଲଙ୍କାର ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ଫର୍ମୁଲେଶନରେ ୧୭୭ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫ୍ଲୁଓପାଇରମ୍ ୧୭୭ ଗ୍ରାମ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଶିଥାଏ ଯାହା ପ୍ରତି ଲିଟର ଫର୍ମୁଲେଶନରେ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୁଓପାଇରମ୍ ଏବଂ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା :

ଉପାଦାନ	ମାତ୍ରା(ଓଜନ/ଓଜନ)
ଫ୍ଲୁଓପାଇରମ୍ (ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ)	୧୭.୭୦%
ଟେବୁକୋନାଜୋଲ(ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ)	୧୭.୭୦%
ଜାନଥମ୍ ଗମ୍ (ଥିକ୍‌ନର)	୦.୧୨%
ଅକ୍ସିରେନ୍, ୨ –ମିଥାଇଲ୍–, ପଲିମର ଅକ୍ସିରେନ୍ (ଡିସ୍‌ପର୍ସେଣ୍ଟ)	୨.୨୧%
ଫାର୍ମଲଡିହାଇଡ୍ ସହିତ ସଂଘଠିତ ନେପଥାଲିନ୍ ସଲ୍‌ଫୋନେଟ୍‌ସ (ଡିସ୍‌ପରସେଣ୍ଟ)	୦.୭୧%
ପ୍ରୋପିଲିନ ଗ୍ଲାଇକୋଲ୍ ଏବଂ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣରେ ଇଥକ୍ସିଲେଟେଡ ପୋଲାମିଥାକ୍ରାଇଲେଟ୍ (ଡିସ୍‌ପରସେଣ୍ଟ)	୩.୫୪%
ପୋଲିସିଲୋକ୍ସେନ୍‌ସ, ଡାଇ-ମି (ଏଣ୍ଟିଫୋମ)	୦.୩୫%
୧,୨ –ବେନ୍‌ଜିସୋଥିଜୋଲ୍–୩ (୨ ଏଚ୍)–ୱାନ୍ (ପ୍ରିଜରଭେଟିଭ୍)	୦.୦୯%
୧,୨ –ପ୍ରୋପାନେଡିଅଲ(ଏଣ୍ଟିଫ୍ରିଜ୍)	୨.୨୧%
ଡି–ଗ୍ଲୁକୋପାଇରେନୋଜ, ଓଲିଗୋମେରିକ, ଡେକାଇଲ ଅକ୍ଟାଇଲ୍ ଗ୍ଲାଇକୋସାଇଡ୍‌ସ (ଡିସ୍‌ପର୍ସଣ୍ଡ)	୫.୭୩%
ପୋଲି (ଅକ୍ସି–୧, ୨ –ଇଥେନଡାଇଲ), ଅଲ୍‌ଫା–ଆୟସୋଟ୍ରାଇଡେକାଇଲ୍–ଓମେଗା–ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି (ଡିସ୍‌ପର୍ସଣ୍ଡ)	୨.୨୧%
ପାଣି, ଡିମିନରଲାଇଜ୍‌ଡ (ଦ୍ରାବକ)	ସତାଂଶର ବାକି ମାତ୍ରା
ମୋଟ	୧୦୦.୦୦%

ଘନତା ୨୦° ସେ: ୧.୧୩୦ ଗ୍ରା./ମି.ଲି.

ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁପାରିଶ୍ :

ଫସଲ	ରୋଗର ଜଣାଶୁଣା ନାମ	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା			ଅନ୍ତିମ ସିଞ୍ଚନ ପରଠୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନରେ)
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରାମ)	ଫର୍ମୁଲେଶନ (ମି.ଲି.)	ମିଶାଇବା ପାଣି (ଲି.)	
ଅଙ୍ଗୁର	ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ରୋଗ	ଫ୍ଲୁଓପାଇରମ୍ ୧୧୨.୫ + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧୨.୫	୫୬୨.୫	୭୫୦– ୧୦୦୦	୧୦
ଲଙ୍କା	ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ରୋଗ	ଫ୍ଲୁଓପାଇରମ୍ ୧୦୦ + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୧୦୦	୫୦୦	୫୦୦	୫

ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗର ସମୟ : ଫିମ୍ପିନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନାପ୍‌ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବା ମାତ୍ରେ ୧ମ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଗର ଗମ୍ଭୀରତା ଅନୁସାରେ ୧୦–୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଚେତାବନୀ: ଯେଉଁ ଜମିରେ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ/ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନର ଗତିବିଧି ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ମାଛ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତକର ଅଟେ ।

ସାବଧାନତା : ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ପାନୀୟ ପଦାର୍ଥ, ପଶୁ ଆହାର ତଥା ପିଲାଙ୍କ ପହଞ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ତ୍ୱଚା, ଆଖି ଏବଂ ପୋଷାକର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଏଡାନ୍ତୁ । କାମ ପୂରା ହେବା ପରେ ଏବଂ ପାନ ବା ତମାଖୁ ସେବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲଭାବେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ । ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ । ଅପରିଷ୍କାର ତଥା ବ୍ୟବହୃତ କପଡା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ : ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଅରୁଚି, ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଦୁର୍ବଳତା, ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ପ୍ରକମ୍ପନ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର : ଦୂଷିତ ପୋଷାକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ । **ଶ୍ୱାସ :** ଯଦି ଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥାଏ ତେବେ ରୋଗୀକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଗୀକୁ ଆରାମ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ । **ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶ:** ଯଦି ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ ତେବେ ପୋଷାକ ବାହର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତ୍ୱଚାକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ । **ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶ:** ଯଦି ଆଖିକୁ ଯାଇଥାଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଝାପଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । **ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ:** ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୁହଁକୁ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ । ଅଳ୍ପ ପାଣି ପିଆନ୍ତୁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର : କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଉପଚାର ନାହିଁ । ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ।

ସଂରକ୍ଷଣ: ୧. ଫିମ୍ପିନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଖାସ୍‌କରି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ/କୋଠରୀରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଏହାର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ଖାଲି ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ । ୨. ମହଜୁଦ କରାଯିବା ସ୍ଥାନ/କୋଠରୀ ମଜବୁତ, ଆଲୋକିତ ଓ ବାୟବୀୟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ । ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଶୁଖିଲା ଓ ଶୀତଳ ହେବା ଉଚିତ ଯଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବାଷ୍ପ ଏଡାଇପାରିବା ।

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରର ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ : ୧. ଖାଲିପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଭୁଙ୍ଗି ଜନବସତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତିଦେବା ଉଚିତ । ୨. ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରଖିବା ଅନୁଚିତ । ୩. ପ୍ୟାକେଜ୍ ବା ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପାତ୍ର ଆଦିର ଧୁଆଧୁଇ ପାଣିକୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର, ଯେପରି ପାଣି କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ ।

ସାବଧାନତା: ଏହି ଲେବଲ/ଲିଫ୍‌ଲେଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

കിവാലൊ®

ഫ്ലൂവോപിറാം 17.7%ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു+ ടെബുകൊനാസോൾ 17.7 %ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു എസ്‌സി

(അന്തർവ്യാപന കുമിൾ നാശിനി)

ഫ്ലൂവോപിറാം 17.7%ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു+ ടെബുകൊനാസോൾ 17.7 %ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു എസ്‌സി മുന്തിരിയും മുളകും പൂപ്പലും അന്ത്രാക്നോസ് രോഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഫോളിയാർ സ്പ്രേ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കുമിൾ നാശിനിയാണ്. ഇതിൽ ഒരു കിലോ ഗ്രാം ഫോർമുലേഷനിൽ 177 ഗ്രാം ഫ്ലൂവോപിറാം, 177 ഗ്രാം ടെബുകൊനാസോൾ സജീവ ചേരുവയായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ലിറ്റർ ഫോർമുലേഷനിൽ 200 ഗ്രാം ഫ്ലൂവോപിറാം, 200 ഗ്രാം ടെബുകൊനാസോൾ എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമാണ്.

രാസഘടന :

ഘടകങ്ങൾ	ഉള്ളടക്കം (ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു)
ഫ്ലൂവോപിറാം (സജീവ ചേരുവ)	17.70%
ടെബുകൊനാസോൾ (സജീവ ചേരുവ)	17.70%
സാന്തം ഗം (തിക്കനർ)	0.12%
ഓക്സിറേൻ, 2- മീഥൈൽ- പോളിമർ ഓക്സിറേൻ (ഡിസ്പേഴ്സന്റ്)	2.21%
നാഫ്തലീൻ സൾഫണേറ്റ് ഫോർമൽ ഡീഹൈഡുമായി സാന്ദ്രീകരിച്ചത് (ഡിസ്പേഴ്സന്റ്)	0.71%
എതോക്സിലേറ്റഡ് പോളിമെതാക്രിലേറ്റ് പ്രോപിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിലും വെള്ളത്തിലും (ഡിസ്പേഴ്സന്റ്)	3.54
പോളിസിലോക്സേൻസ്, ഡി-മി (ആന്റി ഫോം)	0.35%
1,2 ബെൻസിസോതിയാസോൾ-3 (2 എച്ച്)- വൺ (പ്രിസർവേറ്റീവ്)	0.09%
1,2 പ്രോപനേഡിയോൾ (ആന്റി ഫ്രീസ്)	2.21%
ഡി-ഗ്ലൂകോപൈറാനോസ്, ഒലിഗോമെറിക്, ഡെസിൽ ഓക്ടിൽ ഗ്ലൂകോസൈഡ്സ് (ഡിസ്പേഴ്സന്റ്)	5.73%
പോളി (ഓക്സി-1,2 -എത്തനേഡിൽ)	
α ഐസോട്രൈഡേസിൽ-ω-ഹൈഡ്രോക്സി- (ഡിസ്പേഴ്സന്റ്)	2.21%
വെള്ളം, ഡിമിനറലൈസ് ചെയ്തത് (സോൾവന്റ്)	ക്യൂ.എസ്
മൊത്തം	100.00%

ഡെൻസിറ്റി 20° സി: 1.130 ജി/ എം എൽ

ഉപയോഗത്തിനുള്ള ശുപാർശകൾ :

വിള	രോഗത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ് പ്രതി ഹെക്ടർ			അവസാന തളിക്കും വിളവെടുപ്പിനും ഇടയിലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസം)
		എ.ഐ (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലി)	
മുന്തിരി	പൂപ്പൽ ആന്ത്രാക്നോസ്	ഫ്ലൂവോപിറാം 112.5+ ടെബുകൊനാസോൾ 112.5	562.5	750- 1000	10
മുളകും	പൂപ്പൽ ആന്ത്രാക്നോസ്	ഫ്ലൂവോപിറാം 100+ ടെബുകൊനാസോൾ 100	500	500	5

സസ്യ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയവും: ഹൈ വോള്യം നാപ്സാക്ക് സ്പ്രെയർ ഉപയോഗിച്ച് തളിക്കുക. രോഗ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ ഉടൻതന്നെ ആദ്യ സ്പ്രേ തളിക്കുക. രോഗം ശ്രദ്ധയിൽ പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ മരുന്നു തളി നടത്തുക. രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 10-15 ദിവസ ഇടവേളകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കൂടി സ്പ്രേ ചെയ്യുക

മുന്നറിയിപ്പ്: ജല സ്രോതസ്സുകൾ/ മത്സ്യ കൃഷി/ മറ്റു വിളകളുമായി ചേർത്ത് മത്സ്യ കൃഷി നടത്തുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കരുത്. ഈ ഉൽപന്നം മത്സ്യത്തിന് വിഷമാണ്.

മുൻകരുതൽ: ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, പാനീയങ്ങൾ, കാലി തീറ്റകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും അകറ്റി വയ്ക്കുക. കണ്ണ്, ചർമ്മം, വസ്ത്രം എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷവും പുകവലിക്കുകയോ, കുടിക്കുകയോ തിന്നുകയോ എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പും കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. ഉൽപന്നം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ധരിക്കുക. മലിനമാക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രം ഉടൻ നീക്കുകയും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നന്നായി കഴുകുകയും ചെയ്യുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: തലവേദന, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, തലചുറ്റൽ, തളർച്ച, ക്ഷീണം, ഡിസ്പോനിയ, കോച്ചി പിടിത്തം എന്നിവ സംഭവിക്കാം.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ നടപടികൾ: മലിനമാക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രം ഉടൻ നീക്കുക. **ശ്വസിച്ചാൽ:** ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് മാറ്റുകയും രോഗിക്ക് ഊഷ്മളതയും വിശ്രമവും നൽകുക. ഉടനെ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. **ചർമ്മത്തിൽ ആയാൽ:** ചർമ്മത്തിൽ ആയാൽ വസ്ത്രം മാറ്റുകയും മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഭാഗം സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുകയും ചെയ്യുക. ഉടനെ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. **കണ്ണിൽ ആയാൽ :** കണ്ണിൽ ആയൽ, ഉടൻ ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുകയും ഉടനെ വൈദ്യോപദേശം തേടുകയും ചെയ്യുക. **ഉള്ളിൽ പോയാൽ:** അബദ്ധവശാൽ ഉള്ളിൽ പോയാൽ, ഛർദ്ദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. കുറേശ്ശെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നൽകുക. ഉടൻ വൈദ്യ സഹായം ലഭ്യമാക്കുക.

മറുമരുന്ന്: പ്രത്യേക മറുമരുന്ന് അറിവില്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

സംഭരണം: 1. കമമിൽ നാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ പ്രത്യേകം മുറികളിലോ സ്ഥലത്തോ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ, മറ്റു സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തു നിന്നും അകലെ കുമിൾ നാശിനിയുടെ സ്വരൂപവും അളവും അനുസരിച്ച പ്രത്യേകം മുറിയിൽ/അലമാരയിൽ താഴും താക്കോലും ഉപയോഗിച്ച് പൂട്ടി വയ്ക്കണം. 2. കുമിൾ നാശിനി സൂക്ഷിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മുറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം, കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കുന്നതും നനവില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. വായു/ നീരാവിയുമായി കലരാതിരിക്കാൻ മുറി ആവശ്യത്തിനു വലിപ്പമുള്ളതുമായിരിക്കണം.

ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്: 1. ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ പൊട്ടിക്കുകയും ജനവാസമില്ലാത്തിടത്ത് കുഴിച്ചു മൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാമ്പലാക്കി കളയുകയോ ചെയ്യണം. 2. പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന് , ഉപയോഗിച്ച പായ്ക്കറ്റുകൾ പുറത്തുകളയരുത് 3. പരിസരം, ജല മലിനീകരണം എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ പാക്കേജുകൾ, ബാക്കി വരുന്ന കുമിൾ നാശിനി, കഴുകി വരുന്ന വെള്ളം എന്നിവ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കണം.

സൂചന: ഈ ലേബലിൽ/ ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റു വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

கிவாலொ®

ஃப்ளூபைரம் 17.7% W/W + டெபுகோனஸோல் 17.7% W/W எஸ்சி

(ஊடுறுவிப்பாயும் பூஞ்சாணங்கொல்லி)

ஃப்ளூபைரம் 17.7% w/w + டெபுகோனஸோல் 17.7% w/w எஸ்சி ஊடுறுவிப்பாயும் ஒரு பூஞ்சாணங்கொல்லியாகும். இது திராட்சை மற்றும் மிளகாய்யில் ஏற்படும் சாம்பல் நோய் மற்றும் ஆந்த்ராக்நோஸ் நோய்களை கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இதில் ஒவ்வொரு கிலோ மருந்திலும் 177கி ஃப்ளூபைரம் மற்றும் 177 கி டெபுகானஸோல் செயல்புரியும் உட்பொருள் உள்ளது. இது ஒரு லிட்டர் மருந்தில் 200 கி ஃப்ளூபைரம் மற்றும் 200 கி டெபுகானஸோல் செயல்புரியும் உட்பொருள் இருப்பதற்கு சமம் ஆகும்.

இரசாயனக் கலவை:

கூட்டுப்பொருள்	அடக்கம் (w/w)
ஃப்ளூபைரம் (செயல்புரியும் உட்பொருள்)	17.70%
டெபுகோனஸோல் (செயல்புரியும் உட்பொருள்)	17.70%
ஜான்தன் கம் (அடர்த்தியாக்குவது)	0.12%
ஆக்ஸிரேன், 2 -மெத்தில், பாலி ஆக்ஸிரேன் (டிஸ்பெர்சண்ட்)	2.21%
ஃபார்மல்டேஹைட் (டிஸ்பெர்சண்ட்) உடன் சுருக்கப்பட்ட நாப்தலின் சல்ஃபோனேட்	0.71%
ப்ராப்லின் க்ளைகோல் மற்றும் தண்ணீரில் (டிஸ்பெர்ஸன்ட்) எதாக்ஸிலேடட் பாலிமெதாக்ரைலேட்	3.54%
பாலிசிலோக்ஸேன்ஸ், டி-மி (ஆன்ட்டிஃபோம்)	0.35%
1,2-பென்ஸிசோதியாஸோல்-3 (2எச்) - ஒன் (பெர்சர்வேடிவ்)	0.09%
1,2-ப்ராபேனிடியோல் (ஆன்ட்டிஃப்ரீஸ்)	2.21%
டி-க்ளூகோபைரானோஸ், ஆலிகோமெரிக், டிகைல் ஆக்டைல் க்ளைகோசைட்கள் (டிஸ்பெர்சண்ட்)	5.37%
பாலி (ஆக்ஸி-1,2-எத்தனிடில்),	
α-ஐசோட்ரிடெகைல்-ω-ஹைராக்ஸி-(டிஸ்பெர்சண்ட்)	2.21%
தண்ணீர், டிமினரலைஸ்ட் (சால்வென்ட்)	Q.S.
மொத்தம்	100.00%

அடர்த்தி 20° சி: 1.130 கி/மிலி

உபயோகிப்பதற்கான பரிந்துரைகள்:

பயிர்	நோயின் பொதுப்பெயர்	ஒரு ஹெக்டேருக்கான மருந்தளவு			கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
		தீ.மூ. (கிராம்)	சேர்க்கை (மிலி)	தண்ணீரில் கரைத்தல் (லிட்டர்)	
திராட்சை	சாம்பல் நோய் மற்றும் ஆந்த்ராக்நோஸ்	ஃப்ளூபைரம் 112.5+ டெபுகோனஸோல் 112.5	562.5	750- 1000	10
மிளகாய்	சாம்பல் நோய் மற்றும் ஆந்த்ராக்நோஸ்	ஃப்ளூபைரம் 100+ டெபுகோனஸோல் 100	500	500	5

பயிர் பாதுகாப்பு உபகரணம் மற்றும் பயன்படுத்தும் நேரம்: உயர் அளவு கொண்ட நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் கொண்டு பூஞ்சாணங்கொல்லியை தெளிக்கவும். நோயின் அறிகுறிகளை கவனித்ததும் முதல் தெளிப்பை தெளிக்கவும். நோயின் கடுமைத் தன்மையை பொறுத்து 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு தெளிப்புகளை தெளிக்கவும்.

எச்சரிக்கை: நீர் நிலைகள்/மீன் பண்ணைகள்/பயிர்களுக்குள் மீன் வளர்க்கும் இடங்களில் தெளிக்கக் கூடாது. இந்த தயாரிப்பு மீன்களுக்கு விஷமானது.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: உணவு, பானங்கள் மற்றும் விலங்கு தீவனங்களிலிருந்து தொலைவில் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எட்டாத இடத்தில் வைக்கவும். தோல், கண்கள் மற்றும் ஆடைகளில் படுவதை தவிர்க்கவும். மருந்தை கையாண்ட பின்னர் மற்றும் சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக, சூயிங் கம் அல்லது புகையிலை மெல்லுவதற்கு முன்பாக கைகளை சோப்பு தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். மருந்தை பயன்படுத்தும்போது பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணிந்துகொள்ளவும். மருந்து பட்ட ஆடையை உடனே களைந்து மறுபடியும் பயன்படுத்தும் முன்பாக துவைக்கவும்.

விஷமேறிய அறிகுறிகள்: தலைவலி, குமட்டல், வாந்தி, தலைச்சுற்றல், பலவீனம், களைப்பு, டிஸ்போனீயா, வலிப்பு.

முதலுதவி நடவடிக்கை: மருந்து பட்ட ஆடைகளை உடனே களைந்து பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தவும். உட்சுவாசித்தல்: உட்சுவாசித்து விட்டால் காற்றோட்டம் உள்ள இடத்திற்கு கொண்டு செல்லவும். நோயாளியை இளஞ்சூட்டில் மற்றும் ஓய்வாக வைத்திருக்கவும். உடனே ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். மருந்து தோலில் படுதல்: மருந்து சருமத்தில் பட்டுவிட்டால், ஆடைகளை களைந்து உடலை சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். ஒரு மருத்துவரை அழைக்கவும். கண்ணில் படுதல்: கண்ணில் பட்டுவிட்டால், உடனே ஏராளமான தண்ணீர் விட்டு கழுவவும் மற்றும் மருத்துவ அறிவுரை பெறவும். உட்கொள்ளுதல்: தற்செயலாக விழுங்கிவிட்டால், வாந்தி எடுக்கச் செய்யக் கூடாது. வாயை கழுவிவிட்டு தண்ணீரை சிறிது சிறிதாக உறிஞ்சிக் குடிக்கச் சொல்லவும். மருத்துவ உதவி பெறவும்.

எதிர்மருந்து: குறிப்பிட்ட எதிர்மருந்து இல்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப மற்றும் ஆதரவாக சிகிச்சை அளிக்கவும்.

சேமிப்பு: 1. பூஞ்சாணங்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து அதனை மற்றபொருட்களை வைக்கும் அறைகளிலிருந்து தொலைவில் அல்லது தனியான அறைகள் / அலமாரியில் பூட்டி வைக்க வேண்டும். 2. பூஞ்சாணங்கொல்லியை சேமித்து வைக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள், மருந்தின் ஆவியால்/காற்றால் மாசுபடுவதை தவிர்க்க நன்கு கட்டப்பட்டதாக, வெளிச்சம் உள்ளதாக, ஈரமில்லாத, நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள மற்றும் போதுமான அளவுகளில் இருக்க வேண்டும்.

வெற்று கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்: 1. வெற்று கொள்கலன்கள் உடைக்கப்பட்டு குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து தொலைவில் புதைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது எரிக்கப்பட வேண்டும். 2. கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தண்ணீர் மாசுபடுவதை தடுக்கும் வகையில் கொள்கலன் அல்லது கூடுதல் மருந்து மற்றும் மெஷினை கழுவிய தண்ணீர் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிலில் / கையேட்டில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

ಕಿವಾಲೊ®

ಫ್ಲುವೊಪೈರಮ್ 17.7% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು + ಟೆಬುಕೊನಝೋಲ್ 17.7% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ

(ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಫ್ಲುವೊಪೈರಮ್ 17.7% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು + ಟೆಬುಕೊನಝೋಲ್ 17.7% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬೂದಿರೋಗ ಮತ್ತು ಚಿಬ್ಬುರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸಿಸಲಾದ ಒಂದು ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲುವೊಪೈರಮ್‌ನ 177 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಟೆಬುಕೊನಝೋಲ್‌ನ 177 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲುವೊಪೈರಮ್ ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ ಟೆಬುಕೊನಝೋಲ್‌ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಘಟಕ	ಪ್ರಮಾಣ (ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು)
ಫ್ಲುವೊಪೈರಮ್ (ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ)	17.70%
ಟೆಬುಕೊನಝೋಲ್ (ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ)	17.70%
ಕ್ಸಂಥೆನ್ ಗಮ್ (ಥಿಕನರ್)	0.12%
ಒಕ್ಸಿರೇನ್ 2–ಮಿಥ್ಯಾಲ್ –ಪಾಲಿಮರ್ ಒಕ್ಸಿರೇನ್ (ಡಿಸ್ಪರ್‌ಸಂಟ್)	2.21%
ನಫ್ತಾಲಿನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿದ್ ಫಾರ್ಮಲ್‌ಡಿಹೈಡೆ (ಡಿಸ್ಪರ್‌ಸಂಟ್)	0.71%
ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮೆಥಕ್ರೈಲೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಪಾಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಮತ್ತು ನೀರು (ಡಿಸ್ಪರ್‌ಸಂಟ್)	3.54%
ಪಾಲಿಸಿಲೋಕ್ಸೆನ್ಸ್ ಡೈ–ಮಿ (ಆ್ಯಂಟಿಫೋಮ್)	0.35%
1,2 –ಬೆನ್‌ಝಿಸೊಥಿಯಝೋಲ್–3(2 ಎಚ್)–ವನ್ (ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್)	0.09%
1,2 ಪ್ರೊಪನೆಡೋಲ್ (ಆ್ಯಟಿಫ್ರೀಝ್)	2.21%
ಡಿ–ಗ್ಲೂಕೊಪೈರನೋಸ್, ಒಲಿಗೊಮೆರಿಕ್, ಡಿಸೈಲ್ ಒಕ್ಟಿಲ್ ಗ್ಲೈಕೊಸೈಡ್ಸ್ (ಡಿಸ್ಪರ್‌ಸಂಟ್)	5.37%
ಪಾಲಿ (ಆಕ್ಸಿ–1,2 ಇಥಾನೆಡೈಲ್)	
ಬ–ಇಸೊಟ್ರಿಡೈಸಿಲ್ –ಡಿ– ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ (ಡಿಸ್ಪರ್‌ಸಂಟ್)	2.21%
ನೀರು –ಡಿಮಿನರಲೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್	ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು
ಒಟ್ಟು	100.00%

20° ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ: 1.130 ಗ್ರಾಂ/ಮಿ.ಲೀ.

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ತನಕ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ)	
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಚಿಬ್ಬುರೋಗ	ಫ್ಲುವೊಪೈರಮ್ 112.5 + ಟೆಬುಕೊನಝೋಲ್ 112.5	562.5	750– 1000	10
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಚಿಬ್ಬುರೋಗ	ಫ್ಲುವೊಪೈರಮ್ 100 + ಟೆಬುಕೊನಝೋಲ್ 100	500	500	5

ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಸಮಯ : ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಉಚ್ಚ ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ನ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ. ರೋಗದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 1 ನೇ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಬಳಿಕ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 10 –15 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ನೀರಾಶ್ರಯಗಳು/ಮೀನು ಸಾಕಣೆ/ಅಂತರ–ಬೆಳೆ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮೀನಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಗಳು: ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಪೇಯ ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಮೇವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಎಟಕದಂತೆಯೂ ಇರಿಸಿರಿ. ತ್ವಚೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ, ಗಮ್ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕನ್ನು ಜಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಿ. ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ಪುನ: ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆಸುತ್ತು, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ, ದಣಿವು, ಡೈಸ್‌ಪೊನಿಯಾ, ಸೆಳೆತ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು: ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿರಿ. **ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ :** ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಸಿರಿ. **ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ :** ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿರಿ, ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಧಾರಾಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಸಿರಿ. **ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ:** ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿದ್ದರೆ ಧಾರಾಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ :** ಆಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ನುಂಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಕುಡಿಸಿರಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ.

ಶೇಖರಣೆ : 1 ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳು/ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಬೆ/ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮಲಿನವಾಗದಂತಿರಲು ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1. ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು/ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.