

FOR USE & MEDICAL TREATMENT
: Read the Attached leaflet

SMALL LABEL

TRIACONTANOL 0.1% EW

| Composition | Contents w/w |
|---------------------|---------------|
| Triacontanol (a.l.) | 0.1 w/w (min) |
| Emulsifiers | 0.5 w/w (min) |
| Preservative | 0.1 w/w (min) |
| Demineralsised Aqua | Q.S. (100%) |

TOTAL 100.0% W/W

0.1 % ई.डब्ल्यू.

मात्रा व./व.

0.1 % व./व. (न्युनतम)

0.4 % व./व. (न्युनतम)

0.1 % व./व. (न्युनतम)

आवश्यकता अनुसार

Regt. No.:

MFG. LIC. NO.:

Batch No.:

Mfg. No.:

Exp. Date:

Net Content:

M.R.P.

(Inclusive of all taxes)

Manufactured by: Marketed by:

CHEMINOVA INDIA LTD.

KECHAVA, 7TH FLOOR,

BANDRA KURLA COMPLEX,

BANDRA (E), MUMBAI-400 051.

CHEMINOVA

BANDRA (E), MUMBAI-400 051.

USES : See leaflet

Drug Therapy / Antidote : Antidote not known

Treat symptomatically



AUTHENTICATED APPROVED


उपयोग व विषयवस्तु
संलग्न पर्ची पाठ्ये.

उपयोग के लिए संलग्न लिफलेट पढ़िये
इसका उपयोग / प्रति विषयवस्तु : कोई विशेष
प्रति विषयवस्तु नहीं. लक्षण के अनुसार
उपचार करें.

रजि. नं.:
निर्मा. ला. नं.:
बैच नं.:
उत्पादन तिथि:
समापन तिथि:
कुल मात्रा:
अधि. फुट. मुल्य:
(सभी करों सहित)

100.00 % व./व.

Keep out of Reach of Children



बच्चों
की पहुँच
से दूर रखें

निर्माता : विक्री व्यवस्था :

केमिनोवा इंडिया लिमिटेड

केमिनोवा इंडिया लिमिटेड
बैंक रोड, कुरुवा
बैंक रोड, कुरुवा
बैंक रोड, कुरुवा

ANNEXURE IX (II)

PLANT GROWTH STIMULANT AQUEOUS EMULSION
TRIACONTANOL 0.1% EW

87


PLANT GROWTH PROMOTER

Bioefficacy and Directions for use:

Recommended for use on ^{rice} ~~cereals~~, ^{tomato, chillies} cotton, vegetable and groundnut.

| Crop | Dosage per Hectare | | Dilution in water ltrs. |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | AI (g) | Formulation (Ltrs.) | |
| Cotton | 0.25 | 0.25 | 400-500 |
| Cereals Rice | 0.25 | 0.25 | 400-500 |
| Vegetables (Tomato, Chillies) | 0.25 | 0.25 | 400-500 |
| Groundnut | 0.25 | 0.25 | 400-500 |

Chillies



Time of Application:

| | 1st Spray | 2nd Spray | 3rd Spray |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cotton | 40-45 days after planting | 65-70 days after planting | 85-90 days after planting |
| Vegetables & Tomato, Chillies | 25 days after planting | 45 days after planting | 65 days after planting |
| Rice | 25 days after transplanting of (DAP) | 45 days after planting | 65 days after planting |
| Groundnut | 25 days after planting | 45 days after planting | 65 days after planting |


**AUTHENTICATED
APPROVED**

Application equipment:

- 1) High volume knap-sack sprayer.
- 2) Low volume motorised knap-sack sprayer.

Storage: The package containing formulated grade insecticide shall be stored in original containers in a separate room or almirah under lock and key, away from reach of children, food stuffs, animal feeds and other edible articles in a cool and dry place. The premises for storage should be well built, sufficient in dimension and well ventilated.

Disposal of empty containers and procedure: Empty containers should never be reused and destroy the empty containers by burying them underground or burying in fire. Dispose off packages or surplus material and wastages in safe manner so as to prevent environment pollution.



Use stick or rod for stirring diluted solution. Do not eat, drink, chew tobacco, drink or smoke while spraying for making solutions.

~~Symptoms of Poisoning : Eye and skin irritation or headache may occur.~~

~~Antidote: Treat symptomatically. In case of spillage on body, wash with plenty of water.~~

Manufactured by

CHEMINOVA INDIA LTD.
 KESHAVA, 7TH FLOOR
 BANDRA KURLA COMPLEX,
 BANDRA (E), MUMBAI - 400 051.

Marketed by

CHEMINOVA INDIA LTD.
 KESHAVA,
 BANDRA KURLA COMPLEX,
 BANDRA (E), MUMBAI - 400 051.

Handwritten signature/initials

PRECAUTIONS BY USERS : Avoid contact with skin, eyes and mouth. Wash the affected areas thoroughly before eating, drinking or smoking. Avoid contamination of environment and water.

FIRST AID : In case of accidental ingestion, give one or two glass of water. Do not induce vomiting. Contact doctor.

AUTHENTICATED APPROVED

Skin: In case of skin contact/ toxicity, wash skin thoroughly with soap and water. Remove contaminated clothing and shoes. In case of splashes in eyes, hold open eyes and flush immediately with clean running water for at least 15 minutes. See a doctor if irritation persist.

SYMPTOMS OF POISONING : Eye and skin irritation, nausea, headache may occur.

Annexure IX (II)

वातावरणिक उपज वृद्धि नियंत्रक ट्रायाकोमेटेगॉल युक्त जलीय मिश्रण
0.1 % ई. डब्ल्यू. च./व., न्युनतम

उपयोगिता एवम् उपयोग विधी :-

कपास, धान, सब्जियाँ, टमाटर, मिर्च व मूंगफली पर उपयोग हेतु ।

| फसल | मात्रा प्रति हेक्टर | | मिश्रण केलिए पानी की मात्रा (लि) |
|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| | स. तत्व (ग्रॉम) | तैयार मात्रा (ली.) | |
| कपास | 0.540 | 0.540 | 200-400.00 |
| धान | 0.540 | 0.540 | 200-400.00 |
| सब्जियाँ टमाटर, मिर्च | 0.540 | 0.540 | 200-400.00 |
| मूंगफली | 0.540 | 0.540 | 200-400 |

उपयोग का समय :-

| फसल | पहला छिड़काव | दूसरा छिड़काव | तिसरा छिड़काव |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| कपास | बुवाई के 20-25 दिन बाद | बुवाई के 40-60 दिन बाद | बुवाई के 65-80 दिन बाद |
| धान | बुवाई के 25 दिन बाद | बुवाई के 45 दिन बाद | बुवाई के 65 दिन बाद |
| सब्जियाँ टमाटर, मिर्च | बुवाई के 25 दिन बाद | बुवाई के 45 दिन बाद | बुवाई के 65 दिन बाद |
| मूंगफली | बुवाई के 25 दिन बाद | बुवाई के 45 दिन बाद | बुवाई के 65 दिन बाद |

प्रयोग में आने वाले उपकरण :-

- अधिक मात्रा वाले नैप सैक स्प्रेयर
- कम मात्रा वाला मोटर चलित स्प्रेयर-पलैट गैल नोजिल के साथ

AUTHENTICATED
APPROVED

सावधानियाँ :-

त्वचा और आँखों को बचाये। इस्तेमाल के समय चश्मा, दस्ताने व अन्य सुरक्षा कवच पहने। दूषित त्वचा को खूब पानी से धो डालें। भोजन-जलस्वास्, धूम्रपान आदि के पूर्व हाथ अच्छी तरह धो लें। पर्यावरण व जल स्रोतों को दूषित होने से बचायें।

भंडारण :-

उत्पादित दवाओं को मूल शीशी में ही रखकर एक अलग कमरे में या ताले चाबी वाली अलमारी में बंद रखें। खाने की वस्तुओं से, बर्षों की पहुँच से, पशु-खाद्यों से दूर बंड़ी व सुखी जगह पर भंडारण करें। भंडारण का स्थान साफ सुथरा, प्रयाप्त रोशनी पूर्ण व हवादार हों।

रिक्त शीशियों का नष्टीकरण एवम् सावधानियाँ

खाली बोतलों, शीशीओंका दुबारा उपयोग न करें। नष्ट करके जमीन में गाड़ दें। बची हुई दवा व शीशी को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दें, ताकि जल स्रोत व पर्यावरण दूषित न हों।

घोल का मिश्रण बनाने के लिए लोहे या जस्ता की छड़ का इस्तेमाल हिलाने के लिए करे व उपयोग करते समय धूम्रपान, धूम्रपान न करें।

**विषाक्तता के लक्षण :-**

आँखों एवम् त्वचा में जलन महसूस हो सकती है, या सरदर्द हो सकता है।

उपचार :-

लक्षणानुसार/ सरीर पर गिरने की अवस्था में खूब पानी से धो लें।

निर्माता :-**विपणन कर्ता :-**

उपयोगकर्ता द्वारा सावधानियाँ :- मुँह में जाने, त्वचा व आँखों के संपर्क में आने से बचायें। खाने-पीने या धूम्रपान करने से पहले प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें। पर्यावरण को दूषित करने से बचायें। पीने का पानी संदूषित होने से बचायें।

प्राथमिक चिकित्सा :- संयोग से त्वचा पर एक या दो गिलास पानी पिलायें। उल्टी न करायें। डॉक्टर से सलाह लें।

त्वचा- त्वचा से संपर्क/विषाक्तता होने पर, प्रभावित त्वचा को धीरे-धीरे साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। संदूषित कपड़े व जूते निकाल दें। आँखों में पड़ जाने पर, आँखों को खोलकर बखूब पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं। फिर भी जलन कम न हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

जहर के लक्षण :- आँख और त्वचा पर जलन, गिराली, तथा सिरदर्द हो सकता है।