88mm | 88mm | 88mm | 88mm | 88mm

Corprima™

CHLORANTRANILIPROLE 35% w/w WG
(Broad Spectrum Insecticide)

Purpose: For Agricultural Use

Crop and pest group : Chlorantraniliprole 35% w/w WG is an anthranilic diamide insecticide, recommended for managing lepidopteran pests of Okra and Tomato.

Dosage:

Crop	Common name of Pests	Dosage/Hectare			Pre-harvest interval (Days)
		A.I (g)	Formulations (g)	Dilution in (ltr)	
Okra	Fruit borers (Helicoverpa armigera & Earias vittella)	25	71	500	5
Tomato	Fruit borer (Helicoverpa armigera)	30	86	500	3

DIRECTIONS FOR USE/APPLICATION TECHNIQUE:

Weather condition in general: Avoid application during adverse weather conditions.

Time & Number of application, frequency including maximum no. of application and crop stage for application : The product is to be foliar applied. First application should be initiated at the onset of flowering when pest populations reaches ETL (Economic Threshold Level) followed by second application at 12-14 days interval and make no more than two applications per crop season.

Spray equipment and nozzle type: Use high volume spraying equipment, such as knapsack sprayer, foot sprayer fitted with hollow cone nozzle to ensure thorough and uniform coverage.

Instructions for mixing: Fill spray tank ¼ to ½ full of water. Add insecticide directly to the spray tank as per label rates and mix thoroughly, to fully disperse the insecticide. Do not store spray solution overnight in spray tank.

Soil and water: No specific soil and water management is required.

Re-entry period: Do not enter treated areas for 24 hours until sprays have dried.

SAFETY PRECAUTIONS: 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while applying the product. 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, mask, and covered shoes while handling the product. 3. Avoid spray drift onto your person by spraying with the direction of the wind. 4. Do not blow the spray nozzle with mouth, clean the blocked nozzle with thin stem or brush. 5. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water. 6. Wash hands and unprotected parts of the body properly after handling and before eating, drinking or smoking. Remove and wash contaminated clothing separately after use.

RESISTANCE MANAGEMENT STATEMENT:

Group 28 INSECTICIDE

Unless directed otherwise in the specific crop/insect sections of the label, the following practices are recommended to prevent or delay the development of insecticide resistance to Chlorantraniliprole and other Group 28 insecticides:

- Apply Chlorantraniliprole or other Group 28 insecticides using a 'window' approach to avoid exposure of consecutive insect generations to the same mode of action. Multiple successive applications (refer to respective labels for maximum number of applications per crop) Chlorantraniliprole or other Group 28 insecticide are acceptable if they are used to treat a single insect generation and such application are justified. Following a 'window' of Chlorantraniliprole or other Group 28 insecticide, always rotate to a 'window' of applications by effective insecticides belonging to different modes of action.
- Length of a window should be equal to length of one generation of the targeted insect. The total exposure period of all 'Group 28 active windows' applied throughout the crop cycle (from seedling to harvest) should not exceed 50% of the crop cycle.
- Incorporate Integrated Pest Management (IPM) & Insecticide Resistance Management (IRM) techniques into the overall pest management program.
- Monitor insect populations for any loss of field efficacy on regular basis.

STORAGE: 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed, or shall be kept in a separate almirah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit, ventilated and of sufficient dimensions so as to avoid contamination with vapors of insecticide.

DISPOSAL

1. Dangerous to reuse empty containers. Container should be triple rinsed with water and rinsate should be poured to the spray mix. 2. Packages shall be broken and buried away from habitation. 3. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. **4.** It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticide and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

SYMPTOMS OF POISONING: May cause discharge from eyes, mouth and/ or nose.

FIRST AID:

1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless directed by attending physician. **2. If inhaled:** Take the person to fresh air and take care of body temperature. If the person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **3. In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4. In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

ANTIDOTE: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

CAUTIONS:

1. Not to be used for any purpose other than specified on label/leaflet. **2.** This product is toxic to silkworms. Do not allow drift to nearby mulberry plantations and silk worm culture facilities. Do not rotate mulberry plantations after crops where chlorantraniliprole based formulation was commonly used in foliar or soil applications. **3.** Based on Good Agricultural Practices (GAP), Chlorantraniliprole-based formulations should not be applied when bees are actively foraging. **4.** This pesticide is toxic to aquatic invertebrates and should be avoided near aquaculture.

CHEMICAL COMPOSITION:

Component	% w/w
Chlorantraniliprole a.i.	35.0
Sodium alkyl naphthalene sulfonate	0.5
Sodium lignosulfonate	3.0
Sodium lignosulfonate, sulfomethylated	6.0
Amorphous silica	0.5
Sucrose	1.0
Clay	8.0
Lactose monohydrate	0.5
Total	**100.00**

MANUFACTURED BY: Gowan Milling LLC, 12300 E. County 8th Street, Yuma Arizona 85365, USA (designated manufacturer of FMC Corporation, 2929 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19104, USA). **IMPORTED & REPACKED BY: FMC India Private Limited, REGISTERED OFFICE:** TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Bandra Suburban, Maharashtra- 400098, India. **FACTORY ADDRESS:** 149, Kilavalam Village, Madurantakam Taluk, Kanchipuram (Dist.), Tamil Nadu.

कोरप्राईमा™

क्लोरोट्रानिलिप्रोल ३५% w/w डब्लू जी
(व्यापकस्तरची कीटकनाशक - कृषि उपयोग हेतू)

उपयोग - कृषि उपयोगासाठी

पिक आणि कीड समूह: क्लोरोट्रानिलिप्रोल ३५% w/w डब्लू जी एक रेनाक्सिलिन डायमाइड कीटकनाशक आहे, भेंडी किंवा लेडी फिंगर पिकी आणि टोमॅटो पिकावरील लेपिडोप्टेरन कीडव्यवस्थापनासाठी शिफारस केली जाते.

डोसमात्रा:

पिक	कीडीचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर डोस			फवारणी पासून कापणी पर्यंत (दिवस)
		सा.न. (ग्रा.)	फॉर्मुलेशन (ग्रा.)	पाण्याच्या फवारणीची मात्रा (लि.)	
भेंडी	फळ पोखरणारी (हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा आणि इरॅसिया विटेला)	१५	७१	५००	५
टमाटा	फळ पोखरणारी (हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा)	३०	८६	५००	३

हाताळणीच्या दिशा/अर्जाचा नीती:

वातावरणाची स्थिती: वातावरण प्रतिकूल असताना फवारणी टाळावी.

फवारणीची वेळ आणि फवारणीची संख्या, फवारणीची वारंवारता अधिकतम संख्या आणि फवारणीसाठी पीकाचा टप्पा: हा उत्पादनाची फवारणी करावी. फवारणी फवारणी पुढे रेनाक्सिया सुरुवातीस सुरू केली पाहिजे जेथे कीटकांची संख्या ईटीएल (आर्थिक नुकसानीच्या मर्यादा) पातळी पोहचले तेव्हा त्यानंतर दुसरी फवारणी १२-१४ दिवसांच्या अंतराने आणि प्रत्येक पीक हंगाम प्रमाणात दोन वेळेपेक्षा जास्त नाही याची काळजी घ्या.

फवारणी उपकरण आणि नोझल प्रकार: पूर्ण लाल ते आणि एकसमान पिकावर सुनिश्चित करने के लिए हाई वॉल्यूम पाने की उपकरण इस्तेमाल करें, जैसे नैपसैक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर आदि जिसमें होलो कोन नोजल लगा हुआ होना चाहिए।

मिश्रण के लिए निर्देश/अर्जाचा नीती: स्प्रे टैंक को १/४ से १/२ तक पानी से भरें। कीटनाशक को लेबल दरों के अनुसार सीधे स्प्रे टैंक में डालें और अच्छी तरह मिलाकर दरें; ताकि कीटनाशक को पूरी तरह से तितर-बितर टैंक में संग्रह करें।

मृदा/पानी: विशेष प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है।

मृदा संबंधी सावधानियां: १. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय कुछ खाएं, पीएँ, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। २. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरी बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, मास्क और बंद जूते पहनें। ३. छड़काव दिशा में पवन करते हुए पकड़ कर रखें की छड़ा ये मुंह पर न आए। ४. पाइप नोजल को मुंह से न फूंकें। ५. अगर किसी भी पदार्थ का छड़काव के समय शरीर पर गिरे तो साबुन और पानी से धो दें। ६. हाथ धोने से पहले और खाने, पीने, या धूम्रपान करने से पहले हाथ और त्वचा के अनावृत हिस्से को अच्छी तरह से धोएं। उपयोग के बाद दूषित कपड़ों को अलग से धोएं।

प्रतिरोधकता प्रबंधन कथन

समूह २८ कीटनाशक

लेबल के विशिष्ट फसल/कीट भागों में अन्यथा निर्देशित न किए जाने पर, क्लोरोट्रानिलिप्रोल और अन्य समूह २८ कीटनाशकों के कीटनाशक प्रतिरोध के विकास को रोकने या विलंब के लिए निम्न पद्धतियों की सिफारिश की जाती है:

- क्लोरोट्रानिलिप्रोल या अन्य समूह २८ कीटनाशकों को एक ही मोड ऑफ ऑपरेशन के संपर्क से बचने के लिए विंडो दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रयोग करें। (क्लोरोट्रानिलिप्रोल या अन्य समूह २८ कीटनाशक के लगातार एक से अधिक प्रयोग (प्रति फसल अधिकतम संख्या के लिए संबंधित लेबल देखें) स्वीकार्य हैं यदि वे एक कीट उत्पन्न का प्रबंधन करने के लिए प्रयोग किए जाते और ऐसे प्रयोग उचित हों। क्लोरोट्रानिलिप्रोल या अन्य समूह २८ कीटनाशक की विंडो के बाद, हमेशा विभिन्न प्रकार के तरीकों से संबंधित प्रभावी कीटनाशकों के प्रयोगों की विंडो अपनाएं।
- एक विंडो की लंबाई लक्षित कीट की पीढ़ी की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। पूरी फसल चक्र (बुवाई से कटाई तक) में लागू सभी समूह २८ सक्रिय विंडोज की कुल संचित अवधि फसल चक्र के ५०% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- समग्र कीट प्रबंधन कार्यक्रम में एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) और कीटनाशक प्रतिरोध प्रबंधन (आईआरएम) तकनीकों को शामिल करें।
- खेत की प्रभावशीलता में किसी नुकसान के लिए नियमित तौर पर कीटों की निगरानी करें।

भंडारण: १. कीटनाशक वाले पैकेजों को अलग कमरों या परिसर में, बच्चों व पशुओं की पहुंच से दूर, पशुओं के चारे से दूर, अलग अलमारी में ताला-चाबी लगाकर रखना चाहिए। २. कीटनाशक भंडारण का कमरा या परिसर मजबूती से बना, प्रकाश वाला, हवादार और लंबा-चौड़ा हो, ताकि इसकी वाष्प से संदूषण न फैले।

खाली डिब्बों का निपटान: १. खाली डिब्बों का दुबारा प्रयोग खतरनाक है। डिब्बों को तीन बार पानी से खंगाल कर चाहिए और इस खंगाले गए पानी को छिड़काव के घोल में डाला जाना चाहिए। २. खाली डिब्बों को तोड़कर निपटाना ही पूर्ण संभव की गई है। ३. खाली डिब्बों को दुबारा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ४. यह कीटनाशक निर्माताओं तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों/पैकिंग या बची हुई कीटनाशक तथा सामग्री के घोल का निपटान सुरक्षित ढंग से करे जिससे पर्यावरण या पानी प्रदूषित न हो।

विषाक्तता के लक्षण: आँखों, मुँह और/या नाक से स्राव गिरा हो सकता है।

प्राथमिक उपचार: १. निगल लिए जाने पर: यदि व्यक्ति होश में और सचेत है तो मुँह को पानी के साथ कुल्ला करवाएं और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। कभी भी किसी बेहोश व्यक्ति को मुँह के द्वारा कोई चीज न दें। चिकित्सक की कुशलता तक वमन न करें, तब तक उल्टी करवाने की कोशिश न करें। **२. सांस ले लेने पर:** व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और उसे गरम रखें। यदि व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह के कृत्रिम श्वसन दें। डॉक्टर की सलाह लें। **३. त्वचा से संपर्क होने पर:** बालों और नाखूनों के नीचे के भाग सहित शरीर के प्रभावित अंगों को साबुन और खूब सारे पानी के साथ अच्छी तरह से धोएं। यदि दर्द, जलन या त्वचीय चर्म रहते हैं तो चिकित्सक से संपर्क करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग करें और इस्तेमाल से पहले साबुन एवं पानी के साथ अलग से अच्छी तरह धोएं। **४. आँखों से संपर्क होने पर:** कम से कम १५ मिनट तक खूब सारे पानी के साथ कोमलतापूर्वक आँखों को धोएं। यदि दर्द, जलन, लालिमा या प्रकाशभीरुता बनी रहती है तो आँखों के विशेषज्ञ से परामर्श करें।

विषाक्तता: कोई भी ज्ञात विषाक्तता विषाक्तता नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

सावधानियां: १. लेबल/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन में प्रयोग न किया जाए। २. यह उत्पादन रेशम के कीड़ों के लिए विषाक्त है। समस्त बागानों और रेशम कीड़ा पालन के सुविधाओं के पास भटक न होने दें। पत्तियों के बाद मल्बरी के बागानों को न लगाने जहां आमतौर पर क्लोरोट्रानिलिप्रोल आधारित सूत्रीकरण का प्रयोग पत्ते या मिट्टी में किया जाता है। ३. अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) पर आधारित, क्लोरोट्रानिलिप्रोल आधारित सूत्रीकरण का प्रयोग मधुमक्खियां सक्रिय होने पर न करें। ४. यह उत्पाद जलीय अकशेरुकीय के लिए विषाक्त है इसलिए इसका प्रयोग जलीय कृषि के पास नहीं किया जाना चाहिए।

रासायनिक संघटन:

संघटक	% भा/भा
क्लोरोट्रानिलिप्रोल ए.आई.	३५.०
सोडियम अल्काइल नेफ्थेलीन सल्फोनेट	०.५
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	३.०
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट, सल्फोमिथाइलेटेड	६.०
अमोर्फस सिलिका	०.५
सुक्रोस	१.०
क्ले	८.०
लैक्टोस मोनोहाइड्रेट	सर्वोच्च मात्रा
कुल	१००.००

निर्माता: गोवन मिलिंग एलएलसी, १२३०० ई. काउंटी ८वीं स्ट्रीट, यूमा अरिजोना ८५३६५, यूएसए (एफएमसी कॉर्पोरेशन, २९२९ वालनट स्ट्रीट, फिलाडेल्फिया, पेन्सिल्वानिया, १९१०४ यूएसए के द्वारा नामित निर्माता) **आयात तथा पुनः पैकिंगकर्ता: एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस पता:** टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ वा मजला, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई बांद्रा सबर्ब, महाराष्ट्र-४००९९८, भारत. **फैक्टरी:** १४९, गांव किलावलम, मधुरांतकम तालुका, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु.

कोरप्राईमा™

क्लोरोट्रानिलिप्रोल ३५% w/w डब्लू जी
(व्यापक प्रभावी कीटकनाशक)

हेतू: कृषि वापरासाठी

पीक आणि कीडव समूह: क्लोरोट्रानिलिप्रोल ३५% w/w डब्लू जी एक रेनाक्सिलिन डायमाइड कीटकनाशक आहे, भाजी किंवा भेंडी आणि टोमॅटो पिकावरील लेपिडोप्टेरन कीडव्यवस्थापनासाठी शिफारस केली जाते.

डोस:

पीक	कीडीचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रति हेक्टर			फवारणी पासून कापणी पर्यंत (दिवस)
		सा.न. (ग्रॅ.)	डोसमा (ग्रॅ.)	पाण्याच्या फवारणीची मात्रा (लि.)	
भेंडी	फळ पोखरणारी (हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, इरासिया विटेला)	१५	७१	५००	५
टमाटा	फळ पोखरणारी अळी (हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा)	३०	८६	५००	३

वापरासाठी निर्देश/फवारणीची तंत्रपद्धत:

हवामानाची सामान्य स्थिती: हवामानाच्या प्रतिकूल स्थितीमध्ये फवारणी करू नका.

फवारणीची वेळ आणि फवारणीची संख्या, फवारणीची वारंवारता अधिकतम संख्या आणि फवारणीसाठी पीकाचा टप्पा: हा उत्पादनाची फवारणी करावी. फवारणी फवारणी पुढे रेनाक्सिया सुरुवातीस सुरू केली पाहिजे जेथे कीटकांची संख्या ईटीएल (आर्थिक नुकसानीच्या मर्यादा) पातळी पोहचले तेव्हा त्यानंतर दुसरी फवारणी १२-१४ दिवसांच्या अंतराने आणि प्रत्येक पीक हंगाम प्रमाणात दोन वेळेपेक्षा जास्त नाही याची काळजी घ्या.

फवारणी उपकरण आणि नोझलचा प्रकार: पूर्ण लाल ते आणि एकसमान फवारणी सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च मात्रेचा फवारणी उपकरणांचा वापर करा, जसे नैपसैक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, इ. ज्यात होलो कोन नोझल लावलेले असावे.

मिश्रण साठी सूचना: फवारणी टाकीचा १/४ ते १/२ पर्यंत पाण्याने भरा. कीटकनाशक लेबलच्या दरानुसार थेट फवारणी टाकीमध्ये टाकून चांगले मिसळा, कीटकनाशक पूर्णपणे पसरण्यासाठी. फवारणी मिश्रणाच्या द्रावणाला पूर्ण रात्रभरासाठी फवारणी टाकीत साठवू नका.

जमीनी आणि पाणी: कोणत्याही खास माती आणि जल प्रबंधनाची आवश्यकता नाही

पुनः प्रवेश अवधि: फवारणी सुकेपर्यंत २४ तासांपर्यंत उपचारित क्षेत्रात प्रवेश करू नये.

सुरक्षेसंबंधी खबरदारी: १. उत्पादनाचा वापर करते वेळी काहीही खाऊ, पीऊ व धूम्रपान करू नये, पान चघळू नये. २. उत्पादनाचा वापर करते वेळी पूर्ण बाहींचा शर्ट, लांब पँट, रसायन प्रतिरोधक हातमोजे, मास्क आणि झाकलेले बूट घालावे. ३. वारुळा दिशेने फवारणी करून फवारणीच्या तुषारा पासून स्वतःला वाचवा. ४. फवारणी नोजलला तोंडाने फुंकू नये, अवरोधित नोजलला स्टेम या ब्रश ने स्वच्छ करावे. ५. शरीरावर कीटकनाशकाची गळतीच्या परिस्थितीत, उघड्या भागास साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा. ६. हात आणि शरीराचा उघडा भाग हाताळणीच्या पूर्वी, फवारणी नंतर दूषित कपडे काढून धुवा.

प्रतिरोधकता प्रबंधन विधान:

समूह २८ कीटकनाशक

जोपर्यंत उत्पादक लेबल विशिष्ट पीक/कीड विभाग निर्दिष्ट दिलेल्या (लेबल) नसेल, तोपर्यंत क्लोरोट्रानिलिप्रोलच्या किंवा इतर २८ या गिलाच्या किड प्रतिरोधक क्षमतेचे विकास रोखण्यासाठी किंवा उशीर करण्यासाठी खालील प्रथांची शिफारस केली जाते:

१) कीटकांच्या पिढी ते पिढीत कीटकनाशकाच्या समान प्रकारच्या प्रति प्रतिरोधकता टाळण्यासाठी "विंडो" पद्धतीने क्लोरोट्रानिलिप्रोल अथवा इतर समूह २८ कीटकनाशकांचा वापर करा. कीटकांच्या एका पिढीच्या नियंत्रणासाठी क्लोरोट्रानिलिप्रोलचा वापरले जाणे जरूर नेहमी तर, ते नियमित केले जाणे शक्ते. क्लोरोट्रानिलिप्रोल आणि इतर इतर २८ कीटकनाशकांना "विंडो" पद्धतीने वापर केल्यानंतर, नेहमीच प्रकारची किडनाशके, वापरून प्रकारची किडनाशके वापरून परिणामकारक कीटकनाशकांच्या "विंडो" पद्धतीद्वारा वापरून बदलावी.

२) "विंडो" ची लांबी लक्षीत कीटकाच्या एक पिढीच्या कालावधि एवढ्या असावी. सर्व मुळ २८ सक्रिय विंडोंची एकूण संचये अवधि (जेव्हा लागवडी पासून कापणी पर्यंत पूरक पीक चक्र) पीक चक्राच्या ५०% हून अधिक नाही असे असावे.

३) संपूर्ण पीक प्रबंधन कार्यक्रमात एकत्रित कीट प्रबंधन (आयपीएम) आणि रेनाक्सिया या तंत्रांचा समावेश करा.

४) पीकाची घटे क्षमता होईपर्यंत, त्यानंतरही कीटकांच्या संख्येकडील देखरेख करीत रहावे.

साठवण: १.) हे कीटकनाशक असलेली पॅकिंग इतर सारे रेनाक्सिलची असलेल्या जागा या खोल्या या एकूण दूर जागी या खोल्यात किंवा कीटकनाशकांच्या दार व ताला बंद चाबी ठेवून करून ठेवावे लहान मुलांच्या पोहोचे पलीकडे, पशूंच्या चारा पासून दूर अलग ठेवावे किंवा कुलूप चाबी असलेल्या कपाटात ठेवावे. २.) कीटकनाशक साठा करून ठेवण्याची जागा हवा खेळती, कोरडी, हवा खेळती असलेली, चांगल्या उजेडाची आणि लांबी-रुंदीचे पुरेसे असावी ज्यामुळे वाष्पाने होणारे दूषणाचे टाळता येईल.

विल्हेवाट: १. रिकामी झालेल्या पुनर्वापरास अयोग्य आहे. डबे तीन वेळा पाण्याने खळखळून धुवावे व धुतलेले पाणी फवारणीच्या मिश्रणात टाकावे लागेल. २) वापरलेले पॅकिंग मोडून-तोडून जमीनीखाली दूर करणे जमिनीत खोल दुरावीत. ३) दूर: अन्य वापरासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून पॅकिंगचे उपद्रवाच राखू नयेत. ४) कीटकनाशक निर्माता व उपयोगकर्ता ह्यांचे कर्तव्य आहे कि पॅकिंगचा किंवा उरलेले प्रकार किंवा फवारणीची साफसाफ सुरक्षेने पाणी वापरी किंवा विनियोग पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही असा सुरक्षित पद्धतीने करावी.

उपचारीयता: जर गिळले गेल्यास: जखमी व्यक्तिला असेल तर, पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी पिण्यास द्या. नसलेली जर बेशुद्ध असेल तर बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही तोंडे घ्या. डॉक्टरला बोलावा. डॉक्टरी उपचारा विशिष्टपणा झाली जाणी करण्यास सांगितले जात नाही तोपर्यंत जाणी करू नये. **जर इनहाला आले गेल्यास:** व्यक्तीला मोकळ्या ठिकाणी घेऊन जाणे आणि शरीराच्या तापमानाचा त्रास टाळा. जर श्वसनक्रियेत व्यक्तीला त्रास होत असेल किंवा श्वसनक्रियेत अडचण असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने। सीएमएस वापरीचा सल्ला घ्या. चिकित्सकाचा सल्ला घ्या. **जर त्वचेशी संपर्क आल्यास:** शरीराशी संपर्क आलेला भाग साबण व भरपूर पाण्याने धुवा, पण यात केस व नखे देखील धुवा, जर वेदना, लालसरपणा किंवा त्रासदायक क्रियेत त्रास होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे करून साबण आणि पाण्याने धुवावे. **जर डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास:** हळुवारपणे भरपूर पाण्याने किमान १५ मिनिटे स्वच्छ धुवा. जर वेदना, जळजळ आणि डोळे सोडा लालसर राहत असल्यास डोळ्यांच्या तज्ज्ञाचा सल्ला घ्या.

औषधोपचार: कोणताही ज्ञात उपचार ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

सावधगिरी: १. लेबल/पत्रिकेवर या निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २. यह उत्पादन रेशम के कीड़ों के लिए विषाक्त है। समस्त बागानों और रेशम कीड़ा पालन के सुविधाओं के पास भटक न होने दें। पत्तियों के बाद मल्बरी के बागानों को न लगाने जहां आमतौर पर क्लोरोट्रानिलिप्रोल आधारित सूत्रीकरण का प्रयोग पत्ते या मिट्टी में किया जाता है। ३. अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) पर आधारित, क्लोरोट्रानिलिप्रोल आधारित सूत्रीकरण का प्रयोग मधुमक्खियां सक्रिय होने पर न करें। ४. यह उत्पाद जलीय अकशेरुकीय के लिए विषाक्त है इसलिए इसका प्रयोग जलीय कृषि के पास नहीं किया जाना चाहिए।

रासायनिक संघटन:

संघटक	% भा/भा
क्लोरोट्रानिलिप्रोल ए.आई.	३५.०
सोडियम अल्काइल नेफ्थेलीन सल्फोनेट	०.५
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	३.०
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट, सल्फोमिथाइलेटेड	६.०
अमोर्फस सिलिका	०.५
सुक्रोस	१.०
क्ले	८.०
लैक्टोस मोनोहाइड्रेट	सर्वोच्च मात्रा
कुल	१००.००

निर्माता: गोवन मिलिंग एलएलसी, १२३०० ई. काउंटी ८वीं स्ट्रीट, यूमा अरिजोना ८५३६५, यूएसए (एफएमसी कॉर्पोरेशन, २९२९ वालनट स्ट्रीट, फिलाडेल्फिया, पेन्सिल्वानिया, १९१०४ यूएसए के द्वारा नामित निर्माता) **आयात तथा पुनः पैकिंगकर्ता: एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस पता:** टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ वा मजला, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई बांद्रा सबर्ब, महाराष्ट्र-४००९९८, भारत. **फैक्टरी:** १४९, गांव किलावलम, मधुरांतकम तालुका, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु.

FMC

Customer Care : 1800 103 0540,
E-Mail:fmc.care@
or write us at FMC India Private Limited,
TCG Financial Centre, 2nd Floor,
C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Bandra Suburban, Mumbai - 400098, Maharashtra.
To verify the authenticity of the product, and the alphanumeric code on box, sms to + 91987 1100800

Website - https://sg.fmc.com/india

Corprima™ and Renacyor™ are trademarks of FMC Corporation or its affiliate

440mm x 410mm

88mm | 88mm | 88mm | 88mm | 88mm

ஜீரூபா™

நீரிழிவுக்கான 25% ஆர்ச் ஆயுர்வேத முலாம்பழ (கருப்பு விதை) பொடி

(சர்க்கரை கீழ்மை)

(தூய வடிவுப்படி: முலாம்பழமாக் கூட்டமாக்கப்பட்டது)

கலவை மற்றும் கிடைக்கை: ஒவ்வொரு 100 கிராம் பொடியில் 25% கால் ஆர்ச் ஆயுர்வேத முலாம்பழ (கருப்பு விதை) சாறு கலந்தவை. தூய்மை மற்றும் வலிமை: 100% சான்றளிக்கப்பட்ட கரிம மற்றும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கருப்பு விதை முலாம்பழ விதைகளிலிருந்து பெறப்பட்டது.

கூறு	கிலோவிற்கு சராசரியாக			ஒரு நாளைக்கு சராசரி
	0.0 (முலாம்பழ)	12.5 (25% சாறு)	25.0 (100% சாறு)	1 கிராம் (கிராம்)
மொத்த	சாறுகளின் (100% சாறு, 1கிராம், 2கிராம்)	25	71	150	5
மரபணு	சாறுகளின் (100% சாறு, 1கிராம்)	20	66	150	3

நீரிழிவுக்கான பயன்கள்:

சர்க்கரை அளவுக்கு ஆதரவு: முலாம்பழ சாறுகளை பயிற்சியுடன் பயன்படுத்தும்போது.

சாப்பிட்ட பிறகான சர்க்கரை அளவுகளை மேம்படுத்தலாம்: ஒரு ஆய்வில், 100 கிராம் சாறு 2 மணி நேரத்தில் சர்க்கரை அளவை 15 சதவீதம் குறைத்தது. 2. இது எதற்காக முக்கியமானது? இது கணையத்தை ஓய்வெடுக்க அனுமதிக்கிறது. ஊட்டச்சத்து நிறைந்த சிறுநீரகம் சார்ந்த நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சிறந்தது. 3. ஒரு ஆய்வு 2 மாதங்களுக்கு 1 கிராம் சாறு கொடுக்கப்பட்டது. சர்க்கரை அளவுகளில் கணிசமான குறைவு. ஒரு ஆய்வு 12 வாரங்களுக்கு 2 கிராம் சாறு. 4. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 5. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 6. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 7. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 8. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 9. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 10. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 11. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 12. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 13. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 14. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 15. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 16. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 17. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 18. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 19. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 20. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 21. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 22. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 23. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 24. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 25. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 26. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 27. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 28. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 29. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 30. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 31. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 32. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 33. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 34. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 35. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 36. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 37. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 38. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 39. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 40. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 41. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 42. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 43. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 44. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 45. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 46. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 47. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 48. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 49. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 50. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 51. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 52. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 53. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 54. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 55. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 56. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 57. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 58. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 59. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 60. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 61. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 62. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 63. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 64. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 65. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 66. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 67. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 68. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 69. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 70. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 71. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 72. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 73. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 74. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 75. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 76. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 77. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 78. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 79. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 80. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 81. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 82. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 83. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 84. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 85. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 86. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 87. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 88. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 89. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 90. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 91. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 92. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 93. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 94. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 95. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 96. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 97. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 98. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 99. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு. 100. ஒரு ஆய்வு 1 கிராம் சாறு 3 மாதங்களுக்கு.

பயன்படுத்தும் விதம் / தொகுக்கும் வழிமுறை:

காலையில் நீரிலும் (பொருத்தமானது): காலைக்கொடிய வாயிலிலுள்ள பொருட்களுடன் பயன்படுத்தலாக வேண்டும்.

மற்றும் தொகுக்கும் காலம், தொடர்ப் பண்ணுவதன் மற்றும் பயன் வரவேண்டிய அறிகுறிகள் தொகுக்க தூண்டை: ஒரு மேற்கொண்ட கிடைப் பெறுவிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். முக்க ஆறுமாதங்கள் முழுவதும் தரம் தொடர்ப் கொடுப்பதை வேண்டும். 10-14 பயன் வரவேண்டும். கிடைப்பதில் ஒரு பொருளாக வேண்டும். கிடைக்கு தொடர்ப் 10-14 நாட்கள் வரவேண்டும். ஒரு பயன் பயன்படுத்தப்பட்டு வேண்டும். ஒரு பயன் பயன்படுத்தப்பட்டு வேண்டும்.

தொடர்ப் வருவதில் மற்றும் கவனம் தரவேண்டிய: ஒரு மேற்கொண்ட கிடைப்பதில் 1/4 கப் 1/3 1/2 பயன் பயன் வரவேண்டும். ஒரு பயன் பயன்படுத்தப்பட்டு வேண்டும்.

மற்றும் கவனம் தவிர்க்கத் குறிப்புகள்: உடல்வ 119 பாதுகாத்துக் தவிர்க்கப் தொடர்ப்கொள்ள வேண்டும். கொடுப்பது கொடுத்துக்கொள் பொருட்கள் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டு வேண்டும். முக்கியமாக ஒரு பொருளை கவனம் தவிர்க்கப் தவிர்க்க கவனிக்க கொடுக்க வேண்டும். ஒரு கவனமாக கிடைப்பதில் ஒரு பொருளாக நீரிலிருப்பவர்களுக்கு.

மற்றும் தேவைக்கு ஏற்ப தயாரிப்பு: சமநிலை பொருளை கொடுக்கப் கொடுக்கப்பட்டு வேண்டும். ஒரு பொருளாக கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக பொருட்கள் கொடுக்கப் வேண்டும். 2 தேவையான கவனம் தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 3 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 4 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 5 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 6 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 7 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 8 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 9 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 10 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 11 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 12 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 13 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 14 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 15 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 16 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 17 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 18 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 19 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 20 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 21 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 22 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 23 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 24 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 25 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 26 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 27 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 28 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 29 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 30 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 31 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 32 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 33 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 34 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 35 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 36 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 37 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 38 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 39 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும். 40 கவனமாக தரவேண்டிய கவனமாக கொடுக்கப் வேண்டும்.

கலவையின் பெயர்கள்	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	