अझाका™ डुओ

एझोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% + डिफेरेनोकोनाझोल 11.4% एस.सी.

(सीस्टमिक फुगनाशक)

हेतू: कृषि वापरासाठी

एझोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% वजन/वजन अने + डिफेरेनोकोनाझोल 11.4% वजन/वजन એસસી આધારિત વાયરલું મુખ્ય રોગકારક સૂક્ષ્મજીવો સામે પ્રણાલીગત ફુગનાશક છે. તે એથરેક્નોસના નિયંત્રણ અને મરચાંની પાઉડરી માઇલ્ડ્યુ માટે આગ્રહણીય છે; ટમેટાની પ્રારંભિક ફુગ અને પછીની ફુગ માટે, ડાંગરના બ્લાસ્ટ અને શીથ બ્લાઇટ; મકાઈના બ્લાઇટ અને ડાઉની ફુગ; ઘઉંના એનથ્રાકોન્સ અને પાવડરી ફુગ

उपयोग:

पाक	कीटना नाम	प्रति हेक्टर मात्रा संरचना (मिली. /लीटर)		पाणीनी मात्रा (लीटर)	छेल्ली छंटकार तथा पाक कापवा वच्चेनो अंतर (दिवस)
घउं	એનથરાકોન્સ અને પાવડરી ફુગ	0.03% અને 0.3 ગ્રા/લી	0.1% અને 1 મિલી લિ. પાણી	500	35
टमेटो	પ્રારંભિક ફુગ અને પછીની ફુગ	0.03% અને 0.3 ગ્રા/લી	0.1% અને 1 મિલી લિ. પાણી	500	5
डांगर	બ્લાસ્ટ અને શીથ બ્લાઇટ	0.03% અને 0.3 ગ્રા/લી	0.1% અને 1 મિલી લિ. પાણી	500	31
मकाइ	બ્લાઇટ અને ડાઉની ફુગ	0.03% અને 0.3 ગ્રા/લી	0.1% અને 1 મિલી લિ. પાણી	500	26
मरचां	એનથરાકોન્સ અને પાવડરી ફુગ	0.03% અને 0.3 ગ્રા/લી	0.1% અને 1 મિલી લિ. પાણી	500	5

उपयोगनी सूचना: હવામાનની સ્થિતિ-વાવાઝોડું અને વરસાદી હવામાન દરમિયાન સ્પ્રે કરવુંનથી; માટી-સ્પ્રે જ્યારે જમીનમાં પૂરતી ભેજ હોય; પાક સ્ટેજ,છંટવાની તરકીબો અને સમય, સાધનો નોઝલ પ્રકાર, મિશ્રણ અને આવૃત્તિ સ્પ્રેના નંબર સહિત-ઉત્પાદન જરૂરી જથ્થો બહાર માપી અને તે સારી રીતે પાણી સાથે ભેળવો. નિર્દિષ્ટ તૈયારી ઘોલી ફુગીનાશક પાણીમાં ઉમેરો. 1-2 સ્પ્રે આપો (રોગની ગંભીરતાને ધ્યાન રાખીને, સ્પ્રેનું પુનરાવર્તન કરો) થેલો અથવા અન્ય કાંઠો ધોગ્ય સ્પ્રેયર ઘોલો શંકુ કે કાઠંપણ અન્ય યોગ્ય નોઝલ નો ઉપયોગ એ સમયે કરો જ્યારે પાક ઉપરોક્ત રોગો સાથે સંક્રમિત હોય; ફરી પ્રયોજનો સમયગાળો-સ્પ્રે ટીપું સુકાય નહીં ત્યાસુધી પ્રવેશ ના કરો, ખાલી કન્ટેનરનો ફરીથી ઉપયોગ ખતરનાક છે. વપરાયેલા પેકેજોને ફરીથી ઉપયોગમાંથી અટકાવવા માટે અને વસવાટથી દૂર દાટી દો.

सावचेतीओ: ઉપયોગ પછી દૂષિત કપડાં અને ભાગોને ધોઈ નાખો. ઉપયોગ દરમ્યાન સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં (હાથ મોજા, માસ્ક, ગોગલ્સ, બુટ વગેરે) પહેરો. ઇન્હેલેશનથી દૂર રહો, એપ્લિકેશન દરમિયાન ધૂમ્રપાન, પીવું, ખાવું અને કાંઇ ચાવવું નહીં સ્પ્રે સોલ્યુશન તૈયાર કરવા માટે રાંધવાના વાસણોનો ઉપયોગ કરશો નહીં સ્પ્રે સોલ્યુશનને હલાવવા માટે લાકડીઓનો ઉપયોગ કરો સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોવો. કાંસ્ટેટ્રેટ અથવા સ્પ્રે મિશ્રણ સાથે સંપર્ક થાય તો,તરત જ ચમડીને પાણી તાજા પાણી સાથે ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ માટે ધુવો, ચોખા પાણીથી 15 મિનિટ આંખો ધુવો, દૂષિત કપડાં દૂર કરો. ઉપયોગ કર્યા પછી, સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રક્ષણાત્મક સાધનો ધુવો અને જ્યાં મત્સ્યપાલન/આંતરપાક મત્સ્યપાલન ચોખાની ખેતી ના થતી હોય ત્યારાખો. ઉત્પાદન માછલી માટે ઝેરી છે.

લક્ષણો: ઝેરના કારણે કીડી પ્રસરણ ઘાટીજથ્થ, મધ્યમ ફળ ખસી શકે, પ્રતીભાવ ઘટીજાય,શ્વાસની ઊિંડાઈ વધી જાય પણ શ્વાસાન્સ રેટ ઘટી જાય.

प्राथमिक सारवार: ત્વચા સંપર્કે: ભગવેલા કપડાં કાઢી નાખો અને ત્વચા ને સાબુ અને પાણીથી બરોબર ધુઓ. **શ્વાસમાં જાય તો:** તાજી હવામાં લઈ આવો, સામાન્ય સંજોગોમાં જોખમકારક નથી. તકલીફ થાય તો ડોક્ટરને બતાવો. **આખમાં જાય તો:** દવા જો આંખમાં જાય તો પુષ્કળ પાણીથી આંખોને સાફ કરો. પીડા બની રહે તો ત્રંગ વિશેષજ્ઞની સલાહ લેવી. **પેટમાં જાય તો:** જો ઝેર શરીરમાં ગયું હોય તો મેડીકીનલ ચારકોલને પાણીમાં મેળવીને વારંવાર પીવડાવો. ડોક્ટરને બતાવો. **સૂચના:** મૂર્છા પામેલા દર્દીને માં વાટે ક્યારેય કશું પણ આપવું જોઈએ નહી. તેને ઉલ્ટી કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ.

विषनाशक: ઝેરનું કોઈ ખાસ મારણ નથી. આથી લક્ષણો મુજબ સારવાર કરવી.

खाली डब्बाओनो निकास: 1. ખાલી ડબ્બાઓને તોડીને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ. 2. ખાલી ડબ્બાઓનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે એમને બહાર ન કંકશો. 3. વધેલા ફુગનાશક તથા મશીન વગેરેની સફાઈ કરેલા પાણીને એ રીતે નિકાલ કરો કે વાતાવરણ અને જળ પ્રદૂષિત ના થાય.

संज्ञेक: 1. ફુગનાશક ડબ્બાનો સંગ્રહ, જુદા ઓરડા કે સ્થાનમાં, અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીન ખાદ્ય પદાર્થો રાખવાનાં ઓરડાથી દૂર કરવો જોઈએ. કે ફુગનાશકનું પ્રમાણ અને પ્રકાર પ્રમાણે ડબ્બાઓને અલગ કબાટમાં તાળાવાળીમાં બંધ કરીને રાખો. 2. ફુગનાશકનો સંગ્રહ ઓરડા કે સ્થાન હવા-ઉજાસવાળા, મજબૂત અને પૂરતા લંબાઈ પહોળાઇવાળી હોવો જોઇએ, જેનાથી ભાષ્ય પ્રદૂષણ ન થાય.

रासायनिक रचना:

એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન એ.આઈ.	18.20% ભાર/ભાર
ડિફેરેનોકોનાઝોલ એ.આઇ.	11.40% ભાર/ભાર
(ડિસ્પર્સંટ)	%
નેપ્થાલીનેસલ્ફોનિક એસિડ, સોડિયમ મીઠું કોર્મલ્ડેહાઇડ	1.22% ભાર/ભાર
બ્લોકોપોલીમર પીઓ/ઈઓ	1.13% ભાર/ભાર
એંટીફોમિંગ એજન્ટ	%
પોલીડાઇમીઠાઇલ્સિલોક્સાન	0.79% ભાર/ભાર
(થિકનર)	%
(જાડા) રેખીય પોલીસેકરાઇડ	0.25% ભાર/ભાર
(પ્રિસર્વેટિવ)	%
1,2-બેન્ઝાઇસોથીયાઝોલ 3(2એચ)-એક	0.03% ભાર/ભાર
ભજવાળી	%
સીટીએલ/સ્ટેરીલ-આલ્કોહોલ એસોસિયલેટેડ	20.70% ભાર/ભાર
પાણી	જરૂરી માત્રા%
કુલ	**100.00 ભાર/ભાર**

ચેતવણી: આ લેબલ/પત્રિકામાં જણાવેલા પાકો સિવાય અન્ય પાકો પર પ્રયોગ કરવો નહીં.

सावधगिरी: ૧. કાયણી પછીની અરજી માટે ઉપયોગ ના કરવો. ૨. આ પત્રિકાર નિર્દેશિત કર્યા મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કાઢેલાદાનો નાશ કરો. ૩. નિર્દેશ / ડોઝ પોલી હાઉસ/નીમિત વિસ્તાર માટે સંબંધિત નથી કારણ કે ઉત્પાદન ખુલ્લા મેદાનમાં ઉપયોગ માટે છે.

अझाका™ डुओ

एझोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% + डिफेनोकोनाझोल 11.4% एस.सी.

(सिस्टेमिक बुरशीनाशक)

हेतु: कृषिजन्य उपयोग माटे

एझोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% भार/भार + डिफेनोकोनाझोल 11.4% भार/भार एस.सी है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ફુગીનાશક આદે ધે પ્રમુખ રોગકારક સૂક્ષ્મજીવો સામે પ્રણાલીગત ફુગનાશક છે. તે એથરેક્નોસના નિયંત્રણ અને મરચાંની પાઉડરી માઇલ્ડ્યુ માટે આગ્રહણીય છે; ટમેટાની પ્રારંભિક ફુગ અને પછીની ફુગ માટે, ડાંગરના બ્લાસ્ટ અને શીથ બ્લાઇટ; મકાઈના બ્લાઇટ અને ડાઉની ફુગ; ઘઉંના એનથ્રાકોન્સ અને પાવડરી ફુગ

उपयोग:

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा सं.तत्व (मिली. /लि)	संरचना	पाण्याचे प्रमाण (लि.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवस)
गहू	रस्ट आणि पावडरी मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅ./लि	0.1% किंवा 1 मि.लि पाणी	500	35
टोमाटो	अर्ली ब्लाईट आणि लेट ब्लाइट	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅ./लि	0.1% किंवा 1 मि.लि पाणी	500	5
भात	ब्लास्ट आणि शीथ ब्लाईट	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅ./लि	0.1% किंवा 1 मि.लि पाणी	500	31
मका	ब्लाईट आणि डाऊनी मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅ./लि	0.1% किंवा 1 मि.लि पाणी	500	26
मिरची	अन्थ्रानोस आणि पावडरी मिल्ड्यू	0.03% किंवा 0.3 ग्रॅ./लि	0.1% किंवा 1 मि.लि पाणी	500	5

वापरण्यासाठी निर्देश: हवामान परिस्थिती– वारा आणि पाऊस असलेल्या हवामानात फवारणी करू नका. जमिनीत पुरेसा ओलेपणा असताना फवारणी करा.पिकांची स्थिती, वापरण्याची पद्धत आणि वेळ. उपकरण, नोझलचा प्रकार, मिश्रण बनवण्यासाठी सूचना आणि फवारणीची संख्या आणि फेऱ्या– उत्पादनाचं आवश्यक प्रमाण घ्या आणि थोडया पाण्यात ते मिसळा. संपूर्ण पिकावर फवारणीसाठी उरलेलं पाणी त्यात मिसळा. पिकांवर वर दिलेले आजार आढळल्यास, नेपसेक स्प्रेयर किंवा पोकळ कांठा किंवा इतर योग्य नोझल असलेल्या स्प्रेयरने 1–2 फवारण्या (आजाराच्या जोरानुसार, पुन्हा फवारणी करा. पुन: प्रवेश काळ– फवारणीच्या औषधाचे थेंब सुके पर्यंत शेतात प्रवेश करू नका. रिकामे डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे. वापरलेले खोके बाहेर टाकू नये यामुळे त्यांचा पुनर्वापर थांबवता येईल, ते तोडून वस्ती पासून लांब जमिनीत पुराये.

काळजी: फवारणी नंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग स्वच्छ धुवा. फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षक कपडे (हात मोजे, मुखवटा, गॉगल्स, बूट इत्यादी) घाला. श्वासावाटे आत जाणार नाही याची काळजी घ्या. फवारणी करताना काही खाऊ, पिऊ आणि चाऊ नका, धूम्रपान करू नका. फवारणीचं मिश्रण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. मिश्रण हलवायला काठी वापरा. काम संपल्यानंतर हात मरपूर आणि आणि साबणाने स्वच्छ धुवा आणि कपडे बदला. फवारणीच्या मिश्रणाने दूषित झाल्यांचं आढळल्यास त्वरित त्वचा स्वच्छ धुवा, डोळे किमान 15 मिनिटे भरपूर आणि ताज्या पाण्याने स्वच्छ धुवा. दूषित कपडे काढून टाका. वापरानंतर संरक्षक उपकरणे नीट स्वच्छ करा, संपूर्ण शरीर धुवा आणि कपडे बदला.जिथे मनुष्य वास्तव्य शेतीसह मत्स्यपालन होत असेल आणि आंतरपीकचे थेतली जात असतील त्या मातीत हे उत्पादन वापरू नये. हे उत्पादन माशांसाठी विषारी आहे.

विषबाधेची लक्षणे: विषबाधेमुळे हालचाली मंदावू शकतात, डोळ्यांच्या बाहुल्या प्रसरण पाऊ शकतात, पाय थोडे लटपटणे, पाय फाकवण्याची क्रिया मंदावू शकते, दीर्घ श्वास घ्यावा लागू शकतो आणि श्वासाची गती कमी होऊ शकते.

प्रथमोपचार: श्वासावाटे आत गेल्यास: पीडिताला मोकळ्या हवेत न्यावे, त्याला ऊबदार ठेवावे आणि विश्रांती घेऊ द्यावी. **त्वचा गेल्यास:** त्वचा ताबडतोब साबण आणि पाण्याखाली धुवा. **डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास:** भरपूर पाण्याने डोळे स्वच्छ धुवा, डोळे दुखणं थांबलं नाही तर नेत्ररोग तज्ञाचा सल्ला घ्या. **सूचना:** मूर्छित रुग्णाला तोंडावाटे काहीही देवू नये, उलटी करण्याचा प्रयत्न करु नये.

विषनाशक: कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

खाली डब्बाओनी विल्हेवाट: 1. पॅकेजिंग किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्रकारे आणि पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घेऊन करावी. रिकामे पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत. 3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुन: वापली जाऊ नयेत म्हणून उघडवावर ठेवू नयेत.

साठवण: 1. तणनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषत: खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटाती कडीकुलपात ठेवावीत. 2. तणनाशकच्या साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेलती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक रचना:

एझोक्सिस्ट्रोबिन स.त.	18.20% भार/भार
डिफेनोकोनाझोल	11.40% भार/भार
(डिस्परसंट)	%
नेफ्थालीनस्ल्फोनिक एसिड,	1.22% भार/भार
सोडियम सॉल्ट कंडेनसेटेड विथ फॉरमलडिहाइड	%
ब्लॉकोपोलिमर पीओ/ईओ	1.13% भार/भार
एंटिफोमिंग एजंट	%
पोलीडाइमीठाईप्सिलोक्साइन	0.79% भार/भार
(थिकनर)	%
(जाडा) रेभीय पोलीसेकराइड	0.25% भार/भार
(प्रिसर्वेटिव)	%
1,2-बेंझाइसोथीयाजोल 3(2अेच)-अेक	0.03% भार/भार
भजेवाणी	%
सीटीअेल/स्टेरील-आल्कोहोल अेसोसियलेटेड	20.70% भार/भार
पाणी	जरूरी मात्रा%
कुल	**100.00 भार/भार**

चेतावणी: आ लेभल/पत्रिकामां जणावेला पाको सिवाय अन्य पाको पर प्रयोग करवो नहीं.

सावधेतीः १. કાયણી પછીની અરજી માટે ઉપયોગ ના કરવો. ૨. આ પત્રિકાર નિર્દેશિત કર્યા મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કાઢેલાદાનો નાશ કરો. ૩. નિર્દેશ / ડોઝ પોલી હાઉસ/નીમિત વિસ્તાર માટે સંબંધિત નથી કારણ કે ઉત્પાદન ખુલ્લા મેદાનમાં ઉપયોગ માટે છે.

अज़ाका™ डुओ

एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% + डिफेनोकोनाझोल 11.4% एस.सी.

(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

प्रयोजन: कृषि उपयोग हेतु।

ऐझेक्सिमट्रॉबिन 18.2% भार/भार + डाइडेठेठेनेकोनाझेल 11.4% ભાર/ભાર એમ.મી. વિશ્વપ્રચલિત ધારેલે વરેલે ઉંચ્ચીનાશક લી મ્રંઘ રેગાજલકાં મેઘેવ્રમિલિમેઠોન ત્રિ્મા વરલા છે। ઇમસી મિરગાં વિંચ મેઘેવ્રનેઝમએ પુઝેગાવ ઉંચ્ચી; ટમાટર વિંચ અગોતી વુંગી અગેતી અંગમારી રોગ તથા વિલંબિત અંગમારી રોગ, ધાન મે સહસોમારી રોગ તથા પર્ણછાદ વુંગી; બટર મે રમટ અગે પુઝેગાવ ઉંચ્ચી લી રેવખમ લછી મિશ્રણિમ વીતી જાંદી છે।

मिश्रणिम:

झाडा	बीट दे रंगम	पुडी रेवटेअर मात्रा मं (मिली/ ली)	मंरचछरा	पाण्डी दी मात्रा (लीटर)	अंतम छिड़कावम अडे दाची दरमिआन अंडतराल (दिठां विंच)
बटर	रमट अडे पुडेगाव उंच्ची	0.03% जां 0.3 ग्रा/ली	0.1% जां 1 मिली लीटर पाणी	500	35
टामाटर	अगोती वुंगी अडे पिछेडी वुंगी	0.03% जां 0.3 ग्रा/ली	0.1% जां 1 मिली लीटर पाणी	500	5
चोना	बलमट अडे मीच बलाइट	0.03% जां 0.3 ग्रा/ली	0.1% जां 1 मिली लीटर पाणी	500	31
मंक्की	बलाइट अडे वुंदगर उंच्ची	0.03% जां 0.3 ग्रा/ली	0.1% जां 1 मिली लीटर पाणी	500	26
मिरच	अेंथ्रेक्नेज अडे पुडेगाव उंच्ची	0.03% जां 0.3 ग्रा/ली	0.1% जां 1 मिली लीटर पाणी	500	5

इमेजेमल दा निदेश: मेघम दी मधिडी – टहा वरछे अडे मीठ वरछे मेघम देठाग छिड़कावम ना करे; मॉल्टिल मधे जदे मिट्टी दिंच वरही नमी जेहे; झमलां दी अदमथा, इमेजेमल दा तरीका मडे समं, ऐपलरटह, ठेमल टाइप, घेल डिमगर वरठ घरे छिड़कावम अडे छिड़कावम दी मेंघिआ समेत मात्रिडी – ऐडपटर दी लेडीची मात्रठ मधे अडे दिमठ पाणी दी घेडी मिली मात्रठ नाल चंगी वुंगर मिलगेए। झमल 'ते मुकैलम छिड़कावम अडे मिहगेमि नीडे मठमगर पाणी दी घाली बसी मात्रठ चंगी तरां गिलगेए देठे होए मिलगे। जदे झमलां ऐप्लिट देंगे वाहे तेवां 'ते पुझगेठ ठेह ज़ां ऐम समे 'ते तेमीमे नां घेलही बेठ वरछे किमे इंसे चुवडें मधेमे नां किमे ठेठ चुवडें मधेमे नाल 1-2 छिड़कावम करे (तेवा दे पुक्रेप 'ते निठबड करदे टेठे, छिड़कावम दी दुहराणी); मुड़-दमछेठे दा ममं – जदों उड़ छिड़कावम दीमां चुंदा मुंग ना जाए ऐदों उड़ वेठ विंच ना जाणें। घाली डेबिआं दी मुड़ वरडें वरठा पडरठाग दे। इमेजेमल कीते वाहे घेवटों दी मुड़-वरडें ते तेवठ लही घाटठ नहीं छंडिआ जाणा चाहीदा अडे उंड़ वे रिठाणेआं दिआवे ते चुट चेंघ दिंठा जाणा चाहीदा दे।

सावधानीआं: इमेजेमल ते बाअद दुशिड़ कपड़े अडे सरीर दे हिंसिआं नुं धो लओ। इमेजेमल देठाग पुरे तेंकिआजमल कपड़े पहिरे (दसतानें, मास्क, वाले सम्मे, बूट आदि)। सारा नाल अंदर लेठ ते घरे, इमेजेमल देठाग कुझ खाणा पीणा, चबाएठा ना मिरगेटरेठी ना बनाने और छिड़कावम दा घेल बहाएठ लही खाना पकाएठ वाले बेंतन का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का उपयोग करें। कार्य समाप्त होने के बाद हाथों को साबुन और ढेर सारे पानी से धोइयें। घोल बनाने और छिड़काव करने के वक्त, त्वचा और आँख और कपड़ों को फफूदनाशक के सम्पर्क से बचायें। सान्द्रय पदार्थ अथवा छिड़काव मिश्रण से दूषित होने पर त्वचा को तुरन्त अच्छी तरह धोयें एवं आँखों को पर्याप्त मात्रा में पानी से 15 मिनट तक धोयें। प्रयोग के उपरान्त बचाव उपकरणों को अच्छी तरह से साफ करें। दूषित कपड़ों को पुनः उपयोग से पहले धोएं। इस उत्पाद का प्रयोग उन स्थानों पर वर्जित है जहाँ पर मछली पालन अथवा धान की खेती के साथ मछली पालन किया जाता हो। मछली के लिए विषाकारक है। सावधान: लेबल और पर्चा पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पौड़को पर न करें। 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्चों पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग कंटेनर (डिब्बों) को नष्ट कर दें।

लवण: विषबाधा के प्रभाव के लक्षण जैसे क्रियाशील कम होना, पुतली का फैलना, पावों को प्रत्याहार, कम फैलता हुआ रीफलेक्स, लम्बी सांसे लेना साँसों की गति धीमी होना हो सकती है।

प्राथमिक उपचार: 1. त्वचा संपर्क: प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। अन्त: श्वसन: प्रभावित व्यक्ति को दूषित जगह से हवादार क्मरे या खुली जगह में ले जाए और तापमान से बचाए। विषक्ता का संदेह होने पर: तुरन्त चिकित्सीय सलाह लें। नेत्र स्पर्श: पलकों को अलग पर आँखों को तुरत साफ़ाई वाले द्रव अथवा साफ पानी से अच्छी तरह धोए एवं तुरन्त चिकित्सक का परामर्श लें। निगल जाने पर: पानी की पर्याप्त मात्रा के साथ लगातार चिकित्सीय परामर्श लें। अधिक मात्रा में सान्द्र पदार्थ निगल जाने पर चिकित्सक की सलाह लें। सूचना: यदि मरीज बेहोश हो तो मुँह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

विषनाशक: कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटान: 1. छिड़काव के बाद खाली हुए डिब्बों को दुबारा प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है अत: पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बों, बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। 2. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकटों को वैसे ही बाहर नहीं छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है। 3. पैकटों/डिब्बों को तोड़/मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें: 1. फफूदनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर कमरों या इमारतों में अथवा अलग से ताला बन्द अलमारियों में रखना चाहिए। 2. फफूदनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारतों मजबूत, सूखी प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए ताकि वाश्प से प्रदूषण न हो सके।

रासायनिक संघटक:

एजोक्सिस्ट्रोबिन स.त.	:	18.20% भार/भार
डाइफेनोकोनाझोल स.त.	:	11.40% भार/भार
छितरक	:	%
नैफथेलीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम	:	1.22% भार/भार
सॉल्ट फारमालडिहाइड कन्डेन्सेट		
ब्लोककोपालीमर पीओ/ईओ	:	1.13% भार/भार
एंटिफोमिंग एजेंट	:	%
पॉलीडॉयमिथाइल सिलोक्सेन	:	0.79% भार/भार
सान्द्रित करने वाले तत्व	:	%
लिनीयर पोलिसैकोराइड	:	0.25: भार/भार
प्रीजरवेटीव	:	%
1, 2–बैंजिसोथायाजो–3 (2एच)–ओन	:	0.03% भार/भार
वैटर	:	%
सिटायल/स्टियरायल–अल्कोहल इथोक्सीलेटीडे	:	20.70% भार/भार
पानी	:	पर्याप्त मात्रा %
कुल	:	**100.0% भार/भार**

इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है। सावधानी: १. फसल कटाई के बाद के आवेदन के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। २. इस पत्रिका पर बताये गये अनुसार उपयोग के बाद कंटेनर (डिबों) को नष्ट कर दें। ३. निर्देश /खुराक पॉली हाऊस/सीमित क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उत्पाद खुले मैदान में उपयोग के लिए है।

Azaka® Duo

Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC

(Systemic Fungicide)

Purpose: For Agriculture Use

Azoxystrobin 18.2% w/w + Difenoconazole 11.4% w/w SC is a broad spectrum fungicide having systemic activity against major pathogens. It is recommended for the control of Anthracnose and powdery mildew of Chilli; early blight and late blight of Tomato, blast & sheath blight of Paddy; blight & downy mildew of Maize; Rust & Powdery Mildew of Wheat.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pests	Dosage/Ha A.I. (% conc. or ml/l)	Formulation	Dilution in Water (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Wheat	Rust & Powder mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml litre water	500	35
Tomato	Early blight & Late blight	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml litre water	500	5
Paddy	Blast & Sheath blight	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml litre water	500	31
Maize	Blight & Downy mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml litre water	500	26
Chilli	Anthraconse & Powdery mildew	0.03% or 0.3 g/l	0.1% or 1ml litre water	500	5

Direction of use: Weather condition – don't spray during windy and rainy weather; soil-spray when there is sufficient moisture in soil; crops stage, application technique & timing, equipment, nozzle type, instruction for mixing & frequency including number of sprays – measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with through agitation for total coverage of crop. Give 1-2 sprays (depending on disease pressure, repeat the spray) with knapsack or any other suitable sprayer having hollow cone or any other suitable nozzle at the time when crops are infested with above mentioned diseases; re-entry period-do not enter the field until spray droplets are dried. Dangerous to re-use empty containers. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use and shall be broken and buried away from habitation.

Precautions: Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing (hand gloves, mask, goggles, boots etc.) during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application. Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use sticks for stirring the spray solution. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. If contamination occurs with concentration or spray mixture, immediately wash skin thoroughly, flush eyes for atleast 15 minutes with abundant fresh water, remove contaminated clothing. After use, thoroughly clean protective equipment and wash entire body and change clothing. The product shall not be used in area where pisciculture/intercropping pisciculture is practiced along with rice cultivation. Product is toxic to fish.

Symptoms: Poisoning may cause symptoms of activity decrease, pupil dilation, moderate foot withdrawal, reduce splay reflex, increased breathing depth and reduced breath rate etc.

First Aid: Skin contact: Removed contaminated clothing and thoroughly was the affected parts of body with water by soap and water. Inhalation: Remove the affected person from the danger zone to well-ventilated room or to fresh air and protect from undercooling. In case of suspected poisoning: Seek medical advice immediately. Eye contact: Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for atleast 15 minutes. Obtain immediate medical attention. If swallowed: Repeatedly administer medical charcoal in plenty of water. Seek medical advice if a large volume of concentrate was ingested. Note: Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting.

Antidote: No specific antidote is known, apply symptomatic therapy.

Disposal of used container: 1. Dangerous to re-use empty containers hence, packages or surplus material and washings from the machine and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides. 2. The room or premises mean for storing the fungicide shall be well built, dry, well-lits, ventilated and of sufficient dimensions to prevent pollution with the vapors.

Chemical Composition:

Azoxystrobin a.i.	:	18.20% w/w
Difenoconazole a.i.	:	11.40% w/w
(Dispersant)	:	%
Napthalenesulfonic acid, sodium salt condensated with formaldehyde	:	1.22% w/w
Blockcopolymer PO/EO	:	1.13% w/w
(Antifoaming Agent)	:	%
Polydimethyl siloxane	:	0.79% w/w
(Thickner)	:	%
Linear polysaccharide	:	0.25% w/w
(Preservative)	:	%
1, 2-benzisothiazol-3 (2H)-one	:	0.03% w/w
Wetter	:	%
Cetyl/stearyl-alcohol ethoxilated	:	20.70% w/w
Water	:	Q.S. %
Total	:	**100% w/w**

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Warning: 1. Not to be used for Post-Harvest application. 2. Destroy the container after use as directed on Leaflet. 3. Directions/dosage not relevant for poly houses/confined area as product is meant for use in open field.

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

READ INSTRUCTION BEFORE USE.
उपयोग से पहले सूचना पत्रिका पढ़े।

Azaka® Duo

Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC

(Systemic Fungicide)

Purpose: For Agriculture Use

Marketed by : *FMC India Private Limited, Registered Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India.

विपणनकार्ता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफीस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी–५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

Customer Cell
✆ : **1800 102 6545** or
✉: **Ask@fmc.com** or write at *FMC India address.

Manufactured by : BR Agrotech Limited
Regd. Office : 1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008
निर्माता : **बी आर एग्रोटेक लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली ११० ००८, इंडिया

See first letter of batch number for manufacturing unit address.

K: Industrial Area, SIDCO, Kathua 184 102 Jammu and Kashmir, India
Mfg. Lic. No. **J/M-Pvt/18**

P: Plot no. 620/3, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, District-Bharuch, Gujarat 394 115
Mfg. Lic. No.: **GJ-BHA-01043**

क: इण्डस्ट्रियल एरिया, सिडको, कठुआ १८४ १०२ जम्मू एण्ड कश्मीर, इंडिया
मैन्यु. ला. नं.: **J/M-Pvt/18**

प: प्लोट नं. ६२०/३, जी आई डी सी एस्टेट पनोली, अंकलेश