

**READ LEAFLET BEFORE USE.** / उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें. / استعمال کرنے سے پہلے ہدایات کی اس میں ضروریات پڑھیں. / वापरकर्ता पढ़ें। संलग्न परिपत्र वाचो. / वापरण्यापूर्वी जोडलेली लिफलेट वाचा. / ಇದರಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ. / ব্যবহারের আগে পড়ুন। সংশ্লিষ্ট পত্রিকা পড়ুন। / ব্যবহারের আগে পড়ুন। সংশ্লিষ্ট পত্রিকা পড়ুন। / ব্যবহারের আগে पढ़ें। संलग्न परिपत्र वाचो. / वापरण्यापूर्वी जोडलेली लिफलेट वाचा. / ಇದರಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ. / ব্যবহারের আগে পড়ুন। সংশ্লিষ্ট পত্রিকা পড়ুন.

**CENTAURUS®**

**TEBUCONAZOLE 6.7% + CAPTAN 26.9% WW SC Systemic Fungicide - PURPOSE: FOR AGRICULTURE USE**

**Chemical Composition:** Tebuconazole a.i. : 6.7 % w/w, Captan a.i. : 26.9 % w/w, Polyary phenyl ether phosphate : 2.1 % w/w, Sodium Naphthalene formaldehyde condensate : 1.00 % w/w, Modified-dimethyl polysiloxane : 0.6 % w/w, Propylene glycol : 5.9 % w/w, Xanthan gum : 0.25 % w/w, Water : Q.S. % Total : 100.00 % w/w. **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. The required quantity of ready mix chemical tebuconazole 6.7% + captan 26.9% w/w SC needs to be diluted in water and sprayed by using knapsack sprayer foot sprayer filled with hollow cone nozzle with spray volume @ 500litra for chilli and 10 litree for Apple. **Time of application:** To be applied preventively and to be repeated at 15 days interval depending upon prevailing weather condition and disease pressure. **Application techniques:** Foliar application with the help of knapsack sprayer foot sprayer. **Instruction for mixing:** Thoroughly mix the recommended quantity of Tebuconazole 6.7% + Captan 26.9% w/w SC into the water volume recommended for unit area. **Stage for application:** Vegetative stage and at the time of appearance of disease. **Plant protection equipment:** Knapsack sprayer/foot sprayer fitted with hollow cone nozzle. **Nozzle type:** Hollow cone nozzle. **Dosage:** please refer the above table. **Pre-harvest interval:** Please refer the above table. **Weather conditions:** Do not spray during windy conditions. **Soil:** Light to heavy soil. **Dosage:** chilli - 1000ml/ha diluted in 500 liter of water apple - 1500 ml/ha (powdery mildew, alternaria leaf spot/blight) and 0.25% or 2.5 ml/l water for scab diluted in 100 litree. **Pre Harvesting Period:** chilli - 5 days apple - 10 days **Re-Entry - Precautions:** During spraying wear suitable respiratory equipment wash clothing before re-using wash hands thoroughly after handling wear protective clothing like suitable gloves. Chemical resistant boots. Chemical goggles or safety glasses spray only in the wind-blowing direction only not against so as to prevent the settling drifts on body. Do not eat, drink chew or smoke or handle food while spraying. Avoid contact with skin and eyes. **Antidote:** No specific antidote leaf symptomatically. **First Aid:** Please read enclosed leaflet before use. Symptoms Weakness, fatigue, dysphasia, blurred vision irritation of eyes, skin and upper respiratory system dermatitis skin sensitization, diarrhea, vomiting and conjunctivitis. **Recommendations:** Tebuconazole 6.7% + Captan 26.9% w/w SC is a suspension concentration containing Tebuconazole 6.7% (a.i.) and Captan 26.9% (a.i.) in the formulation. It is used for the control of powdery mildew, Alternaria leaf spot/blight and scab on Apple, powdery mildew and anthracnose on Chilli. **CAUTION:** It should not be used in the areas where pisciculture aquaculture is practiced. **WARNING:** 1. Not to be used on crops other than mentioned on label & leaflets. 2. Not to be used for post harvest application. 3. Destroy container after use as directed on label.

**सेन्टोरस™**

**टेबुकोनाजोल 6.7% + केपटान 26.9% एस.सी अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक - उद्देश्य: कृषि उपयोग के लिए**

**रासायनिक संरचना:** टेबुकोनाजोल स.त. ६.७% भा./भा., केपटान स.त. २६.९% भा./भा., पोलिआर्याइल फिनानल इथर फोस्फेट, २.१% भा./भा., सोडियम नेफथालीन फोर्मलडीहाइड कंडेन्सेट, १.००% भा./भा., मोडिफाइड-डिमिथिल पॉलिसिलॉक्सान, ०.६% भा./भा., प्रोपिलेन ग्लायकोल, ५.९% भा./भा., जेन्थान गुम - ०.२५% भा./भा., जल - प्रतिशत मात्रा १००.००% भा./भा.। **उपयोग:** टेबुकोनाजोल ६.७% + केपटान २६.९% एस.सी. एका संयुक्त रूप में प्रयोग करने के लिए है। इसे फफूंदीनाशक के नियंत्रण के लिए मिश्रित, टेबुकोनाजोल ६.७% (स.त.) + केपटान २६.९% (स.त.) शामिल है। यह रोगों में रोकथाम के लिए और रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। **उपयोग के लिए निर्देश:** टेबुकोनाजोल ६.७% + केपटान २६.९% एस.सी. की सहायता के साथ फोलियर स्प्रे करें। **निष्पन्न के लिए निर्देश:** अर्द्धावधि के लिए टेबुकोनाजोल ६.७% + केपटान २६.९% एस.सी. की सिफारिश की गई मात्रा को अच्छी तरह से पानी की मात्रा में घुलाने दें। **इस्तेमाल के लिए धरणा:** धनसहित धरणा और रोग की उपस्थिति के समय। **पौध सुरक्षा उपकरण:** नैसर्गिक रक्षक और होलोनो-जोल के साथ। **नोजल टाइप:** खोकला कोन नोजल। **मौसम की स्थिति:** तेज हवा की स्थिति के दौरान ड्रिफ्टिंग कम करें। **मिट्टी:** हल्की से भारी मिट्टी। **खुराक:** मिश्रित: १००० मिली / हेक्टर ५०० लीटर पानी में घोलकर। **संयुक्त:** १५०० मिली / हे. (सूची आसिता फर्मा, एस्टेरोसिया पार्क धरणा) - और ०.२५ या २.५ मि.ली./लीटर पानी में (पानी) १० लीटर / घेड पानी में घोल कर। **पीएआइ:** मिश्रित - ५ दिनों से - ५ दिनों **पुनः प्रयोग:** **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** छिड़काव के दौरान उपयुक्त स्वस्थ उपकरण पहने बिना इसे उपयोग करने से पहले कपड़े धो लें। **इस्तेमाल के बाद हाथ अच्छी तरह से धो लें।** सुरक्षात्मक कपड़े जैसे उभयवर्ती दस्ताने, रसायन प्रतिरोधी चुनौ, रसायन प्रतिरोधी चर्म या सुरक्षा चर्म पहनें। केवल हवा की बहाली दिखाई दे रही है। विपत्ति नहीं। **ताकिए शरीर पर झोके लगने से रोकें।** जलाने से रोकें। **प्रथमिक चिकित्सा:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **लक्षण:** कमजोरी, थकान, रसायन, घुंघुला दिखना, आंखों में जलन, ल्वहा और उपरी रसायन प्रणाली, जिल्द की सूजन, ल्वहा सम्बन्धीकण, दस्त, उल्टी और अंग अंग। **सावधान:** उन क्षेत्रों में **इस्का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जहां मछली पालन / एकाकलपर प्रचलित है।** **धेतानी:** १. लेबल और पूर्ण पत्र **अलिखित न होने की स्थिति में इस्का प्रयोग फसल पार न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग न करें। ३. पत्तों पर निर्यत उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (खिचो) को नष्ट कर दें।**




**Centaurus®**  
**FUNGICIDE**



**1 Litre**

Keep out of reach of children. Away from heat, dry place away from diamond or open flame.



बच्चों की पहुँच से दूर रखें। सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ گرمی یا کھلی آگ سے دور رکھیں۔ خشک جگہ پر رکھیں۔

Regn. No. } CIR-183883/2021-TEBUCONAZOLE +  
रजि. नं. } CAPTAN (SC) (28)-1696

Manufactured by : BR AGROTECH LTD.  
Regd. Office: 1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008

See first letter of Batch No. for manufacturing unit address.

**K :** Industrial Area, SIDCO, Kathua-184102 (J&K)  
**Mg. Lic. No.:** J/M-Pvt/18  
**P :** Plot No. 620/3, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat-394115  
**Mg. Lic. No.:** GJ-BHA-01043  
**उत्पादक:** बी.आर. एग्रोटेक लिमिटेड, पत्तोली कृषि मार्ग, १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-११०००८  
**क :** इण्डियन इंडस्ट्रियल एरिया, सिडको, कठुआ-१८४१०२ (जे. एण्ड के.)  
**उत्पा. लाई. नं.:** J/M-Pvt/18  
**प :** प्लॉट नं. ६२०/३, जी.आई.डी.सी. एस्टेट पनोली, अंकलेश्वर डि. भरुच, गुजरात-३९४११५  
**उत्पा. लाई. नं.:** GJ-BHA-01043

**Net Content : 1 Litre**  
**शुद्ध मात्रा :**

Batch No. : Mfg. Date : Exp. Date : Max. Retail Price ₹ (Incl. of all taxes) :  
बैच नं. : उत्पादन तिथि : अंत्य तिथि : अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) :



**MARKETED BY: \*FMC India Private Limited, Registered Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India.**

**विपणनकारता: एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस: टीसीसी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी-५३, बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.**

**Customer Cell ☎ : 1800 102 6545 or ✉: Ask@fmc.com or write at \*FMC India address.**

FMC, the FMC logo and CENTAURUS and the bee are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2022 FMC Corporation. All rights reserved