लेवाना™
थायोमेथाक्साम २५% डब्ल्यु.जी.
(तीव्रअसर करणार आंतरप्रवाही कीटनाशक)
हेतू: कृषि वापरासाठी

थायोमेथोक्साम २५% डब्ल्यु.जी. एक अत्यंत उपयोगी अंतर प्रवाही कीटनाशक आहे, धान्याचा खोड कीडा, मीज माशी पाने गुंडाळणारी अळी, भुरा रंगाचा तुडतुडा, पांढरा तुडतुडा, हिरव्या पानावरचं तुडतुडा, गोल आळ्या धान्याचा हिरवा, तुडतुडा, धान्यावरचा घाणेरका कीडा तसेच तरकारी मकी आणि कापसाच्या पीकावरील मावा, तुडतुडा चुरदा तसेच पांढऱ्या माशा तुडतुडा, अंबावरील ढोपर, गहुच्या माहू, वंगीच्या माहू आणि तेळा, सरसवचे माहू, टॉमाटोचे फळी माशी, चा मावर कीट, बटाटाचे माहू आणि सिट्रुचे सिल्ला रोग साठी या कीटनाशकाचा उपयोग करण्यांत येतो, उत्पादनाच्या प्रत्येक किलो मागे २५० ग्राम थायोमेथोक्साम उपयुक्त आहे.

उपयोग : धान्य तसेच कापसावर खाली दिलेल्या कीडयाच्या निर्यंत्रणासाठी याचा उपयोग करचा.

वापराच्या पद्धति :

पीक	किडयाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर प्रमाण ए.आय. (ग्राम)	फार्मूलेशन तयार औषध (ग्राम)	पाण्याचे मिश्रण (ली.)	शेवटची फवारणी व कीणणीतील अन्तर (दिवस)
धान	खोड किडा मिज माशी पान गुंडाळणारी अळी भूरे तुडतुडे पांढरे तुडतुडे हिरवे तुडतुडे फुलकिडे	25	100	500-750	14
कापूस	तेळा, माहो फुलकिडे, पांढरी माशी	25 50	100 200	500-750 500-750	21 21
भेंडी	मावा, तुडतुडे पांढरी माशी	25	100	500-750	21
अंबा	तुडतुडे	25	100	1000	30
गहु	मावा	12.5	50	500	21
मोहरी	मावा	12.5-25	50-100	500-1000	21
टॉमाटो	पांढरी माशी	50	200	500	5
बैंगन	पांढरी माशी	50	200	500	5
चहा	चा चा मच्छर (हेलोपेल्टिस थियोवोरा)	25	100	400-500	7
मातीचे	माहू	50	200	400-500	77
लिंबु	सिल्ला	25	100	1000	20
टॉमाटो (भूमि उपचार)	पांढरी माशी	50	200	500	5
जीरा	माहू	25	100	500	15

उपयोगसाठी सूचना : कीटनाशक आवश्यक तेवढे मोजुन प्रथम शेंडया पाण्यांत मिसळा, त्यानंतर उरलेल्या प्रमाणांत पाणी मिसळून चांगले हालवा आणि शिडकाव करणाऱ्या यंत्रा द्वारे संपूर्ण पिकावर शिंपडाव करा.

वापरणाऱ्याची घ्यावयाची काळजी :
१. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर राखुन.
२. श्वासो-श्वास वाटे धूळ नये त्वचावर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये.
३. नेहमी हावेच्या दिशेने ही शिडकाव करा. हावेच्या विरुद्ध दिशेने शिडकाव करु नये. कारण फवाचाचे शिंतोडे आपल्या अंगावर उडू नये.
४. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा.
५. प्रयोग करतेवेळी खाणे, पिणे धूम्रपान करण तथा पान चबळणे इत्यादी करू नये.
६. शिड्कावा करते वेळी सुरक्षा साधन कपडे घाळावे.

विषबाधेची लक्षणे : शरीर शिथील होते, झटके येतात आणि पुटोसिस होण्याची शक्यता आहे.

प्रथमोपचाराचे उपाय :
१. गिळले गेल्यास घशात बोटे घालून उलटी काढा होत जो पर्यंत गिळले गेलेले संपूर्ण द्रव्य बाहेर येत नाहीं.
२. जर शरीरावर पडल्यास खूप पाण्याने धुवावे.
३. भरपूर ताजे पाणी वापरून डोळे १०-१५ मिनिट सुधी हबके मारून धुवा.
४. जर श्वासनात, गेल्यास, रोग्याला मोकळ्या हवेत न्या.

निवारक उपाय : लक्षणानुसार आणि मदत होईल असा उपचार करा.

डबे खोवांची विल्हेवाट :
१. पॅकेजिस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्रकारे आणि पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घेऊन करावी.
१. रिकामी पॅकेजिस फाडून-तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.
३. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघडचावर ठेवु नयेत.

सांठवण :
१. कीटनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत.
२. कीटनाशकच्या साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायणिक मिश्रण :

थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व	२५.००० % व/व
डिस्पेरसिंग एजेंट सोडियम लिग्नोसल्फेट	५.००० % व/व
वेटिंग एजेन्ट सोडियम लॉरिल सल्फोनेट	३.७५० % व/व
प्लास्टिसाइजर ब्युटीलेटेड पॉलीविनायल पायरीलिडॉन	१.२५० % व/व
कॅरियर-डायटोमेशिअस अर्थ	५.००० % व/व
बाइन्डर-कॉन स्टार्च	पर्याप्त मात्रा % व/व
एकूण	१००.००० % व/व

हा लेबलमधील/पत्रिकामधील निर्देशित पिकांच्या अतिरिक्त अन्य पिकांच्या साठी उपयोग प्रतिबंधित आहे.

लेवाना™
थायॉमीथॉक्ज़ाम २५% ऽब्ल्यु ज़ी
(तीव्र असर धरावतुं अंतरप्रवाही जंतुनाशक)
हेतुः कृषिजन्य उपयोग माटे

थायॉमीथॉक्ज़ाम २५% ऽब्ल्यु.ज़ी. जठर अने स्पर्शजन्य असर धरावतुं अंतरप्रवाही जंतुनाशक छे अने तेनी भलामण गाभधारनी ઇथण, जांडधाया माथी, पानचाणती ઇथण, लूभरा, सुंडिचाय, सफेद पीठ धरावता थूंसिया, लीधडी पानचाणती ઇथण, छिप्प जेवी चोषनारं थती जीवातोनां नियंत्रण माटे तेम ज कपासमां थती मोलोमशी, लीलां थूंसिया, छिप्प अने सफेदमाथी. आंबानुं ढोपर., गहुनुं माहु, रींगणनुं माहु अने तेला. सरसवनुं माहु, टमाटरनुं सफेद माथी, चानुं मछर कीट, बटाटानुं माहु, नींबुनुं छिलल्या रोगना नियंत्रण माटे तेम ज कपासमां थती मोलोमशी, लीलां थूंसिया, छिप्प अने सफेदमाथीना नियंत्रण माटे कराय छे. ते એક किलो ઉત્પાદનमां (ऽब्ल्यु/ऽब्ल्यु) २५० ग्राम थायॉमीथॉक्ज़ाम सक्रिय घटक तरीके धरावे छे.

हेक्टरी ढीठ प्रमाण

पाक	कीडनुं सामान्य नाम	स.त. (ग्रा.)	संयोजन (ग्रा.)	पाणीमां सॉम्प्लीक्टरल (लीटर)	छेल्लां छंटकए अने पाक उतरवाना दिवसो वच्चेनो प्रतीक्षागाळो (दिवस)
चोषा	गाभरामारनी ઇथण गाडिया माथी पानचाणती ઇथण ब्राउन तीतीधोड़ा (બીપીએમ) सफेद पीठ धरावता तीतीधोड़ा (ऽब्ल्यु.पी.એમ.) लीली पानचाणती ઇथण छिप्प	२५	१००	५००-७५०	१४
कपास	लीली थूंसिया मोलोमशी छिप्प सफेद माथी	२५	१००	५००-७५०	२१
भेंडी	माहु, तेळा सफेद माथी	५०	२००	५००-७५०	२१
आंबा	ढोपर	२५	१००	१०००	३०
गहु	माहु	१२.५	५०	५००	२१
सरसव	माहु	१२.५-२५	५०-१००	५००-१०००	२१
टोमाटो	सफेद माथी	५०	२००	५००	५
रींगण	सफेद माथी, तेळा	५०	२००	५००	३
पांडडा पर रसे					
चा	चा ना माछर कीट (हेलोपेल्टिस थियोवोरा)	२५	१००	४००-५००	७
बटाट	माहु (मायझस पेरसिक)	२५	१००	५००	७७
टोमाटो (भूमि उपचार)	सफेद माथी	५०	२००	५००	५
लींबु	सिल्ला	२५	१००	१०००	२०
जुस	माहु	२५	१००	५००	१५

पपराश माटेना सूचनो : ઉત્પાદનની જોઈતી માત્રા માખી લઈ તેને થોડા પાણીમાં ભેળવો. બાકી રહેલું પાણી દર્શાવ્યા મુજબ બરોબર હલાવી ઉમેરો જેથી યોગ્ય સ્પ્રેયર દ્વારા સંપૂર્ણ પાક પર છંટકાવ કરી શકાય.

वापनार माटे सावचेती:
१ ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો.
२ મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો.
३ છંટકાવના શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો.
४ છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ લેવા.
५ છાંટણા વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો.
६ વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ.

ઝેર ચઢવાના લક્ષણો : ઝેરની અસર થવાથી સ્વર્ય સ્ફૂરિત હલનચલનમાં ઘટાડો થવો, આચકી આવવી અને પ્ટોસિસ.

प्राथमिक चिकित्सा:
१. ગળાની પાછળ ગલીપચી કરીને ઉલ્ટી કરાવો. જ્યાં સુધી સાફ ઉલ્ટી ના થાય, એમ થાલુ રાખો
२. પ્રભાવિત ચામડી અને કપડાંનું પાણીથી ધુઓ.
३. આંખોમાં જાય તો ચોખ્ખા વધારે માત્રામાં સેલાઇન/પાણીથી ૧૦-૧૫ મિનિટ સુધી ધૂઓ.
४. શ્વાસમાં ગઈ હોય તો દરદીને ખુલ્લી હવામાં લઈ જાવ.

विषनाशक : કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

खाली ડબ્બાઓનો નિકાલ:
१. ખાલી ડબ્બાઓને તોડીને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ.
२. ખાલી ડબ્બાઓનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે એમને બહાર ન ફેંકશો.
३. વધેલા ફુદાનાશકો તથા મશીન વગેરેની સફાઈ કરેલા પાણીને એ રીતે નિકાલ કરો કે વાતાવરણ અને જળ પ્રદૂષિત ના થાય.

સગ્રહ:
१. કીટનાશકના ડબ્બાનો સંગ્રહ, જુદા ઓરડા કે સ્થાનમાં, અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો રાખવાનાં ઓરડાથી દૂર કરવો જોઈએ. કે કીટનાશકનું પ્રમાણ અને પ્રકાર પ્રમાણે ડબ્બાઓને અલગ કબાટમાં તાળાચાવીમાં બંધ કરીને રાખો.
२. કીટનાશકનો સંગ્રહ ઓરડા કે સ્થાન હવા-ઉજાસવાળા, મજબૂત અને પૂરતા લંબાઈ પહોળાઇવાળો હોવો જોઇએ, જેનાથી બાધ્ય પ્રદૂષણ ન થાય.

साम्रग्री :

થાયૉમીથોક્ઝામ સ.ઘ.	२५.००० % વ/વ
ડિસ્પેરસિંગ એજેન્ટ - સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફો	५.००० % વ/વ
વેટિંગ એજેન્ટ-સોડિયમ લાઉરિસ સલ્ફેટ	३.७५० % વ/વ
પ્લાસ્ટિકાઈઝર - બુટિલેટેડ પોલિવિનાઇલ પાઇરોલિડોન	१.२५० % વ/વ
કેરિઅર-ડાયાટોમેકિયરા એર્થ	५.००० % વ/વ
બાઈન્ડર-કોર્ન સ્ટાર્ચ	પૂરતાં પ્રમાણમાં % વ/વ
કુલ	१००.००० % વ/વ

આ લેબલ/લીફલેટ પર જણાવાયા છે, તે સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ કરવો નહીં.

लेव्हाना™
थायामेथोक्साम 25% डब्ल्यू जी
(बहुपयोगी अंतरप्रवाही कीटनाशक)
प्रयोजन: कृषि उपयोग हेतु।

थायामेथोक्साम 25 डब्ल्यू जी एक अंतर्प्रवाही कीटनाशक है जो तीव्र उदरीय तथा सस्पर्शी क्रियाशीलता रखता है तथा इसकी सिफारिश धान की फसल पर लगने वाले तना छेदक, माजू मक्खी, पत्ता मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पीठा टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, चुरदा, कपास में माहू, तेला, सफेद मक्खी, आम में टिड्डों, गेहूँ में माहू, बैंगन में सफेद मक्खी व तेला, सरसों में माहू, भिंडी में माहू व तेला, टमाटर में सफेद मक्खी, चाय में मच्छर कीट तथा आलू में माहू, नींबू में सिल्ला तथा जीरा में माहू की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसमें उत्पादन के प्रति किलो (व/व) में 250 ग्राम थायोमेथोक्साम सक्रिय तत्व के रूप में किया जाता है।

उपयोग

फसल	कीटों के नाम	प्रति हेक्टर मात्रा स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
धान	तना छेदक, माजू मक्खी, पत्ती मोड़क भूरा पत्ती टिड्डा सफेद पीठा टिड्डा हरा पत्ती टिड्डा, चुरदा	25	100	500–750	14
कपास	माहो, तेला सफेद मक्खी	25 50	100 200	500–750 500	21 21
भिंडी	माहो, तेला चिंटी मंखी	25 50	100 100	500–1000 500	5 5
आम	टिड्डों	25	100	1000	30
गेहूँ	माहो	12.5	50	500	21
सरसों	माहो	12.5–25	50–100	500–1000	21
टमाटर	सफेद मक्खी	50	200	500	5
बैंगन	सफेद मक्खी, तेला	50	200	500	3
चाय	चाय का मच्छर कीट	25	100	400–500	7
आलू	माहो	25	100	500	77
नींबू	सिल्ला	25	100	1000	20
टमाटर (भूमि उपचार)	सफेद मक्खी	100	400	500	5
जीरा	माहो	25	100	500	15

उपयोग के लिये निर्देश : कीटनाशक की आवश्यक मात्रा को माप कर पहले थोड़े से पानी में मिलाएं। उसके बाद पानी की निर्धारित मात्रा मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल लें तथा किसी उपयुक्त स्प्रेयर की मदद से पूरी फसल पर छिड़काव करें।
उपयोग में आने वाले यंत्र : नैपसेक स्प्रेयर, फ्रूट स्प्रेयर, काम्प्रेशन नैपसेक स्प्रेयर, काम्प्रेशन नैपसेक बैटरी स्प्रेयर, बैटरी से चलने वाला पावर स्प्रेयर और एस.पी.ई-एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां :
1. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
2. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें।
3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना-पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : शरीर में ढीलापन, झटके (मिर्गी), पुटोसिस हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा :
1. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।
2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाये तो दूषित कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
3. यदि आंखे दूषित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10–15 मिनट तक धोएं।
4. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :
1. पर्यावरण तथा पानी का प्रदूषण बचाने के लिए डिब्बे, बचा हुआ घोल/पदार्थ, मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें।
2. उपयोग किए गए डिब्बो/पैकेजों को बाहर न छोड़ें। इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है।
3. पैकेजो/डिब्बों को तोड़-मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें :
1. कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के समान के संग्रहण के लिए प्रयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से तालाबंद अलमारियों में कीटनाशक की प्रकृति और मात्रा के आधार पर रखना चाहिए।
2. कीटनाशकों के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारतें मजबूत, सूखी, भलीभाँति प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प न हो सके।

रासायनिक संरचना :

थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व	25.000% भार/भार
डिसपेरसिंग एजेन्ट-सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	5.000% भार/भार
वेटिंग एजेन्ट-सोडियम लॉरिल सल्फेट	3.750% भार/भार
प्लास्टिसायजर – ब्यूटीलेटेड पॉली विनाइल पायरोलिडॉन	1.250% भार/भार
संवाहक डायओमेशिअस अर्थ	5.000% भार/भार
बाईन्डर कॉर्न स्टार्च	क्यू. एस % भार/भार
योग	100.000% भार/भार

इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

LEVANA®
Thiamethoxam 25% WG
(Broad spectrum Insecticide)
Purpose: For Agriculture Use

Thiamethoxam 25% WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact action and is recommended for the use to control Stem Borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BHP), white Backed Plant Hopper (WBPH), Green Leaf Hopper (GLH), Thrips, in rice; jassids, aphids, and whiteflies in cotton; hoppers in mango; aphids in Wheat; aphids and jassids in Okra, aphids in Mustard, whiteflies in tomato; whiteflies, jassids in Brinjal; mosquito bug in Tea, aphids in Potato, psylla in Citrus and aphid in Cumin. It contains 250 Thiamethoxam as an active ingredient in a kg of the product (w/w).

Recommendation :

Crop(s)	Common name of Pest	A.I. (gm.)	Dosage /Ha Formulation (gm)	Dilution in (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Rice	Stem borer Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BPH), White backed Plant Hopper (WBPH), Green Leaf Hopper, Thrips.	25	100	500-750	14
Cotton	Jassids, Aphids	25	100	500-750	21
	Whiteflies	50	200	500-750	21
Mango	Hoppers	25	100	1000	30
Wheat	Aphids	12.5	50	500	21
Potato	Aphid	25	100	500	77
Tomato	Whiteflies,	50	200	500	5
Tea	Mosquito bug Helopeltis theivora.	25	100	400-500	7
Citrus	Psylla	25	100	1000	20
Brinjal	Whiteflies, Jassids	50	200	500	3
Okra	Jassids, Aphids	25	100	500-1000	5
Mustard	Aphid	12.50-25	50-100	500-1000	21
Tomato Soil drenching	Whiteflies	100	400	500	5
Cumin	Aphid	25	100	500	15

Direction Of use :
Measure out requred quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.
P.P. Equipment : Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, Compression Knapsack battery sprayer, Battery operated kpower sprayer and ASPEE-HTP power sprayer..

Precaution
1. Keep away from foodstuffs, empty food stuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning
Decrease spontaneous movement, tonic conulsion, ptosis may occur.

FirstAid
1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaiminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote :
No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container :
1. Packages or surplus materials and washing form machines and containers should be dispose off in a safe manner as to prevent environment and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. Packages shall be broken and burried away from habitation.

Storage Conditions :
1. The packages containin the insecticide should be stored in orignal containers inseparate room or premises away from rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
2. The room or premises menat for storing the insecticide shall be built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition

Thiamethoxam a.i.	25.000% w/w
Dispersing Agent-sodium Lignosulphate	5.000% w/w
Weting Agent - Sodium Lauryl Sulphate	3.750% w/w
Plasticiser - Butylated Polyvinyl Pyrrolidine	1.250% w/w
Carrier Diatomaceous earth	5.000% w/w
Binder Corn Starch	Q.S. % w/w
Total	100.000% w/w

NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET

PLEASE READ ENCLOSED LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE.

कृपया उपयोग से पहले ध्यान से संलग्न पत्रिका पढ़े।

LEVANA®
Thiamethoxam 25% WG
(Broad spectrum Insecticide)
Purpose: For Agriculture Use

लेवाना™
थायामेथोक्साम 25% डब्ल्यू जी
(बहुपयोगी अंतरप्रवाही कीटनाशक)
प्रयोजन: कृषि उपयोग हेतु।

MARKETED BY: *FMC India Private Limited TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India.

विपणनकार्ता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी–५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

Customer Cell ✆ : **1800 102 6545** or ✉: **Ask@fmc.com** or write at *FMC India address.

Manufactured by : BR Agrotech Limited
Regd. Office : 1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008
निर्माता : **बी आर एग्रोटेक लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली ११० ००८, इंडिया

See first letter of batch number for manufacturing unit address.

K: Industrial Area, SIDCO, Kathua 184 102 Jammu and Kashmir, India
Mfg. Lic. No. **J/M-Pvt/18**

P: Plot no. 620/3, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, District-Bharuch, Gujarat 394 115
Mfg. Lic. No.: **GJ-BHA-01043**

क: इण्डस्ट्रियल एरिया, सिडको, कठुआ १८४ १०२ जम्मू एण्ड कश्मीर, इंडिया
मैन्यु. ला. नं.: **J/M-Pvt/18**

प: प्लोट नं. ६२०/३, जी आई डी सी एस्टेट पनोली, अंकलेश्वर, जिला – भरूच, गुजरात ३९४ ११५
मैन्यु. ला. नं.: **GJ-BHA-01043**

Caution :
"Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet".

FMC, the FMC logo and LEVANA, लेवाना, लेव्हाना, लेवाना, लेवाना, लेवाना, लेवाना, लेवाना and لاوانه **are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.**
©2022 FMC Corporation. All rights reserved

லேவானா™
தையோமிதாக்ஜம் 25% டப்ல்யு.ஜி.
(விஸ்தீர்ண வ்யாப்தி வர்மாள்ள கீடநாசினி)
ப்ரதான உத்தேச்யங்கள் : வ்யவஸாயரங்களில் உபயோகம் நிமித்தம்

தையோமிதாக்ஜம் 25% டப்ல்யு.ஜி. விபிற ரகமுள்ள வர்மாள்ள கீடநாசினி. இது ஸுலபு வ்யாபாரங்கள் மற்றும் செடிகளில்லிருக்கிற பொருட்களிலுள்ள செடிகளுடன் ஸம்பந்தமுள்ளது. இது காண்டகம் தொடர்பாகுவுக்கு, கத்திரிக்கா, ஆகுமுள்ள, தீமுள்ளோ (டி.பி.எச்.). கோது தீமுள்ளோ (ஆப்.டி.பி.எச்.) பருப்தீமுள (ஆப்.பி.எச்.) பருப்பீமுள (ஆப்.பி.எச்.) பருப்பீமுள (ஆப்.பி.எச்.) பருப்ப