READ LEAFLET BEFORE USE. / उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें. / વાપરતાં પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો./ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਫਲੇਟ ਕਾਢ./ ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕರಪತ್ರ ಓದಿರಿ. / அமைப்பு ஸ்மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை படிக்கவும்.

NUROCOMBI®

Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC

(Insecticide) PURPOSE: FOR AGRICUTURE USE

Chemical Composition : Chlorpyriphos a.i. (Min. purity 94%) : 50.00% w/w, Cypermethrin a.i. (Min. purity 92%) : 5.00% w/w, Emulsifier A : (A blend of Calcium salt of alkyl benzene sulfonic acid and polyethanoxy ether of Nonylphenol) : 5.60% w/w, Emulsifier B : (A blend of Calcium salt of alkyl benzene sulfonic acid and polyethanoxy propoxy ether of fatty alcohol) : 2.40% w/w, Aromatic Hydrocarbon (Aromex) Q.S.%, **Total : 100.000% w/w. Direction of Use :** Please read the enclosed leaflet before use. **Dosage :** Please read the enclosed leaflet. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given for allergic manifestation. **First Aid :** Please read the enclosed leaflet. **Symptoms of Poisoning :** Please read the enclosed leaflet. **Recommendation :** Chlorpyriphos a.i. 50% + Cypermethrin a.i. 5% EC is an insecticide which is used for the control of American Bollworm, Spotted Bollworm, Pink Bollworm, Spodoptera litura and sucking insect and pests like Aphid, Jassid, Thrips and Whitefly. **Caution : 1. Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. 2. Do not use in those situation if there is a possibility of harming bees and fish, live-stock, game, wild birds and animals.**

न्यूरोकॉम्बी™

क्लोरपायरिफॉस 50% + सायपरमेथ्रीन 5% ईसी

(कीटनाशक) उद्देश्य: कृषि उपयोग के लिए

रासायनिक संरचना: क्लोरपायरिफॉस स.त. (न्यूनतम शुद्धता 94%) : 50.00% भार/भार, सायपरमेथ्रीन स.त. (न्यूनतम शुद्धता 92%) : 5.00% भार/भार, इमल्सीफायर A : (कॅल्शियम सॉल्ट एलकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड नोनाइलफिनोल के पोलीइथोनोक्सी इथर का मिश्रण) : 5.60% भार/भार, इमल्सीफायर B : (एलकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का कॅल्शियम सॉल्ट के फैटी एल्कोहोल के पोलीइथोनोक्सी प्रोपोक्सी इथर का मिश्रण) : 2.40% भार/भार, एरोमेटिक हाईड्रोकार्बन (एरोमेक्स) : पर्याप्त मात्रा %, **योग : 100.000% भार/भार। उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **मात्रा:** कृपया संलग्न निर्देश पत्रिका पढ़े। **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियां:** 1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचाये। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह से धोएं। 5. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। 6. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** 1. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी 2 से 4 मिग्रा. तक की खुराक 5 से 10 मिनट के अंतराल पर अन्तःशिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक 25 से 50 मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती है। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है। 2. 1 से 2 ग्राम 2 पी.ए.एम. 10 मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्तःशिरा द्वारा बहुत धीरे–धीरे 10 से 15 मिनट में देना चाहिए। 3. एलर्जी के लिए एन्टीहिस्टेमिन्स दिये जा सकते है। **प्राथमिक चिकित्सा:** कृपया संलग्न निर्देश पत्रिका पढ़े। **विष के लक्षण:** कृपया संलग्न निर्देश पत्रिका पढ़े। **उपयोग:** क्लोरपायरिफॉस स.त. 50% + सायपरमेथ्रीन स.त. 5% ई.सी, कीटनाशक अमेरिकन डोंडे की सूंडी, चित्तीदार डोंडे की सूंडी, गुलाबी डोंडे की सूंडी, सोडोप्टेरा लिटूरा तथा चूसने वाले कीटकों जैसे माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी आदि की रोकथाम में प्रभावकारी है। **चेतावनी : १. इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें। २. मधुमक्खियों और मछलियों, पशुधन, खेल, जंगली पक्षियों और जानवरों को नुकसान पहुँचाने की संभावना होने पर उस स्थिति में उपयोग न करें।**

નુરોકોમ્બી™

કલોરપાઈરીફોસ 50% + સાઈપરમીથ્રીન 5% ઈ.સી.

(કીટનાશક) ઉદ્દેશ: સિરલ ખેતી માટે ખેતી વિષે વરતણ લઈ

રાસાયણિક મંરચના: કલોરપાઈરીફોસ, સરગરમ તંત્ર (એટેમોટર શુધ્ધતા 94%) : 50.00% ભાર/ભાર, સાઈપરમેથ્રીન સરગરમ તંત્ર (એટેમોટર શુધ્ધતા 92%): 05.00% ભાર/ભાર, ઇમલસીફાઇરિમ ઇ – (કેલસિમ્મ ઇલકાઇલિ દેવરાઇલ મલ્લેનેટ એંઝ નેનાઇલિ ફિનેલ દે પોલીઓંક્સી ઇથર દા મિંગરતદે) : 05.60% ભાર/ભાર, ઇમલસીફાઇરિમ બી – (ઇલકાઇલિ બેંઝીંગ મેલ્લોનિક ટેમિલ દા કેલસિમ્મ મલ્લટ દે ઢૈટી. મલ્લકોટ્રલ દે પોલીઓંક્સી ઇથરાદેલિંગ ઇથર દા મિંગરતદે) : 02.40% ભાર/ભાર, દેકોમેટિક રાઇઝ્રેવરાઇન (દેકોમેક્સ) : વરાઈ માંરતા %, **કુલ: 100.00% ભાર/ભાર। ઇસ્તેમેમલ લઈ રિવદેમ:** ઇસ્તેમેમલ તં પહિલાં નાલ નંથી લીલ્લેટ પઢ્રે। **માંરતા:** ઇસ્તેમેમલ તં પહિલાં નાલ નંથી લીલ્લેટ પઢ્રે। **ઇસ્તેમાલકરતા લઈ માંરયાનીઆં:** 1. ખાદ પીતે દીખાં ચીંજાં અંડે ઉનાં દે ખાલી ઘરતન અંડે પમ્રુમાં દે ચારે તે ચુર રયે। 2. મુંગ, ચામડી અંડે અખાં દે છોટ તે બચાંઈ। 3. છિડકવામ દી ઝાપ દું માપ રાગી અંદર ના જાણ દીંઈ। ટાઢા દી દિસા વિચ છિડકવામ કરે। 4. છિડકવામ દે બાદ દુસિત કપડે અંડે સરીર દે ઝાગાં દું ચંગી તરૂા ધોંઈ। 5. છિડકવામ દે સમેં ઘુમરપાન, ખાતા પીતા અંડે કુઝ દી ચબાઉતા મનૂા ટો। 6. છિડકવામ વરતા સમેં નાં મિલાઉંદ વેલે પુરે સુરખિંગંડ કપડે પાંઈ। **ઝાંચિવ તેંડ:** 1. રોગી કે તુરંડ ઇટ્રોપીંઇ દિઈ અંડે ઠઠેવ 5-10 મિંટ દે અંડરગર "તે 2-4 મિં ગ્રા દવાઈ દા ઇસ્તેમેમલ કરતે ઠોંઈ રોગી કું પુરી તરૂાં ઇટ્રોપીનાઇસ રખે। ઇંચ દિન વિંચ 25 તે 50 મિં ગ્રા દવાઈ દેંઈ પે મરતી ટો। સંછાંઇ નાલી રાંઇંદ દી મુરત વિંચ ઇસ્તેમેમલ જારી રખે। લાગ છિંગંઇ દી માંરતા નાલ ઇટ્રોપીંઇ દવાઈ દી માંરતા દા અનુમાન સગાઇમાં ના મકદા ટો। 2. રોગી દીખાં ગમ વિંચ 1-2 ગ્રામ 2 પીઇમેમ 10 મી. મી. ડીમિંઇલડ પાની વિંચ મિલા કે ઇંસિંગલગત ચારૂત ટોલી-ટોલી 10-15 મિંટ દાં ગમાં સગાઇ કે દિઈં। 3. એલરગી કું રોકદ લઈ એંટીહિસ્ટામાઇનમ દિંઈ સી મકદી ટો। **મ્રુદલી મદાઇત:** ઇસ્તેમેમલ તં પહિલાં નાલ નંથી લીલ્લેટ પઢ્રે। **ઝાંચિ દે સેંછદ:** ઇસ્તેમેમલ તં પહિલાં નાલ નંથી લીલ્લેટ પઢ્રે। **મિદારમ:** કલોરપાઈરીફોસ સરગરમ તંત્ર 50% + સાઈપરમેથ્રીન સરગરમ તંત્ર 5% ઈ સી કીટનાશમ અમેરિકન ઠોંઈ દી સૂંડી, ચિંતીદાર ઠોંઈ દી સૂંડી, ગુલાબી ઠોંઈ દી સૂંડી, સોડોપ્ટેમ લિટ્યુટા અંડે ચુમટ વાલે કીટાં જિદેં કિ માહુ, તેલા, ચુરદા, ચિંટી મંખી આદિ દી રોકથામ વિંચ પ્રભાવકારી ટો। **સાવધાની : ૧. ઇમ લેબલ/પત્રિકા વિંચ દર્શાવેલી જાણેલાં કે સિવાય બીજાં પાકોમાં ઉપયોગ ન કરો। ૨. મધમાખીઓ અને માછલીઓ, પશુધન, રમત, જંગલી પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ માટે નુકસાન થવાની શક્યતા હોય તો ઉપયોગ ન કરો।**

FMC

NUROCOMBI®

INSECTICIDE

5 Litre

Keep out of the reach of children.

बॅच्चिआं दी पहुँच तों दूर रॅखे।

Keep in cool dry place away from heat and open flame.

ज़हर
ज़हिर
POISON

बच्चो की पहुँच से दूर रखें।

ठंढे, सुंके थां ऊँते अंडे गरमी ते अंग तें दूर रॅखे।

सूखी और ठंडी जगह पर खुली आग से दूर रखें।

Regn. No./रजि. नं./રજિ નં.:CIR-33,859/2000-Chlorpyriphos+Cypermethrin(EC)-1591

Manufactured by: BR AGROTECH LTD.
Regd. Office: 1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008.
उत्पादक : बी आर एग्रोटेक लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–११०००८.
નિરમ્માતા: બીઆર એગ્રોટેક લિ.,
રજિ દફતર: 1505, વિક્રમ ટાવર, રાજેંદ્રર પ્લેસ, નવીં દિંલ્લી–110008।

See first letter of Batch No. for manufacturing unit address.

K: Industrial Area, SIDCO, Kathua - 184102 (J&K)
Mfg. Lic. No. : J/M-Pvt/18
P: Plot No. 620/3, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat-394115. **Mfg. Lic. No. : GJ-BHA-01043**
क: इण्डस्ट्रियल एरिया, सिडको, कठुआ – १८४१०२ (जे एण्ड के)
उत्पा. लाई. नं.: **J/M-Pvt/18**
प: प्लोट नं. ६२०/३, जी.आई.डी.सी. एस्टेट पनोली, अंकलेश्वर जि. भरूच, गुजरात–३६४११५. उत्पा. लाई. नं.: **GJ-BHA-01043**
કે: ઇંડાસ્ટ્રીયલ ઇરીયા, સિડકો, કઠુમા – 184102(જે એંડ કે)
ઉત્પાદન લસંમ નં.: : **J/M-Pvt/18**
પી: પલ્ટ નં: 620/3, જી.આઈ.ડી.સી. એસ્ટેટ પંલિ, અંકલેશ્વર જિલ્લા, ભરૂચ, ગુજરાત– 394115. ઉત્પાદન લસંમ નં.: : **GJ-BHA-01043**

MARKETED BY: *FMC India Private Limited TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India.

विपणनकार्ता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी–५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

મંડીકરતા: એફએમસી ઇંડીઆ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, ટીસીજી ફાઈનેંશિયલ સેંટર, 2રી મંઝિલ, સી–53, બાંદરા કુરલા કંપલેંકસ, બાંદરા(પુ), બાંદરા સબઘરન, મુંબઈ – 400098, મહારાષ્ટ્ર, ઇંડીઆ।

Customer Cell ✆ : **1800 102 6545** or
✉: **Ask@fmc.com** or write at *FMC India address.

Net Content:
शुद्ध मात्रा/શુપ માંરતા: **5 L / ५ ली.**

Batch No./ बैच नं./બિંચ નં.: Date of Mfg./ मैन्यु.ता./ઉત્પાદન તારીખ: Exp. Date/ अवसान तिथि./ આખરી તારીખ: Maximum Retail Price:₹ (Inclusive of all taxes) / अधिकतम खुदरा मूल्य :₹ (सभी करों सहित): અધિકતમ છુટ્ટા મુંલ (માંઘે કરાં સહિત) :₹

FMC, the FMC logo and NUROCOMBI, न्यूरोकॉम्बी and નુરોકોમ્બી are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2022 FMC Corporation. All rights reserved