Dimethoate 30% E.C. **ROGOR®** Insecticide

Chemical Composition: Dimethoate tech. (based on 85% w/w a.i.): 35.50% w/w, Stabilizer (Epichlorohydrin):1.00% w/w, Emulsifier (Non-ionic-poly oxy ethylene ether):8.00% w/w, Aromax: 10.50% w/w, Xylene: 30.00% w/w, Cyclohexanone: 15.00% w/w, Total: 100.000% w/w. **Direction of use:** Please read enclosed leaflet before use. **Recommendation:** It is recommended to control insects of vegetable fruit trees & miscellaneous crops. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of Salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. **Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

डायमेथोएट 30 प्रतिशत ई.सी. **रोगोर®** कीटनाशक

रासायनिक संरचना: डायमेथोएट टैक्निकल (भारानुसार ८५ प्रतिशत स.त. पर आधारित): ३५.५०% भार/भार, स्टेबलाइज़र (इपिक्लोरोहड्रिन): १.००% भार/भार, एमल्सीफायर: 'नान-आयोनिक-पाली आक्सी' इथिलीन ईथर: ८.००% भार/भार, एरोमेक्स: १०.५०% भार/भार, जाइलीन: ३०.००% भार/भार, साईक्लोहेक्सानोन: १५.००% भार/भार, **योग: १००.००% भार/भार। उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **उपयोग:** इस कीटनाशक का उपयोग सब्जियों, फल वृक्षों और अन्य फसलों के कीट की रोकथाम के लिए किया जाता हैं। **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ:** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के संम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ४) छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या प्रयोग के समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** १) रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मि.ग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्त:शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मि.ग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती हैं। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी हैं। २) १ से २ ग्राम २ पी.ए.एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्त:शिरा द्वारा बहुत धीरे-धीरे १० से १५ मिनट में देना चाहिए। **चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।**

ડાયમેથોએટ ૩૦% ઇ.સી. **રોગોર®** જંતુનાશક

રાસાયણિક સંરચના: ડાયમેથોએટ ટેક. (85% વ/વ સ.ઘ. પર આધારિત): 35.50% વ/વ, સ્ટેબિલાઈઝર (ઇપિક્લોરોહાયડ્રિન): 1.00% વ/વ, ઇમલ્સિફાયર: 'નૉન આયોનિક-પોલીઑક્સી ઇથાઈલીન ઇથર' : 8.00% વ/વ, એરોમેક્સ: 10.50% વ/વ, ઝાયલીન: 30.00% વ/વ, સાયક્લોહેક્સાનોન: 15.00% વ/વ, **કુલ: 100.00% વ/વ. વપરાશની રીત:** ઉપયો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંલગ્ન પરિપત્ર વાંચો. **ભલામણ:** શાકભાજી, ફળના ઝાડ અને ફૂટક પાકના જંતુના નિયંત્રણ માટે એની ભલામણ કરવામાં આવે છે. **સાવચેતી:** 1. ખાદ્યપદાર્થ, ખાદ્યપદાર્થના ખાલી પાત્રો અને પશુઆદાથી દૂર રાખો. 2. મોં, આંખ અને ત્વચાના સંપર્કમાં ના આવવા દો. 3. ઉપયોગ કરતા સમયે સ્પ્રેમાંના છાંટા શ્વાસમાં ના જવા દો. હવાની દિશામાં છંટકાવ કરો. 4. ઉપયોગ કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરનાં અંગો બરાબર ધૂસો. 5. ઉપયોગ કરતા સમયે ધૂમ્રપાન કરવું નહિ, પીવું, આવું અને ચાવવું નહિ. 6. મિશ્રણ અને ઉપયોગ કરતા સમયે સંપૂર્ણ સંરક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો. **વિષ નિવારણ:** 1. દર્દીને તરત એટ્રોપિન આપો અને 5 થી 10 મિનિટના અંતરે નસ દ્વારા એટ્રોપિન સલ્ફેટનો 2 થી 4 મિગ્રામા વારેઘડીએ ડોઝ આપી સંપૂર્ણ એટ્રોપાઇન જાળવી રાખો. દિવસમાં અધિકતમ 25 થી 50 મિગ્રા. એટ્રોપિનની જરૂર પડે. લક્ષણો ચાલુ રહે એ પ્રમાણે વધારાનું એટ્રોપિન આપવાની જરૂર પડે. ડોઝને શરભર કરવા માટે લાળ ઝરવાનું પ્રમાણ એ ઉપયોગી પરિણામ છે. 2. 10 મિલિ. ડિસ્ટિલ્ડ પાણીમાં 1-2 ગ્રામ 2 પીએસએમ ઓગાળો અને 10-15 મિનિટ સુધી અતિ ધીમેથી નસ દ્વારા આપો. **સાવચેતી : આ લેબલ/પત્રિકા પર દર્શાવેલા હોય તે સિવાયની ફસલો પર વાપરવું નહીં.**

డైమిథోయేట్ 30% ఇ.సి. **రోగోర్®** కీటకనాశని

రసాయనిక సంస్థాన : డైమెథోయేట్ టెక్నికల్ (85% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు. ఎ.ఇ. ఆధారంగా) : 35.5% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు, ఎపిక్లోరోహ్డ్రిన్ (స్టెబిలైజర్) : 1.0% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు, ఎమల్సిఫైయర్ (నాన్ అయోనిక్ పాలిఆక్సి ఎథైలిన్ ఈథర్) : 8.0%డబ్ల్యు/డబ్ల్యు, అరోమెక్స్ : 10.5% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు, మొత్తం : 100.00డబ్ల్యు/డబ్ల్యు. **ఉపయోగించడానికి సర్దేశం :** ఉపయోగించే ముందుగా దయచేసి జతపరచబడ్డ కరపత్రాన్ని చదవండి. **సిఫారసు :** కూరగాయలు, పండ్ల చెట్లను మరియు ఇతర సంబంధ మొక్కలను ఆశించే కీటకాలను అరికట్టేయడానికి ఇది సిఫారసు చేయబడుతున్నది. **మందు జాగ్రత్తలు :** 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహారపదార్థం కంటైనర్లు మరియు జంతువుల దాణా నుండి దూరంగ ఉంచాలి. 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంపర్కం కాకుండా చూడాలి. 3. చల్లే పాడిని పీల్చకుండా చూడాలి. గాలి వీచే దిశలో చల్లాలి. 4. చల్లిన తరువాత కలుషితమైన దుస్తులను మరియు శరీరాన్ని పూర్తిగా శుభ్రపరచుకోవాలి. 5. చల్లేటప్పుడు పొగ తాగకూడదు, దేనిని తినకూడదు, చప్పరించకూడదు. 6. మిశ్రమాన్ని కలిపేటప్పుడు మరియు చల్లేటప్పుడు పూర్తి సంరక్షణనందించే దుస్తులను ధరించాలి. **విషమిచ్చే లక్షణాలు :** ఉపయోగించే ముందుగా దయచేసి జతపరచబడ్డ కరపత్రాన్ని చదవండి. **ప్రాథమిక చికిత్స :** ఉపయోగించే ముందుగా దయచేసి జతపరచబడ్డ కరపత్రాన్ని చదవండి. **చిరునుడు :** 1. పెసుసెంటసీ రోగికి ఎట్రాపైన్ ఇవ్వాలి మరియు అట్రాపైన్ సల్ఫేట్ యొక్క 2 నుండి 4 మి.గ్రా. మోతాదులను సిరల ద్వారా మరలామరలా 5 నుండి 10 నిముషాల నిరామాలలో ఇచ్చి సంపూర్ణంగా అట్రాపైనేషన్ చేయాలి. ఒక రోజులో 25 నుండి 50 మి.గ్రా అట్రాపైన్ అనంతరం అవుతుంది. తదుపరి అట్రాపైన్ ఇవ్వవలసిన అనంతరం లక్షణాలు కొనసాగడాన్ని బట్టి కలుగుతుంది. మోతాదును సవరించడానికి ఉమ్మి ఎంతగా కారుతున్నదనేది ఉపయోగకరమైన ప్రామాణికత. 2.1.-2గ్రా. 2 పిఎమ్‌ను 10 మిలీ డిస్టిల్డ్ నీటిలో కరిగించి, నిదానంగా 10-15 నిముషాల లాటుగా సిరల ద్వారా ఇంజెక్షనగ ఇవ్వాలి. **లెబుల్/కరపత్రం మీద పూర్తు పంటలు కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడరాదు.**

ROGOR®

INSECTICIDE

FMC

1 Litre

Keep out of reach of children.



बच्चों की पहुँच से दूर रखें। सूखी और ठंडी जगह में खुली आग से दूर रखें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

બાળકોની પહોચથી દૂર રાખો. ગરમી અને ખુલ્લી જ્વાળાથી દૂર ઠંડી, સુકી જગ્યામાં રાખો.

Manufactured By: M/S New Pack Agro Chem, Plot No. 238/1/A, G.I.D.C., Panoli – 394 115, Tal. Ankleshwar, Dist. Bharuch, Gujarat. **Marketed by: FMC India Private Limited,** TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India.

निर्माता : एम/एस न्यू पॅक एग्रो केम, प्लॉट नं. २३८/१/ए, जी.आई.डी.सी. इस्टेट, पनोली-३९४११५, ता. अंकलेश्वर, जिला – भरुच, गुजरात । **विक्रेता : एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड,** टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

નિર્માતા : એમ/એસ ન્યૂ પૅક એગ્રો કેમ, ૨૩૮/૧/એ, જી.આઈ.ડી.સી. ઈસ્ટેટ, પનોલી - ૩૯૪૧૧૫, તા. અંકલેશ્વર, જિલ્લો: ભરૂચ, ગુજરાત. **વિક્રેતા: એફ એમ સી ઈંડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ,** ટીસીજી ફાઈનેંશિયલ સેંટર, ૨ જા માળે, સી -૫૩, બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પલેક્સ, બાંદ્રા (પૂર્વ), બાંદ્રા સબર્બન, મુંબઈ - ૪૦૦૦૯૮, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.

Customer Cell ✆: **1800 102 6545** or
✉: **Ask@fmc.com** or write at *FMC India address.

Regn. No./ रजि. नं./રજિ નં.:CIR-7242/88/DIMETHOATE (EC)-351

Mfg. Lic. No./ मैन्यु. ला. नं. / મેન્યુ. લા. નં. : 789

Batch No./ बैच नं./બેચ નં.:

Mfg. Dt./ मैन्यु. ता./મેન્યુ.તા.:

Exp. Dt./वैधता ता./અંતિમ તા.:

Max. Retail Price (Incl. of all taxes): अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित): અધિકતમ છૂટક કિંમત (બધા કરવેરાં સહિત): ₹

Net Quantity/शुद्ध मात्रा/શુદ્ધ માત્રા: **1 litre**

Rogor® is registered trademark of FMC Corporation or an affiliate.