ಫಾಸಿಜೈಮ್™
ಸೆಫಲೆಕ್ಸಿನ್‌ನಿಂದ 2.4% ಸಿರಪ್
(ನಲ್ಗೊಂಡ)

ಸಂಯೋಜನೆ: ಪ್ರತಿ 5 ಮಿಲಿ ಸಿರಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಫಲೆಕ್ಸಿನ್ 120 ಮಿಗ್ರಾಂ.

ಸೂಚನೆಗಳು: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು.

ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ: ವಯಸ್ಕರು: ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ 5 ಮಿಲಿ. ಮಕ್ಕಳು: ದೇಹದ ತೂಕದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಮಿಗ್ರಾಂ, 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಅತಿಸಾರ, ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಲರ್ಜಿಯ ದದ್ದು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಸೆಫಲೋಸporಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: 25°C ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.

ಪ್ಯಾಕ್: 60 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲ್.

ತಯಾರಕರು: ಫಾಸಿಜೈಮ್™ ಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪ್ಲಾಟ್ 12, ಫಾರ್ಮಾ ಎಸ್ಟೇಟ್, ನಲ್ಗೊಂಡ.

ವಯೋಬೆಲ್™
ವಿಟ್ಟುಬ್ಯಾಬಿಂಡ್ 2.5% ಜೆಲ್ (ಸಂಗತಿಯ)
(ಕಂಬಳಿಹುಳಗಳು)

ಸೂಚನೆಗಳು: ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಠರಗರುಳಿನ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಜಂತುಹುಳುಗಳ ಸೋಂಕು.

ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ 10 ಕೆಜಿ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿ, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ.

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ: ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ 14 ದಿನಗಳು; ಹಾಲಿಗಾಗಿ 7 ದಿನಗಳು.

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್: 100 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು 500 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳು.

ತಯಾರಕರು: ವಯೋಬೆಲ್™ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ 9, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು.

ವಯೋಪೆಲ್™
ಪಿಸೈಪಂಕ್ಚುಡಮಿಡ್ 2.5% ಜೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ
(ಕಲಾಕಾರಿಕೊಲಿಯ)

ಸೂಚನೆಗಳು: ಜೇನುಗಾಣ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು.

ಪಶು ಮತ್ತು ಬೂಕಿ ವಿಧಿ: ಪೈಪೆಕ್ಸಾಮಿಡ್ 2.5% ಜೆಲ್ಲಿ ಕಣಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮೃದುವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೇನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ. ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಡಳಿತ: ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಜೇನುಗೂಡಿನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಸಾಕು.

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ: ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ 14 ದಿನಗಳು.

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್: 50 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು.

ತಯಾರಕರು: ವಯೋಪೆಲ್™ ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ 3, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು.

ವಾಯೊಬೆಲ್™
ಬಫ್ಫುಬ್ಯೂಟಮಿಡ್ 2.5% ಜೆಲ್
(ಕೆಂಪಾಕಣ)

ಸೂಚನೆಗಳು: ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಒಣಗಿದ ಉಣ್ಣೆಯ ಸೋಂಕು.

ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ: ಪ್ರತಿ 10 ಕೆಜಿ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿ, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ.

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ: ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ 14 ದಿನಗಳು; ಹಾಲಿಗಾಗಿ 7 ದಿನಗಳು.

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್: 100 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು 500 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳು.

ತಯಾರಕರು: ವಯೋಪೆಲ್™ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ 9, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು.

ಡಾಯಿಜೈಮ್™
ಸೆಫಲೆಕ್ಸಿನ್ 2.4% ಸಿರಪ್
(ನಲ್ಗೊಂಡ)

ಸಂಯೋಜನೆ: ಪ್ರತಿ 5 ಮಿಲಿ ಸಿರಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಫಲೆಕ್ಸಿನ್ 120 ಮಿಗ್ರಾಂ.

ಸೂಚನೆಗಳು: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು.

ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ: ವಯಸ್ಕರು: ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ 5 ಮಿಲಿ. ಮಕ್ಕಳು: ದೇಹದ ತೂಕದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಮಿಗ್ರಾಂ, 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಅತಿಸಾರ, ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಲರ್ಜಿಯ ದದ್ದು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಸೆಫಲೋಸporಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: 25°C ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.

ಪ್ಯಾಕ್: 60 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲ್.

ತಯಾರಕರು: ಡಾಯಿಜೈಮ್™ ಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪ್ಲಾಟ್ 12, ಫಾರ್ಮಾ ಎಸ್ಟೇಟ್, ನಲ್ಗೊಂಡ