వెల్‌జో™
వాలిఫెనలేట్ 6% + మ్యాంకోజెబ్ 60% డబ్ల్యుజి.
శిలీంధ్రనాశిని

ప్రధాన ఉద్దేశ్యము : వ్యవసాయరంగంలో ఉపయోగం కోసమే

పరిచయం మరియు పంటలు మరియు వాటికి సంబంధించిన వ్యాధులు :

ఒక వాలిఫెనలేట్ 6% + మ్యాంకోజెబ్ 60% డబ్ల్యుజి యొక్క మిశ్రమం. దీనిని టమాటా పంటనాశించే ఎర్లీ బ్లైట్ మరియు లేట్‌బ్లైట్ బంగాళదుంప పంటనాశించే లేట్ బ్లైట్ మరియు ద్రాక్షపంట నాశించే డౌనీ మైల్‌డ్యూ లను అరికట్టుటకు సిఫారసు చేయబడినది.

రసాయనిక మిశ్రమం :

పేరు	% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
వాలిఫెనలేట్ సక్రియ పదార్థం	6.00
మ్యాంకోజెబ్ సక్రియ పదార్థం	60.00
సోడియం లిగ్నోసల్ఫేట్	4.00
మెథాయిల్ నఫ్తలీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అమోనియమ్ లిగ్నోసల్ఫేట్	4.00
పాలిమార్ ఫర్మల్ డిహైడ్ సోడియం సాల్ట్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్,	
సి12–18 అల్కాయిల్ (సరి సంఖ్య)	3.00
యస్టర్స్, సోడియం సాల్ట్	
ఫ్యాటీయసిడ్స్, ట్యాలో, సోడియం సాల్ట్	0.50
సోడియం సిట్రేట్	చాలినంత
మొత్తం	100.00

దీన్ని వాడుటకు సూచనలు మరియు వాడే విధానము:

పంట	నివారించబడే వ్యాధులు :	సిఫార్సు మోతాదు			చివరి స్ప్రే నుండి కోతకాలం వరకూ వేచివుండాల్సిన సమయం (రోజుల్లో)
		స.ప. (గ్రాముల్లో)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.లలో)	వాడాల్సిన నీటి మోతాదు (లీటర్లలో)	
టమాటా	ఎర్లీ బ్లైట్ మరియు లేట్ బ్లైట్	120+1200–150+1500	2000 - 2500	500	5
బంగాళ-దుంప	లేట్ బ్లైట్	120+1200–150+1500	2000 - 2500	500	20
ద్రాక్ష	డౌనీ మిల్‌డ్యూ	120+1200	2000	750	14

వాడే విధానం మరియు సమయం, వాడే వ్యవధిలో పాటు గరిష్ఠ సంఖ్యలో పిచికారిలు మరియు పంట దశ : వ్యాధి పెద్దగ ఆవడానికి వాతావరణం అనుకూలంగా వున్నప్పుడు లేదా వ్యాధి యొక్క పెరుగుదల దశలో లేదా పూతపూసే దశలో కనపడినప్పుడు వాడవలెను. ఒక పంటకాలంలో టమాట పంటలో రెండు కన్నా ఎక్కువ వాడరాదు. పంటపై నున్న వ్యాధి యొక్క తీవ్రతనుబట్టి 10 రోజుల వ్యవధిలో పంటపై పిచికారి చేయుట ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చును.

స్ప్రే చేసుకోడానికి వాడాల్సిన పరికరాలు మరియు నాజిల్ రకాలు: హైవాల్యూం స్ప్రేయింగ్ పరికరాలయిన న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్,హోలోకోన్ నాజిల్ బిగించబడిన ఫుట్ స్ప్రేయర్‌లు వాడినట్లయితే పంటంతా చక్కగా ఆకులపై అలుముకుపోయేల్లా జల్లుకోడానికి సహాయపడుతుంది.

ద్రావణం మిశ్రమాన్ని కలుపుకోడానికి సూచనలు : సూచించబడిన ఈ ఉత్పాదన యొక్క పరిమాణాన్ని పంట యొక్క ప్రాంతం ఆధారంగా తీసుకుని కొద్దిగా నీటితో బాగా కలపవలెను. తరువాత మిగిలిన నీటిని కలిపి బాగా పంట అంతా పూర్తిగా తడిసేలాగా పిచికారి చేయవలెను.

సాధారణంగా వుండాల్సిన వాతావరణ పరిస్థితులు : ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులలో దీన్ని వాడరాదు.

ఫైటో టాక్సిసిటీ : సిఫారసు చేయబడిన మోతాదులో ఫైటోటాక్సిక్ కాదు.

నేల మరియు నీరు: ప్రత్యేకించి ఫలానా నేల మరియు నీరు వాడే యాజమాన్య పద్ధతులేమీ లేవు.

తిరిగి –ప్రవేశించవలసిన సమయం: జల్లుకున్న పిచికారి ఆరిపోయేంతవరకూ,అంటే కనీసం 24 గంటల వరకూ ఆ ఏరియాలోకి తిరిగి ప్రవేశించరాదు.

ఏ పంటదశలో ఎటువంటి పురుగుమందు ఎటువంటి పంటమీద వాడరాదు : వర్తించదు.

గ్రూప్ **40** **ఎమ్03** శిలీంధ్రనాశిని

ఈ మందు ప్రభావానికి తట్టుకోగల శక్తి యాజమాన్యానికి చెందిన ప్రకటన:

1. కార్బోక్సిలిక్ యాసిడ్ అమైడ్స్ (సిఏఏ) శిలీంధ్రనాశనులను వ్యాధి నిరోధకంగా వాడవలెను.

2. మరొక చర్యవిధానం కల శిలీంధ్రనాశనులను మార్చి వాడవలెను.

3. ఒక పంటకాలంలో ద్రాక్ష పంట నాశించే డౌనీ మిల్‌డ్యూని అరికట్టుటకు సిఫారసు చేయబడిన ఏ శిలీంధ్రనాశనులైనా 50 శాతం గరిష్ఠంగా 4 కార్బోక్సిలిక్ యాసిడ్ అమైడ్స్ (సిఏఏ) మించి వాడరాదు.

4. బంగాళదుంప మరియు టమాటా పంటలలో లేట్‌బ్లైట్ : లేట్ బ్లైట్‌ను అరికట్టుటకు కావలసిన శిలీంధ్రనాశనులను 50 శాతం వాడవలెను.

సురక్షితంకై తీసుకోవలసిన ముందుజాగ్రత్తలు: 1.దీన్ని జల్లేటప్పుడు ఏదైనా తినడం,త్రాగటం,లేదా పొగత్రాగడం మరియు కిళ్ళీ లేదా తమలపాకులు నములడం లాంటి పనులు చేయరాదు. 2. దీన్ని జల్లేవారు పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి. అంటే: పొడవాటి స్లీవ్స్‌గల చొక్కా,ఫుల్ ప్యాంట్,కెమికల్స్‌ను తట్టుకోగల చేతి తొడుగులు, ముఖానికి మాస్క్,కాళ్ళకు బూట్లు,కళ్ళకు నల్లకళ్ళద్దాలు, తలకు టోపీ లాంటివి ధరించాలి.3. దీన్ని జల్లేటప్పుడు గాలి వాటాన్ని బట్టే జల్లుకోవాలి గానీ గాలికి ఎదురుగా జల్లుకోరాదు.దానివలన మందు తుంపర్లు శరీరం మీద పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు.4.స్ప్రే నాజిల్ ఒకవేళ పూడుకుపోయి పిచికారి సరిగా అవ్వకపోతే, సన్నని పుల్ల లేదా బ్రష్‌తో క్లీన్ చేసుకోవాలే గానీ నాజిల్‌ను నోటితో ఊదరాదని గుర్తుంచుకోండి. 5.ఒకవేళ మందు తుంపర్లు శరీరం మీద పడినట్లయితే, వెంటనే సబ్బువాడుతూ ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. 6.దీన్ని జల్లుకోవడం అయిపోగానే కాళ్ళు, చేతులను అలాగే తుంపర్లు పడిన శరీరభాగాలను,మరియు ఏదైనా తినడానికి,త్రాగడానికి మరియు పొగత్రాగడానికి ముందు సబ్బువాడుతూ ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. పిచికారి పని అవ్వగానే కలుషితమైన బట్టలను తీసివేసి వేరుగా ఉతుకుని ఆరవేసుకోవాలి.

హెచ్చరికలు: 1.దీని లేబుల్ లేదా కరపత్రంలో ప్రత్యేకించి ఇవ్వబడిన ఉద్దేశ్యాలకు తప్ప వేరేగా దీన్ని వాడరాదు. 2. ఈ ఉత్పాదన జలచరాలకు విషపూరితమైనది గనుక చేపలపెంపకం గలచోట దీన్ని వాడరాదు.

విషలక్షణాలు : లాలాజలము, పైలో ప్రతిచర్య, దురద, ఛాతిలో బిగుదు, దడ, అధిరక్తపోటు, వికారం, వాంతులు, అతిసారం, అల్పోష్ణస్థితి, అటాక్సియా జరగవచ్చు.

ప్రథమచికిత్స: ఒకవేళ మ్రింగినట్లయితే: ఒకవేళ విషపూరితమైన వ్యక్తి స్పృహలోనే మరియు చురుకుగా వున్నట్లయితే,నీటితో నోరు బాగా పుక్కిలించేలా చేసి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగించాలి. స్పృహలోలేని వ్యక్తికి నోటిద్వారా ఏదీ ఇవ్వరాదన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలి.డాక్టర్‌గార్ని వెంటనే పిలవాలి.వారిని పర్యవేక్షించే డాక్టర్‌గారి అనుమతి లేకుండా, రోగిని వాంతి చేయించుటకు ప్రేరేపించరాదు. **ఒకవేళ పీల్చినట్లయితే:** రోగిని వెంటనే ఆరుబయటకు తరలించాలి మరియు తన బాడీ టెంపరేచర్ పెరగకుండా చూస్తూవుండాలి.ఒకవేళ రోగి శ్వాస పీల్చలేని స్థితిలోనున్నా లేదా పీల్చడంలో ఇబ్బందిగావున్నా తనకు కృత్రిమ శ్వాస కల్పించాలి.అందుకోసం తన నోటిలో నేరే వారు నోరుపెట్టి శ్వాస కల్పించాలి.వెంటనే డాక్టర్‌గార్ని సంప్రదించడం మంచిది. **ఒకవేళ చర్మానికి అంటినట్లయితే:** కలుషితమైన శరీరభాగాలనే గాక,జుట్టు మరియు గోళ్ల క్రింద కూడా సబ్బు వాడుతూ శుభ్రమైన ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. ఒకవేళ శరీరం ఎర్రబడినా లేదా దద్దురు,దురదలున్నా మరి నొప్పివున్నా డాక్టర్‌గార్ని సంప్రదించాలి.కలుషితమైన బట్టలను వెంటనే తీసివేసి, వాటిని వేరుగా ఉతికించి ,ఆరబెట్టిన పిదప తిరిగి వాడాలి. **ఒకవేళ కళ్ళలో పడినట్లయితే:** కనీసం 15 నిమిషాల వరకూ కళ్ళలో నీరెక్కువ కొట్టుకుంటూ జాగ్రత్తగా కళ్ళు కడుక్కోవాలి. శుభ్రమైన ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. ఒకవేళ శరీరం ఎర్రబడినా లేదా దద్దురు,దురదలున్నా , నొప్పివున్నా అలాగే వెలుగుచూసి భయపడటం లాంటి లక్షణాలుంటే వెంటనే కళ్ల డాక్టర్‌గార్ని సంప్రదించాలి.

ఔషధ చికిత్స: ఫలానా విరుగుడు అంటూ ఏమీలేదు. విషలక్షణాలనుబట్టి చికిత్స నివ్వాలి.

నిల్వ: 1. ఈ కీటకనాశిని నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు ఇతర పదార్థములను అంటే మరి ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థములను, పశువుల దాణాను నిల్వ చేసే గదులు ఆవరణలకు దూరంగా వీటి యొక్క పరిమాణము మరియు స్వభావాన్నిబట్టి వేరువేరు అలమారాలలో పెట్టి తాళం వేసి బిగించి మాత్రమే నిల్వ చేయాలి. 2. ఈ కీటకనాశిని నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు మంచి గట్టి కట్టడముల్తై, పొడిగా, మంచి గాలి వెలుతురు ప్రసరించేలా విశాలంగా వుండాలి. తద్వారా వీటి ఆవిరివల్ల పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

ఖాళీ డబ్బాలను మిగిలిపోయిన మందును పారవేయడం: 1. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏ విధంగానూ వాడరాదు, అలా చేయడం చాలా ప్రమాదకరం. డబ్బాలను పారవేయుటకు ముందు బాగా నీళ్ళతో మూడుసార్లు రిన్స్‌చేసి ఆ నీటిని స్ప్రే మిక్స్‌లో కలపాలి. 2. వొట్టి చేతులతో దీన్ని కలపరాదు. 3. పిల్లలకు అందకుండా దూరంగా వుంచాలి. అలాగే దీన్ని ఆహార పదార్థములు, పశువుల దాణా, మంటలు, వేడిమికి దూరంగా నిల్వ చేయాలి. దీన్ని చల్లగావున్న చోట తాళం వేసి నిల్వ చేయాలి. 4. దీన్ని తయారు చేయువారు, ఫార్ములేటర్స్ మరియు వాడేవారి యొక్క విధియై వుంది. ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందు లేదా పిచికారి చేసిన పరికరాలు కడుగగా వచ్చిన నీటిని కడుజాగ్రత్త వహిస్తూ అంటే పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా పారవేసుకోవాలి. ఖాళీ ప్యాకేజీలను, డబ్బాలను తిరిగి ఏవిధంగానూ వాడరాదు. అలా బయట వదిలేయరాదు.

మార్కెట్ మరియు తయారు చేయువారు: ఎఫ్ఎమ్‌సి ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రిజి. ఆఫీసు : టిసిజి ఫైనాన్షియల్ సెంటర్, 2వ అంతస్తు, సి–53, బాంద్ర కుర్ల కాంప్లెక్స్, బాంద్ర (తూర్పు) ముంబాయి, బాంద్ర సబర్బన్, మహారాష్ట్ర – 400098, ఇండియా. **ఫ్యాక్టరీ:** లేన్–2, ఫేజ్–1, సిడ్కో ఇండస్ట్రియల్ కాంప్లెక్స్, బారి బ్రాహ్మణ, సాంబా, జమ్ము (జె–కె). 181133.

வெல்ஜோ™
வாலிஃபினாலேட் 6% + மன்கோஜெப் 60% டபுள்யூடிஜி
பூஞ்சணக்கொல்லி

நோக்கம்: வேளாண் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

அறிகம் - பயிர் - பூச்சிகள் பிரிவு: வாலிஃபினாலேட் 6% + மன்கோஜெப் 60% டபுள்யூடிஜி தயாரிப்பில் வாலிஃபினாலேட் மற்றும் மன்கோஜெப் பூஞ்சணக்கொல்லிகள் கூட்டு சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, தக்காளி பயிரில் ன்பருவ மற்றும் பின்பருவ கருகல் நோய்; உருளைக்கிழங்கு பயிரில் பின்பருவ கருகல் நோய் மறும் திராட்சைப்பயிரின் அடிச்சாம்பல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த இது சிறப்பாகப் பயன்படும்.

இரசாயனச் சேர்க்கை:

பெயர்	% எ/எ
வாலிஃபினலேட் ஏ.ஐ.	6.00
மன்கோஜெப் ஏ.ஐ.	60.0
சோடியம் லிக்னோசல்ஃபோனேட்	4.0
அம்மோனியம் லிக்னோசல்ஃபோனேட்	4.0
மிதைல் நஃப்தலின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட்,	3.0
பாலிமர் வித் ஃபார்மல்டிஹைட், சோடியம் சால்ட்	
சல்ஃபூரிக் ஆசிட், சி12-18-அல்கைல் (ஈவன் நம்பர்டு)	3.0
கொழுப்பு அமிலங்கள்,.பருப்பு,.சோடியம் உப்பு	0.50
சோடியம் சிட்ரேட்	கே. எஸ்.
மொத்தம்	100.00

பயன்படுத்தும் விதம் / தெளிக்கும் வழிமுறை:

பயிர்	கட்டுப்படுத்தப்படும் நோய்கள்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு அளவு			கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
		தீ.மு. (கிராம்)	கலவை (கிராம்)	கரைக்கும் நீர் அளவு (லிட்டர்)	
தக்காளி	ன்பருவ மற்றும் பின்பருவ கருகல் நோய்	120+1200-150+1500	2000-2500	500	5
உருளைக்-கிழங்கு	பின்பருவ இலைக்கருகல்	120+1200-150+1500	2000-2500	500	20
திராட்சை	அடிச்சாம்பல் நோய்	120+1200	2000	750	14

பயன்படுத்தும் றையும் காலம், தெளிப்பு எண்ணிக்கை மற்றும் அதிகபட்ச தெளிப்புகள். தெளிக்க வேண்டிய பயிர் வளர்ச்சிக் கட்டங்கள்: நோய்கள் தோன்றி பெருகுவதற்கு உகந்த வானிலை நிலவரம் சாதகமாக இருக்கும் போது அல்லது தழை வளர்ச்சிப் பருவத்தில் / பூக்கும் பருவத்தில் நோய் தாக்க அறிகுறிகள் தலில் தெரிய வந்தவுடன் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும். ஒரு பயிர் பருவத்தில் தக்காளி பயிரில் இரண்டு தெளிப்புக்கும் அதிகமாகச் செய்யக் கூடாது, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் திராட்சைப் பயிர்களில் நான்கு தெளிப்புக்கு மேலும் தெளிக்கக் கூடாது. நோய் தாக்கத்தின் தீவிரத்தைப் பொருத்து, மிகச் சிறந்த பலன் பெற அடுத்தடுத்த இரண்டு தெளிப்புகளுக்கு இடையில் 10 நாட்கள் இடைவெளி விட வேண்டும்.

மருந்து தயாரிக்கும் குறிப்புகள்: சிறிதளவு தண்ணீரில் தெளிக்க வேண்டிய பரப்பளவுக்குத் தேவையான அளவு மருந்தை சேர்த்து நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். பிறகு பயிர்கள் முவதுமாக நனையும் வகையில் தெளிக்கத் தேவைப்படும் தண்ணீரைச் சேர்த்து நன்றாகக் குலுக்கி குலுக்கி தெளிப்பு கரைசலைத் தயாரிக்க வேண்டும்.

தெளிப்பு கருவிகள் மற்றும் கூம்பு முனை வகை: அதிக கொள்ளளவு கருவிகளான நாப்சாக் ஸ்பிரேயர், ஃபூட் ஸ்பிரேயர் ஆகியவற்றில் வெற்று கூம்பு முனை பொருத்தி ஒரே சீராக தாவரம் முழுவதும் நனையும் வகையில் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும்.

வானிலை நிலவரம் (பொதுவாக): சாதகமில்லாத வானிலையின் போது மருந்து பயன்பாட்டைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

பயிர்கள் மீது பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கக் கூடாத கட்டம்மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய பயிர்கள்: பொருந்தாது

தாவர நச்சு: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தும் போது தாவர நச்சு ஏற்படாது.

நிலம் மற்றும் நீர்: குறிப்பிட்ட நிலம் மற்றும் நீர் பாசன வசதிகள் எதுவும் தேவையில்லை.

மருந்து தெளித்த பிறகு நடமாட்டம்: மருந்து தெளித்து முடித்த பிறகு 24 மணி நேரம் வரையில் மருந்து உலரும் வரையில் நடமாட்டம் செய்யக் கூடாது.

குரூப் **40** **எம்03** பூஞ்சணக்கொல்லி

தடுப்புத்திறன் மேலாண்மை அறிக்கை:

1. கார்போக்ஸைலிக் ஆசிட் அமிடெஸ் (சிஏஏ) பூஞ்சணக்கொல்லி மருந்தை நோய் தடுப்பு றையில் பயன்படுத்த வேண்டும்.

2. மருந்து தெளிப்பு மேலாண்மைத் திட்டங்களில் வேறு றையில் செயல்படும் பூஞ்சக்கொல்லி மருந்துகளையும் மாற்றி மாற்றி தெளித்து பலனடைய வேண்டும்.

3. ஒரு பயிர் பருவத்தில் திராட்சைப் பயிரில் அடிச்சாம்பல் நோயைத் தடுக்க மருந்தைப் பயன்படுத்தும் போது, மருந்து தெளிக்க வேண்டிய தடவைகளில் அதிகபட்சம் 50% தடவைகளாக கார்போக்ஸைலிக் ஆசிட் அமிடெஸ் (சிஏஏ) பூஞ்சணக்கொல்லி மருந்தை மொத்தம் 4 தெளிப்புக்கும் மிகையாகத் தெளிக்க க்கூடாது.

4. உருளைக்கிழங்கு மற்றும் தக்காளி பயிர்களில் பின்பருவ கருகல் நோயைத் தடுக்க - மருந்து தெளிக்க வேண்டிய தடவைகளில் அதிகபட்சம் 50% தடவைகளுக்கு இந்த மருந்தைப் பயன்படுத்தக் கூடது.

மருந்து தெளித்த பிறகு நடமாட்டம்: மருந்து தெளித்து முடித்த பிறகு 24 மணி நேரம் வரையில் மருந்து உலரும் வரையில் நடமாட்டம் செய்யக் கூடாது.

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. மருந்தைக் கையாளும் போதும் பயன்படுத்தும் போதும் எதையும் சாப்பிட, குடிக்க , அல்லது புகைபிடிக்கக் கூடாது. 2. முழுக்கைசட்டை, முழு கால் பேன்ட், இரசாயனத் தடுப்பி கையுறைகள், முகக் கவசம் மற்றும் கால்களை மூடும் ஷூக்கள் ஆகியவற்றை அணிந்து மருந்தைக் கையாள வேண்டும். 3. காற்றடிக்கும் திசையில் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும், மருந்து உடல் மீதி தெறிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். 4. தெளிப்பான் கூம்பு முனையை வாய் வைத்து ஒருபோதும் ஊதக் கூடாது, அடைபட்டிருக்கும் கூம்பு முனையை மெல்லிய குச்சி அல்லது பிரஷ் பயன்படுத்தி அடைப்பை நீக்க வேண்டும். 5. மருந்து ஒருவேளை உடல் மீது தெறித்துவிட்டால், நிறைய தண்ணீரில் நன்றாகச் சோப்பு போட்டு சுத்தமாகக் குளிக்க வேண்டும். 6. சரிவர மூடப்படாத உடல் பகுதிகள் மற்றும் கைகால்களை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து கொண்ட பிறகே சாப்பிடுதல், குடித்தல் அல்லது புகைபிடித்தல் செய்ய வேண்டும், மாசடைந்த ஆடைகளைக் கழற்றி அவற்றைத் தனியாகத் துவைத்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

எச்சரிக்கைகள்: 1. இந்த லேபில் மற்றும் கையேட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கும் பயிர்களைத் தவிர்த்து வேறு பயிர்கள் மீது தெளிக்கக் கூடாது. 2. இது நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு கொடிய நஞ்சாக செயல்படும் என்பதால், நீர் நிலைகள், செயற்கை மீன் வளர்ப்பு மற்றும் நீர் வேளாண்மை இடங்களுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: உமிழ்நீர் சுரத்தல், மயிர் கூச்செரிதல், அரிப்பு, நெஞ்சுக்கூட்டில் இறுக்கம், வியர்வை பெருக்கம், தாழ் இரத்த அழுத்தம், குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, வெப்பக் குறைபாடு, தள்ளாட்டம் ஆகியவை தோன்றலாம்.

முதலுதவி: விழுங்கியிருந்தால்: நோயாளி சுயநினைவுடன் விழிப்புடன் இருந்தால், வாயைக் கொப்பளிக்கச் செய்து 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கச் செய்யுங்கள். சுயநினைவு தவறியிருப்பவர்களுக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவரைக் கூப்பிட வேண்டும். மருத்துவரின் மேற்பார்வை இல்லாமல் நோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. **சுவாசித்திருந்தால்:** நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, உடல் தட்பவெப்பத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். ஒருவேளை நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், வாயுடன் வாய் வழியாக ஊதி செயற்கை சுவாசமளிக்க வேண்டும். மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். **மருந்து சருமத்தில் பட்டிருந்தால்:** நன்றாகக் குளிக்க வேண்டும். சோப்பு போட்டு நிறைய தண்ணீர் ஊற்றி குளிக்க வேண்டும். விரல் நகங்களின் கீழ் தலை முடி அனைத்தையும் நன்றாகச் சுத்தம் செய்து குளிக்க வேண்டும். வலி, கன்றுதல் அல்லது உறுத்தல் உணர்வுகள் தொடர்ந்திருந்தால், மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற வேண்டும், மாசுபட்ட ஆடைகளை தனியாக நன்றாக சோப்பு போட்டு துவைத்த பிறகே மறுஉபயோகம் செய்ய வேண்டும். **கண்களில் பட்டிருந்தால்:** கண்களை நன்றாக அலம்பிக்கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து 15 நிமிடங்கள் வரை கண்களில் தண்ணீரை அடித்து கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். வலி, உறுத்தல், கன்றுதல் அல்லது பிரகாசத்தை சகிக்க முடியாத நிலைமை இருந்தால், கண் மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற வேண்டும்.

நச்சு முறிவு: குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சைஅளிக்கவும்.

சேமிப்பு: 1) பூஞ்சணக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்களை அதன் தன்மை மற்றும் அளவை பொருத்து மற்ற பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தனியான அறையில் அல்லது கட்டிடங்களில் அல்லது தனியான அலமாரியில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும். 2) சேமிப்பு அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்து, நல்ல வெளிச்சம், காற்றோட்டம், ஈரத் தன்மையினால் மாசு ஏற்படுவதை தவிர்க்க போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

அகற்றுதல்: 1. காலி கொள்கலன்களை மறுஉபயோகம் செய்வது ஆபத்தானது. காலி கொள்கலன்களை மூன்று முறை அலம்பி சுத்தம் செய்து சுத்தம் செய்த நீரை தெளிக்கும் கரைசலுடன் சேர்த்து தெளித்துவிட வேண்டும். 2. பேக்கேஜ்களை உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதைக்கவும்.3. உபயோகித்த பேக்கேஜ்களை மறுமுறை பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக்கூடாது. 4. பேக்கேஜ்கள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் கழுவுநீர் முதலியவற்றை சுற்றுப்புற சூழல் அல்லது நீர் நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பான அறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டியது மருந்தின் உற்பத்தியாளர்கள், மற்றும் உபயோகிப்பவர்களின் கடமை ஆகும்.

உற்பத்தி - எஃப்எம்சி இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், பதிவு அலுவலகம்: டிசிஜி ஃபைனான்ஷியல் சென்டர், 2வது தளம், சி-53, பாந்திரா குர்லா காம்ப்ளெக்ஸ், பாந்திரா (கி), பாந்திரா சபர்பன், மும்பை - 400098, மகாராஷ்டிரா, இந்தியா. **தொழிற்சாலை:** லேன் - 2, ஃபேஸ்-1, ஸிட்கோ இன்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ், பாரி பிராமணா, மாவட்டம் ஜம்மு (ஜே-கே).

ವೆಲ್‌ಝೊ™
ವಾಲಿಫೆನಲೇಟ್ 6% + ಮ್ಯಾಂಕೊಝೆಬ್ 60% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ
ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಉದ್ದೇಶ: ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ

ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ಪಂಗಡ : ವಾಲಿಫೆನಲೇಟ್ 6% + ಮ್ಯಾಂಕೊಝೆಬ್ 60% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ, ಇದು ವಾಲಿಫೆನಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಕೊಝೆಬ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯ ಆದಿಯ ಸುಡುರೋಗ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಿತ ಸುಡುರೋಗ, ಬಟಾಟೆಯ ವಿಳಂಬಿತ ಸುಡುರೋಗ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಡೌನಿ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಹೆಸರು	% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ವಾಲಿಫೆನಲೇಟ್ ಸ. ಘ.	6.0
ಮ್ಯಾಂಕೊಝೆಬ್ ಸ. ಘ.	60.00
ಸೋಡಿಯಮ್ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	4.0
ಅಮೋನಿಯಮ್ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	4.0
ಮಿಥೈಲ್ ನ್ಯಾಫ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್	3.0
ಫೊರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್,	
ಇ1218ಅಲ್ಕೈಲ್ (ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ) ಎಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಯುಕ್ತ	
ಪಾಲಿಮರ್ಸ್	3.0
ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲೊ, ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್	0.50
ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಿಟ್ರೇಟ್	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.
ಒಟ್ಟು	100.00

ಬಳಕೆ/ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:

ಬೆಳೆಗಳು	ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ರೋಗಗಳು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಥ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿ.ಲೀ)	ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನೀರು (ಲೀ)	
ಟೊಮೆಟೊ	ಆರಂಭಿಕ ಅಂಗಮಾರಿ ಅಂತ್ಯದ ಅಂಗಮಾರಿ	120+1200 150+1500	2000 –2500	500	5
ಬಟಾಟೆ	ಅಂತ್ಯದ ಅಂಗಮಾರಿ	120+1200 150+1500	2000 –2500	500	20
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಬೂಜಿ ರೋಗ	120+1200	2000	750	14

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ, ಗರಿಷ್ಠ ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ ಬೆಳೆಯ ಹಂತ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಕಾಲಾಂತರಗಳು : ರೋಗದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ/ ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ, ಇವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಜನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬಟಾಟೆ ಹಾಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಮತೆ ತೋರಲು, ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ.

ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಉಪಚರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನ್ನು ಅಳೆದು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿರಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಯುತ್ತ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿರಿ.

ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ನಾಜಲ್ ವಿಧ: ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾದ ಕವರೇಜ್‌ಗಾಗಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಹಾಲೊ ಕೋನ್ ನಾಜಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಂತಹ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಣಾ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ.

ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದಾದ ಹಂತ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಸ್ಯ–ವಿಷಕಾರಿತ್ವ : ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಡೊಸೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರು–ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: ಸಿಂಪಡಣೆಯು ಒಣಗುವವರೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ.

ಪಂಗಡ **40** **ಎಮ್ 03** ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಪ್ರತಿರೋಧಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ:

1. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಮೈಡ್‌ಗಳನ್ನು (ಇಎಎ) ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

2. ಸಿಂಪರಣಾ ಕ್ರಾಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ , ಇತರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಡೌನಿ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ – ವಿಳಂಬಿತ ಸುಡುರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಮೈಡ್‌ಗಳ (ಇಎಎ) ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮೀರದೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 50%ನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಿ.

4. ಬಟಾಟೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಳಂಬಿತ ಸುಡುರೋಗ – ವಿಳಂಬಿತ ಸುಡುರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 50%ನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 2. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬು ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್, ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಗ್ಲೌಸ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಮಂಡಿಯವರೆಗೂ ಮುಚ್ಚುವ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. 3. ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ತುಂತುರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಾಜಲ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಬೇಡಿ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಾಜಲ್ ಅನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. 5. ಸಿಂಪಡಣೆಯು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ದೇಹದ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 6. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಂರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಲೇಬಲ್/ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಈ ಉತ್ಪಾದನವು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಜೊಲ್ಲುಸುರಿಯುವಿಕೆ, ಪೈಲೊರಿಯೆಕ್ಷನ್, ತುರಿಕೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗುವು, ಎದೆ ಬಡಿತ ಏರಿಕೆ, ಹೈಪೊಟೆನ್ಷನ್, ಪಿತ್ತೋದ್ರೇಕ, ವಾಂತಿ, ಅತಿಭೇದಿ, ಹೈಪೊಥರ್ಮಿಯಾ ಮತ್ತು ತವಕ ತೋರಿಬರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ : ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಬಳಿಕ 1 ಅಥವಾ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. **ಉಸಿರಿನಮೂಲಕ ಒಳಸೇರಿದಲ್ಲಿ:** ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲಿದಲ್ಲಿ:** ವಿಷಧ ತಗಲಿದ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇರಳನೀರು ಬಳಸಿ ಸಾಧ್ಯಂತವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಹಾಗುರುಗಳನ್ನೂ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಉರಿ ವಾಸಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. **ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ :** ಕನಿಷ್ಠ15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೋವು, ಕೆಂಗಣ್ಣು, ಉರಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ನೋಡಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಶೇಖರಣೆ: .1 ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನುಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲವೆ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಿ. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಿರುವ ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣವೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕೂ ಇರಬೇಕು. ಹಬೆಯಿಂದಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕೀಟನಾಶಕದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಲಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಲಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಣಾ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು. 3.ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 4. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು, ತಯಾರಕರು, ಸೂತ್ರೀಕರಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಬಳಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು: ಎಫ್‌ಎಂಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೆಜಿ. ಆಫೀಸ್ : ಟಿಸಿಜಿ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ–53, ಬಾಂದ್ರಾಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪೂ), ಮುಂಬಯಿ, ಬಾಂದ್ರಾ ಸುಬರ್ಬನ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ–400098, ಭಾರತ. **ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ:** ಲೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ–2, ಫೇಸ್–1, ಸಿಡ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸಾಂಬಾ, ಜಮ್ಮು(ಜೆ–ಕೆ)– 181133.

ভেলজো™
ভ্যালিফেনালেট ৬%+ম্যানকোজেব ৬০% ডাবলুজি
ছত্রাকনাশক

উদ্দেশ্য: কৃষিকাজের ব্যবহারের জন্য

সূচনা এবং ফসল ও কীটের সমষ্টি : ভ্যালিফেনালেট ৬% + ম্যানকোজেব ৬০% ডাবলুজি ভ্যালিফেনালেট এবং ম্যানকোজেব ছত্রাকনাশকের সংমিশ্রণ যা টোম্যাটো ফসলে আগাম ধ্বসা এবং নাবী ধ্বসা রোগ, আলু ফসলে নাবী ধ্বসা এবং আঙ্গুর ফসলে ভুলা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

রাসায়নিক গঠন

নাম	% ওজন/ওজন
ভ্যালিফেনালেট সক্রিয় উপাদান	৬.০০
ম্যানকোজেব সক্রিয় উপাদান	৬০.০০
সোডিয়াম লিগ্রোসালফোনেট	৪.০০
অ্যামোনিয়াম লিগ্রোসালফোনেট	৪.০০
মেথিল ন্যাপ্থ হালিন সালফোনিক অ্যাসিড	৩.০০
ফর্মেল্ডিহাইড, সোডিয়াম সল্টের সহ পলিমার	
সালফিউরিক অ্যাসিড, সি- ১২ - ১৮- অ্যাল্কাইল	৩.০০
(জোড় সংখ্যাযুক্ত)	
ইস্টার, সোডিয়াম সল্ট	
ফ্যাটি অ্যাসিড , ট্যালো, সোডিয়াম সল্ট	০.৫০
সোডিয়াম সাইট্রেট	কিউ.এস
মোট	১০০.০০

ব্যবহারের নির্দেশাবলী / ব্যবহারের কৌশল:

ফসল	যে রোগগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়	হেক্টর পিছু মাত্রা			শেষ স্প্রে এবং ফসল তোলার মধ্যে অপেক্ষাকাল (দিন)
		সাউঃ (গ্রাম / হেক্টর)	ফর্মুলেশন (গ্রাম / হেক্টর)	জলমিশ্রণের জল (লিটার)	
টোম্যাটো	আগাম ধ্বসা এবং নাবী ধ্বসা	১২০+১২০০ ১৫০+১৫০০	২০০০ – ২৫০০	৫০০	৫
আলু	নাবী ধ্বসা	১২০+১২০০ ১৫০+১৫০০	২০০০ – ২৫০০	৫০০	২০
আঙ্গুর	ভুলা রোগ	১২০+১২০০	২০০০	৭৫০	১৪

পদ্ধতি এবং প্রয়োগের সময়, কত বার প্রয়োগ যার মধ্যে রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যায় ব্যবহার এবং প্রয়োগের সময় ফসলের দশা: রোগ বৃদ্ধির জন্য যখন আবহাওয়া পরিস্থিতি উপযুক্ত হবে অথবা অঙ্গজ বৃদ্ধি ফুল ধরার সময় রোগের উপসর্গ দেখা মাত্রই প্রয়োগ করবেন। একটি মরশুমে টোম্যাটো ফসলে দু বারের বেশি এবং আলু ও আঙ্গুর ফসলে চার বারের বেশি প্রয়োগ করবেন না। সেরা ফলাফল পেতে, রোগের তীব্রতা অনুযায়ী পাতার উপর ১০ দিনের ব্যবধানে পরপর স্প্রে প্রয়োগ করবেন।

মেশানোর জন্য নির্দেশাবলী: যে এলাকায় প্রয়োগ করা হবে সেই অনুসারে পণ্যের প্রয়োজনীয় মাত্রা মেপে আলাদা করে নিন এবং অল্প মাত্রায় জলে ভালো করে মেশান। সেই ইউনিট এলাকায় উদ্ভিদের উপর যথাযথ কভারেজের জন্য অবশিষ্ট জল খুব ভালো করে নাড়িয়ে মিশিয়ে নিন।

স্প্রে সরঞ্জাম এবং নজলের প্রকার: উচ্চ মাত্রার স্প্রে করার সরঞ্জাম, যেমন যথাযথ এবং সমান কভারেজ নিশ্চিত করতে হলো কোন নজল লাগিয়ে ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার ব্যবহার করুন।

আবহাওয়ার সাধারণ পরিস্থিতি: প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ এড়িয়ে চলুন।

সেই সব অবস্থা যখন যে কোনও ফসলের উপর কীটনাশকের ব্যবহার করা উচিত নয়: প্রযোজ্য নয়।

ফাইটো-টক্সিসিটি: সুপারিশ করা মাত্রায় এই পণ্যটি ফাইটো-টক্সিক নয়।

মাটি এবং জল: কোনও নির্দিষ্ট প্রকারের মাটি এবং জল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই।

পুনঃ প্রবেশ: চিকিৎসা করা স্থানে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত প্রবেশ করবেন না যতক্ষণ না স্প্রে শুকিয়ে যাচ্ছে।

গ্রুপ **৪০** **এম ০৩** ছত্রাকনাশক

প্রতিরোধী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিবৃতি:

১. প্রতিরোধমূলক পদ্ধতিতে বিশেষভাবে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড এমাইড (সিএএ) ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করুন।

২. স্প্রে কার্যসূচিতে অন্যান্য কার্যপ্রনালি সমৃদ্ধ ছত্রাকনাশকের সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়।

৩. আঙ্গুর – ভুলারোগ: রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য অভীষ্ট মোট প্রয়োগ সংখ্যার সর্বাধিক ৫০% প্রয়োগ করুন কিন্তু একটি ফসল চক্রে ৪ কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড এমাইড (সিএএ) ছত্রাকনাশক স্প্রে অতিক্রম করবেন না।

৪. আলু এবং টোম্যাটো ফসলে নাবী ধ্বসা রোগে– নাবী ধ্বসা রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে অভীষ্ট মোট প্রয়োগ সংখ্যার সর্বাধিক ৫০% প্রয়োগ করুন।

সুরক্ষা সম্পর্কিত সতর্কতা: ১. পণ্য ব্যবহারের সময় খাদ্য, পানীয় গ্রহণ করবেন না, ধূমপান করবেন না অথবা পান পাতা চিবোবেন না। ২. পণ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় পুরো হাতার জামা, ফুল প্যান্ট, রসায়ন রোধী দস্তানা, মাস্ক পরুন এবং পা ঢাকা জুতো পরুন। ৩. গায়ে স্প্রে-র মিহি কণা যাতে না আসে তাই হাওয়া চলাচলের দিকে স্প্রে করা থেকে বিরত থাকুন। ৪. মুখ দিয়ে ফুঁ দিয়ে নজল পরিষ্কার করবেন না, বন্ধ নজল গাছের সরু ডাল বা ব্রাশের সাহায্যে পরিষ্কার করুন। ৫. যদি কোনও ভাবে গায়ে দ্রবণ চলকে পড়ে, তাহলে সংক্রামিত অংশ প্রচুর জল এবং সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৬. খাদ্য গ্রহণ, পানীয় গ্রহণ অথবা ধূমপান করার পূর্বে এবং পণ্য ব্যবহারের পরে হাত ও দেহের খোলা অংশ খুব ভাল করে ধুয়ে নিন। ব্যবহারের পরে সংক্রামিত জামা কাপড় খুলে ফেলুন এবং আলাদা করে ধুয়ে ফেলুন।

সতর্কতা: ১. লেবেল লিফলেটে নির্দেশিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ২. এই পণ্য জলজ প্রাণীদের জন্য বিষাক্ত, তাই জলাশয়, জলজ চাষ অথবা মৎস্য পালন এলাকার নিকট ব্যবহার করা উচিত নয়।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: লাল ঝরা, পাইলোরিয়েশন, চুলকানি, বুকে আঁটসাঁটতা, ধড়ফড়, উচ্চ রক্তচাপ, বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, হাইপোথার্মিয়া এবং অ্যাটাক্সিয়া হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা : যদি মুখে চলে যায়: যদি ব্যক্তি সচেতন থাকে তবে মুখ ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে এবং ১ বা ২ গ্লাস জল খেতে দিতে হবে। অচৈতন্য ব্যক্তিকে কিছু খাওয়াতে যাবেন না। ডাক্তার ডাকুন। বমি করানোর চেষ্টা করবেন না যদি না তা প্রয়োজন পড়ে, চিকিৎসকের সাহায্য নিন। **যদি নিঃশ্বাসে চলে যায়:** রোগীকে খোলা হাওয়ায় নিয়ে যান এবং শরীরের তাপমাত্রার ওপর লক্ষ্য রাখুন। রোগী যদি শ্বাস না নেয় বা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করুন, বিশেষত, মুখে মুখে শ্বাস প্রদান ক্রিয়া। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। **যদি ত্বকে লেগে যায় :** লেগে যাওয়া জায়গা অনেক জল ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। এমন কি চুল ও নখের ভেতরও। যদি ব্যথা হয়, লাল হয়ে যায় বা জ্বালা করে, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সমস্ত লেগে যাওয়া জামা কাপড় আলাদা রাখতে হবে। পুনরায় ব্যবহারের আগে ভালো করে সাবান জলে ধুয়ে নিতে হবে। **চোখে চলে গেলে :** কমকরে ১৫ মিনিট ধরে চোখ জলে ধুতে হবে। যদি ব্যথা হয়, জ্বালা করে, লাল হয় বা ঝাপসা দেখে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রতিষেধক: সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

মজুতকরণ : ১. ছত্রাকনাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য পদার্থ মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে অথবা উইপোকানাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রাখতে হবে। ২. ছত্রাকনাশক মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানটি হতে হবে সুনির্মিত শুকনো, সু-আচ্ছাদিত, বাতাসিত এবংবাষ্পতার দ্বারা হওয়া সংক্রমণ এড়াতে পর্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

খালি পাত্রগুলির নিষ্পত্তি: ১. খালি পাত্রগুলির পুনর্ব্যবহার বিপজ্জনক। পাত্রগুলি তিনবার জলে ধুয়ে নেওয়া উচিৎ এবং পাত্র ধোওয়া দ্রবণ তৈরি করা স্প্রে মিশ্রণে ঢেলে দেওয়া উচিৎ। ২. প্যাক ভেঙে জনবসতী থেকে দূরে পুঁতে ফেলবেন। ৩.ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৪. ছত্রাকনাশকর নির্মাতা, ফর্মূলকারী তথা অপারেটারের ইহা আবশ্যিক কর্তব্য যে প্যাক বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং ধোয়ানী তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে, যাতে পরিবেশ বা জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়।

প্রস্তুতকর্তা ও বিক্রেতা: এফএমসি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, রেজি. অফিস: টাসীজী ফাইনেন্সিয়েল সেন্টার, ২য় তল, সী-৫৩, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূ.), বান্দ্রা সবর্বন, মুম্বই - ৪০০০৯৮, মহারাষ্ট্র। **ফ্যাক্টরি:** লেন-২, ফেজ-১, সিডকো ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, বারি ব্রহ্মনা, জেলা-জম্মু (জম্মু ও কশ্মীর)।

ਵੇਲਜ਼ੋ™
ਵੈਲੀਫ਼ੇਨਾਲੇਟ ੬% + ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ੬੦% ਡਬਲਯੂਜੀ
ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ

ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ।

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਸਮੂਹ: ਵੈਲੀਫ਼ੇਨਾਲੇਟ ੬% + ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ੬੦% ਡਬਲਯੂਜੀ ਵੈਲੀਫ਼ੇਨਾਲੇਟ ਅਤੇ ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਗੇਤੀ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ,ਆਲੂਆਂ ਵਿਚ ਪਛੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਏਂਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ:

ਨਾਮ	%ਵ/ਵ
ਵੈਲੀਫ਼ੇਨਾਲੇਟ ਏ.ਆਈ	੬.੦੦
ਮੈਨਕੋਜ਼ੇਬ ਏ.ਆਈ	੬੦.੦੦
ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫ਼ੋਨੇਟ	੪.੦੦
ਅਮੋਨੀਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫ਼ੋਨੇਟ	੪.੦੦
ਮੇਥਾਈਲ ਨਾਫ਼ਥਾਲੀਨ ਸਲਫ਼ੋਨਿਕ ਏਸਿਡ,	
ਪੋਲੀਮਰ ਵਿਦ ਫ਼ਾਰਮੇਲਡੀਹਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ	੩.੦੦
ਸਲਫ਼ਿਊਰਿਕ ਏਸਿਡ, ਸੀ ੧੨–੧੮– ਅਲਕਾਈਲ	
(ਈਵਨ ਨੰਬਰਡ) ਈਸਟਰਜ਼, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟਸ	੩.੦੦
ਫ਼ੈਟੀ ਏਸਿਡਜ਼, ਟੈਲੋ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟਸ	੦.੫੦
ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਈਟ੍ਰੇਟ	ਕਿਊ. ਐਸ.
ਕੁੱਲ	੧੦੦.੦੦

ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ:

ਫ਼ਸਲ	ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਮਾਤਰਾ			ਆਖ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
		ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ/ਹੈ.)	ਫ਼ਾਰਮੂ (ਗ੍ਰਾ/ਹੈ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲਿ.)	
ਟਮਾਟਰ	ਅਗੇਤੀ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ	੧੨੦+੧੨੦੦ ੧੫੦+੧੫੦੦	੨੦੦੦ ਤੋਂ ੨੫੦੦	੫੦੦	੫
ਆਲੂ	ਪਛੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ	੧੨੦+੧੨੦੦ ੧੫੦+੧੫੦੦	੨੦੦੦ ਤੋਂ ੨੫੦੦	੫੦੦	੨੦
ਅੰਗੂਰ	ਰੂਏਂਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ	੧੨੦+੧੨੦੦	੨੦੦੦	੭੫੦	੧੪

ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਸ਼ਮੂਲ ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਵਰਤਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ: ਵਨਸਪਤਿਕ/ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ।

ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ : ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਕ ਫ਼ਸਲੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜੇ ਲਈ, ਰੋਗ ਦੀ ਸ਼ਿਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ੧੦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਦਵਾ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ: ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਲਈ ਦਵਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਿਲਾ ਲਓ।

ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਕਾਰ: ਹਾਈ ਵਾਲਿਊਮ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵਰਤੋ ਜਿਵੇਂ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫ਼ੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛਿੱਟ ਕਰੋ ਹਾਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ: ਵਿਪਰੀਤ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਉਹ ਅਸਥਿਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।

ਪੌਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਨ: ਸੁਝਾਈਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ: ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਾਪਸੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣ ੨੪ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਗਰੁੱਪ **੪੦** **ਐਮ੦੩** ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ

ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਆਨ:

੧. ਕਾਰਬੋਸਾਈਲਿਕ ਏਸਿਡ ਅਮਾਈਡਸ (ਸੀਏਏ) ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।

੨. ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ–ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ।

੩. ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਰੂਏਂਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ– ਇਕ ਫ਼ਸਲੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਬੋਸਾਈਲਿਕ ਏਸਿਡ ਅਮਾਈਡਸ (ਸੀਏਏ) ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਸਪ੍ਰੇਆਂ ੪ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਹੀ, ਇੱਛਿਤ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ੫੦% ਹੀ ਵਰਤੋ।

੪. ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ– ਪਛੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛਿਤ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ੫੦% ਹੀ ਵਰਤੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧. ਦਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ ਨਾ ਹੀ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਾਨ ਚਬਾਓ। ੨. ਦਵਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੋ ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਪਤਲੂਨ, ਰਸਾਇਣ ਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟ। ੩. ਹਵਾ ਵਗਣ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ੪. ਡੱਕੀ ਗਈ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਤੀਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ੫. ਜੇ ਦਵਾ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ੬. ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣਢੱਕੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਦਵਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧੋ ਲਓ।

ਸਾਵਧਾਨੀ : ੧. ਲੇਬਲ/ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ ।੨. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਨ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਲਾਰ ਟਪਕਣੀ ਪੀਲੋਰੀਐਕਸ਼ਨ, ਖ਼ਾਰਿਸ਼, ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਕੜਨ, ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਅਤੇ ਅਟਾਕਸੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ: ਜੇ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ੧ ਜਾਂ ੨ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਚਾਹੇ। **ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ:** ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। **ਚਮੜੀ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:** ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਗ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। **ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ:** ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਚਾਨਣ–ਤ੍ਰਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਸਟੋਰੇਜ : ੧. ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ੨. ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰੇ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ੩. ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ੪. ਇਹ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫਾਰਮੂਲੇਟਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ: ਐਫ਼ਐਮਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ: ਟੀਸੀਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸੈਂਟਰ, ੨ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸੀ–੫੩, ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਾਂਦਰਾ(ਪੂ), ਬਾਂਦਰਾ ਸਬਰਬਨ, ਮੁੰਬਈ – ੪੦੦੦੯੮, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ੍ਰਾ। **ਫ਼ੈਕਟਰੀ:** ਲੇਨ–੨, ਫ਼ੇਜ਼ – ੧, ਸਿਡਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਾੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ –ਜੰਮੂ (ਜੇਐਂਡਕੇ)।