FMC

Tuventa™

INSECTICIDE

Manufactured By:
FMC India Private Limited,
Regd. Office : TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra.
Factory : Plot No.11, G.I.D.C. Savli, Village : Manjusar, District : Vadodara-391775, Gujarat.
Marketed By:
FMC India Private Limited,
Regd. Office : TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra.
In case of complaints, please contact
Customer Cell :- 1800 102 6545 or
Email :- Ask@fmc.com or
write at Regd. Office address
of FMC India Private Limited.

FMC, the FMC logo, Tuventa, Rynaxypyr and ટુવેંટા, ટુવેંટા, ઇઝબ, ઇવેલ્ન્ટ, ઇઝબ્રુ, ટુવેંટા, and ફ્રિલ્ડ્સ are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.
©2025 FMC Corporation. All rights reserved.

Tuventa™

CHLORANTRANILIPROLE 47.85% W/W SC (INSECTICIDE)

PURPOSE: For Agricultural Use

CROP & PEST GROUP: Chlorantraniliprole 47.85% w/w SC is an Anthranilic diamide insecticides. It is a board spectrum insecticide and recommended for controlling lepidopteran pests of sugarcane, maize, rice, chickpea, red gram, green gram, soybean, groundnut, cotton, chilli and tomato.

Recommendation:

Crops	Common Name of Pest	Dosage per hectare g a.i.	Dosage per hectare Formulation (ml)	Dilution in Water (ltr)	Pre-harvest interval (in days)
Sugarcane	Early shoot borer *(Chilo infuscatellus)*, Top Borer (*Scirpophaga excerptalis*). Stalk borer (*Chilo auricilius*)	75	125	1000	214
Maize	Fall armyworm *(Spodoptera frugiperda)* Stem borer *(Chilo partellus)* Pink stem borer *(Sesamia inference)*	40-50	66.60-83.30	500	87
Rice	Yellow stem borer (*Scirpophaga incertulas*). Rice leaf folder (*Cnaphalocrocis medinalis*)	30	50	500	47
Chick pea	Pod borer (*Helicoverpa armigera*) Tobacco caterpillar (*Spodoptera spp.*)	25	41.66	500	26
Red gram	Pod borer (*Helicoverpa armigera*) Spotted pod borer (*Maruca spp.*)Pod fly (*Melanagromyza obtusa*)	30	50	500-750	31
Green gram	Pod borer (*Helicoverpa armigera*) Tobacco caterpillar (*Spodoptera litura*) Green semilooper (*Chrysodeixis acuta*) Spotted pod borer (*Maruca testulalis*)	25	41.67	400-600	26
Soy-bean	Tobacco caterpillar (Spodoptera litura) Girdle beetle (Oberecopis brevis) Stem fly (Melan-agromyza spp.) Green semilooper (Chrysodeixis acuta)	30	50	500	44
Grou-ndnut	Tobacco caterpillar (*Spodoptera litura*) Groundnut leaf miner (*Aproaerema modicella*)	30	50	400-500	34
Cotton	American Boll worm (*Helicoverpa armigera*) Tobacco caterpillar (*Spodoptera litura*)	30	50	500	67
Chilli	Fruit borer (*Helicoverpa armigera*) Tobacco caterpillar (*Spodoptera litura*) Beet armyworm (*Spodoptera Exigua*)	30	50	400-500	3
Tomato	Tobacco caterpillar (*Spodoptera litura*) Fruit borer (*Helicoverpa armigera*)	30	50	400-500	3

Direction for use, Manner and time of application and application techniques, frequency including maximum no of sprays and crops stage of application-days after sowing : 1. Sugarcane: Single application as drenching over sugarcane setts for control of early shoot borer, top borer and stalk borer at the timeof planting. Application can also be done as soil drench at the base of newly emerged sugarcane seedlings at first (palevaplanting) or second irrigation (dry planting). For the management of later broods of top borer(3rd to 5th), single applicationcan be done as soil drench in the month of May-June. Don't make more than one application in a crop cycle. **2. Maize:** For the management of borers and fall armyworm, first application shall be done as foliar spray at 2-3 leaf stage of cropfollowed by second application at 10 days after first application. Don't make more than two applications in a crop cycle. **3. Crops other than sugarcane and maize :** Initiate first foliar application when pest reaches to ETL (Economic Threshold Level) followed by second application at10-14 days interval depending upon the pest pressure. Don't make more than two applications in a crop cycle.

Equipment type & nozzle type: Knapsack sprayer (Manual/Battery operated) / Foot sprayer with hollow cone nozzle.

Dosage : Please refer the recommendation table.

Instructions for Mixing: Take the recommanded quantity of Chlorantraniliprole 47.85% SC and add it to small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously.

Weather condition in general: Avoid application during adverse weather conditions.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Not applicable.

Soil and water: No specific soil and water management is required.

Re-entry: Do not enter treated areas for 24 hours until sprays have dried.

Pre Harvest Interval(PHI): Please refer recommendation table.

Precautions to be taken to avoid harm to beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: Not Applicable

Safety Precautions: 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while applying the product . 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, mask, goggles and covered shoes while handling the product. 3. Avoid spray drift onto the spraying person by spraying with the direction of the wind. 4. Do not blow the spray nozzle with mouth, clean the blocked nozzle with a thin stem or brush.5. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water. 6. Wash hands and unprotected parts of the body properly after handling and before eating, drinking or smoking. Remove and wash contaminated clothing separately after use.

Instruction for storage:1. The packages containing the insecticide shall be stored in original container in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed or shall be kept in a separate almirah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour of insecticide.

Disposal of used container:1. **Dangerous to re-use empty containers.** 2. Triple pressure rinse containers before disposal. Add rinsing to spray tank. Do not dispose of undiluted chemicals on site or into waterways. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation. 4. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 5. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner as to prevent environmental and water pollution.

Symptoms Of Poisoning: May cause mild eye and skin irritation.

First Aid:1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the person to fresh air and take care of body temperature. If person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Antidote Statement: No specific antidote is available, treat symptomatically.

Chemical Composition:	**% w/w**
Chlorantraniliprole a.i .	47.85
Methyl methacrylate ethoxylated graft copolymer	4.00
Sodium alkylnaphthalenesulfonate, formaldehyde condensate	2.00
2,4,7,9-Tetramethyldec - 5 - yne-4,7- diol	0.50
Polyalkylene oxide block copolymer	2.00
Alcohols,C11-14 - iso-, C13 - rich,ethoxylated	0.30
Hydrated aluminum magnesium silicate	0.50
Aqueous solution based on: Hydrocarbons, Organopolysiloxanes, modified	0.50
Xanthan gum	0.10
1,2- propanediol	3.00
1,2,3-Propanetriol	3.00
Mixture containing 5- Chloro-2 methyl-2H-isothiazol -3-one and 2- Methyl 2H-isothiazol-3 one	0.10
Water	q.s.
Total	100

Cautionary statement: 1. Not to be used for any purpose other than specified on label/leaflet. 2. This product is toxic to silkworms. Do not allow drift to nearby mulberry plantations and silk worm culture facilities. Do not rotate mulberry plantations after crops where chlorantraniliprole based formulation was commonly used in foliar or soil applications. 3. Avoid direct application, drift or diesposal of product into waterys.4. This product is toxic to aquatic organisms and fresh water fish with long lasting effects thus product containing molecules may be avoided near aquaculture and should not be applied when bees are actively foraging.

Manufactured by : FMC India Private Limited, Registered Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra.
Factory: Plot No.11, G.I.D.C. Savli, Village : Manjusar, District : Vadodara-391775, Gujarat.
Marketed by : FMC India Private Limited, Registered Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra.

टुवेंटा™
क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल ४७.८५% भार/भार एस सी (कीटनाशक)

प्रयोजन: कृषि उपयोग हेतु।

फसल और कीट समूह : क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल ४७.८५% भार/भार एस सी एक एंथेनिलिक डायमाइड कीटनाशक है। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है और जिसे गन्ना, मक्का, चावल,चना अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, मिर्च, और टमाटर में शल्कपंखी कीटों को नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जाता है।

उपयोग:

फसलें	कीट का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर स.तत्व (ग्रा)	मात्रा प्रति हेक्टेयर फ़ॉर्मूलेशन (मिली)	पानी की मात्रा (ली.)	कटाई-पूर्व अन्तराल (दिनों में)
गन्ना	रूमबुड (शूट इन्स्टालता), पेंटी बेधक (सिरपोफाग इक्सार्टेलिस) ताई बेधक (शूटो स्पुलस्टेलर)	७५	१२५	१०००	२१४
मक्का	फॉल आर्मीवर्म (स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपेर्डा) तना छेदक(कपले पारटेला) गुलाबी तना छेदक(सेसामिया इनफेरेन्स)	४०-५०	६६.६०-८३.३०	५००	८७
चावल	पीला तना छेदक (सिरपोफेगा इनकर्टुलास) धान की पत्ता लपेट (नैक्लोकोप्टोसिस मेडिनेलिस)	३०	५०	५००	४७
चना	फल छेदक (हेलिकोवेरपा आर्मिगेरा) तम्बाकू इल्ली (स्पोडोप्टेरा लिथुरा)	२५	४१.६६	५००	२६
अरहर	फल छेदक (हेलिकोवेरा आर्मिगेरा) फ्लावेल फली छेदक (मक्सा स्पपोरे) फली मक्खी (मेलानोमाइजा सोइटूस)	३०	५०	५००-७५०	३१
मूंग	फल छेदक (हेलिकोवेरपा आर्मिगेरा) तम्बाकू इल्ली(स्पोडोप्टेरा लिटूरा) हरे सोयाबुस (क्रइसोडेक्सिस एक्यूटा),ग्रब्बेस्य फली छेदक (मक्सा टेस्टलोलिस)				
सोयाबीन	तम्बाकू इल्ली(स्पोडोप्टेरा लिटूरा) गिरडल बीटल(ओबेरेप्टोरिस ब्रेविस) हुक्कड़ सुंडी (क्राइसोडेक्सिस एक्यूटा)	३०	५०	५००	४४
मूंगफली	तम्बाकू सूंडी (स्पोडोप्टेरा लिटूरा) मूंगफली सुरंगी बीट (अप्रोएरेमा मोडीसेल्ला)	३०	५०	४००-५००	३४
कपास	अमेरिकन गोल सुंडी (हेलिकोवेरपा आर्मिगेरा) तम्बाकू इल्ल ली (स्पपोडोप्टेरा लिटूरा)	३०	५०	५००	६७
मिर्च	फल छेदक (हेलिकोवेरपा आर्मिगेरा) तम्बाकू इल्ली (स्पोडोप्टेरा लिटूरा) बीट आर्मिवर्म (स्पोडोप्टेरा एक्सिगुआ)	३०	५०	४००-५००	३
टमाटर	फल छेदक (हेलिकोवेरपा आर्मिगेरा) तम्बाकू इल्ली (स्पोडोप्टेरा लिटूरा)	३०	५०	४००-५००	३

उपयोग के लिए छेदा-निर्देश ,उपयोग का तरीका और समय और अनुप्रयोग तकनीक,छिड़काव की अधिकतम संख्या सहित आवृत्ति और फसल में आवेदन की अवस्था–बुवाई के बाद के दिन :

गन्ना: रोपाई के समय,कनसुआ,छोटी बेधक के नियंत्रण के लिए गन्ने के सेटों पर ड्रेंचिंग के रूप में एक बार ही प्रयोग करें। पहली (पैलेवा रोपण) या दूसरी सिंचाई(शुष्क रोपड़) के समय नए उभरे गन्ने के पौधों के अंकुरों में मिट्टी में ड्रेंचिंग के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। जोटीबेधक (तीसरे से पांचवे) के बाद की पीढ़ियों के रोकथाम के लिए मई–जून के महीने में मिट्टी में ड्रेंच के रूप में केवल एक बार इस्तक्षप प्रयोग किया जा सकता है। फसल चक्र में एक से अधिक बार प्रयोग न करें। **२.मक्का:** मक्के की फसल में छेधक और फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए, पहला अनुप्रयोग २–३ पत्तियों वाली फसल की अवस्था में पत्तों पर छिड़काव किया जाना चाहिए, उसके बाद दूसरा अनुप्रयोग पहले छिड़काव के १० दिन के बाद किया जाना चाहिए। फसल चक्र में दो से अधिक आवेदन न करें। ३. **मक्के और गन्ने के अलावा अन्य फसलें:** कीट के आर्थिक नुकसान की देहलीज (ई.टी.एल.) तक पहुंचने पर पहला अनुप्रयोग शुरू करें और इसके बाद कीट की संख्या के आधार पर १०–१४ दिनों के अंतराल पर दूसरी बार अनुप्रयोग शुरू करें। फसल चक्र में दो से अधिक अनुप्रयोग न करें।

उपकरण के प्रकार और नोजल प्रकार: नैपसैक स्प्रेयर (मैनुअल/बैटरी चालित)/ फुट स्प्रेयर होलो कोन नोजल के साथ।

खुराक: कृप्या अनुशंसा तालिका देखें।

मिलाने का निर्देश : क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल १८.८५% एससी की निर्धारित मात्रा लें, इसमें थोड़ा पानी मिलाएं, अच्छी तरह मिलाएं और फिर जोर से हिलाते हुए शेष मात्रा में पानी डालें।

मौसम की स्थिति: मौसम की प्रतिकूल स्थिति के दौरान प्रयोग से बचें।

फसल अवस्था जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहिए: लागू नहीं।

मिट्टी और पानी: किसी विशिष्ट मिट्टी और जल प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है।

पुन: प्रवेश: छिड़काव सूखने के २४ घंटे तक उपचारित खेतों में प्रवेश न करे।

फसल पूर्व अंतराल(पीएचआय): कृप्या अनुशंसा तालिका देखें।

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीडों से नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: लागू नहीं।

सुरक्षा सावधानियां : १. उत्पाद का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पिऐं, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। २. उत्पाद का प्रयोग करते समय पूरे बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रसायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, मास्क, चश्मा और ढके हुए जूते पहनें। ३. हवा की दिशा के साथ छिड़काव करते हुए छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर स्प्रे के बहाव से बचें। ४. स्प्रे नोजल को मुंह से न चलाएं, अवरुध्द नोजल को पतली सींक या ब्रश से साफ करें। ५. शरीर पर किसी भी रिसाव की स्थिति में, खुले हिस्सों को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं। ६. हाथों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों को उतारकर धोएं।

भंडारण के लिए निर्देश: १. कीटनाशक युक्त पैकेज को मूल कंटेनर में अलग कमरे में या परिसर में अन्य वस्तुएं रखे जाने वाले कमरे या परिसर से दूर, बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर, पशुओं के चारे से दूर अथवा अलग अलमारी में लाला और चाबी लगाकर रखना चाहिए। २. कीटनाशक के संग्रहण के लिए बने कमरे या परिसर अच्छी तरह निर्मित, खुरुक, अच्छी रोशनी वाले, और हवादार और वाष्प के साथ संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त आयाम वाले होने चाहिए।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. खाली डिब्बों का दुबारा प्रयोग खतरनाक। २. निपटान से पहले तीन बार दबाव के साथ डिब्बों को धोए। खंगाले हुए पानी को स्प्रे टैंक में डाल दें। विशुद्ध रासायनिक पदार्थ का निपटान स्थल या जलमार्ग में न करें। ३. डिब्बों को तोड़कर बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दें। ४. दुबारा प्रयोग को रोकने के लिए प्रयुक्तेत डिब्बों को खुले में न फेंकें। ५. यह कीटनाशक निर्माताओं तथा उपयोगकर्ता का कर्त्तव्य है की वह डिब्बों/ पैकेजिस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।

विष के लक्षण: आंख और त्वचा में हल्की जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: १. निगल लिए जाने पर: यदि व्यक्ति होश में और सचग है, तो कुल्ला कराएं और १ या २ गिलास पानी पीने को दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर के कहे बिना उल्टी न कराएं। २. सांस ले लेने पर: व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। ३. त्वचा से संपर्क होने पर: बालों और नाखूनों की जड़ों सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि दर्द, लालिमा या खुजली जारी रहे, तो डॉक्टर की सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग रखें और प्रयोग करने से पहले साबुन और कफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। ४. आंख से संपर्क होने पर: कम से कम १५ मिनट तक काफी सारे पानी से छींटे मारें। यदि दर्द, लालिमा, खुजली या फोटोफोबिया जारी रहे, तो आंखों के डॉक्टर की सलाह लें।

विषनाशक कथन : कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं है। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

रासायनिक संरचना:	**%भार/भार**
क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल सक्रिय तत्व:	४७.८५
मिथाइल मैथेक्राइलेट इथोक्सिलेटेड ग्राफ्ट कोपोलिमर	४.००
सोडियम अल्काइलनाफ्थालेनेसल्फोनेट, फोरमेल्डीहाइड कनडनसेट	२.००
२,४,७,९–टेट्रामिथाइलडेक–५–इन–४, ७–डिओल	०.५०
पोलीअलकईलीन ऑक्साइड ब्लॉक कोपॉलीमर	२.००
अल्कोहलरसी ११–१४– आक्सो, सी १३–रिच,इथोक्सीलेटेड	०.३०
हाइड्रेटेड एल्युमीनियम मेगनेशियम सिलिकेट	०.५०
अक्वियस सोलुशन बेसड ऑन: हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनोपोलीसाइलोक्सेन, मोडीफाइड	०.५०
ज़ेन्थन गम	०.१०
१, २ प्रोपेनडाईऑल	३.००
१,२,३– प्रोपेनट्रीइऑल	३.००
मिक्चरचर कंटेनिंग ५–क्लिरो–२ एच आइसोथयाजोल–३–वन एंड २– मिथाइल–२ आइसोथयाजोल–३–वन	०.१०
पानी	पर्याप्त मात्रा
कुल	१००.००

सुरक्षा सावधानियां : १. लेबल/ पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २. यह उत्पाद रेशम के कीडों के लिए विषाक्त है। मलबरी बगानों और रेशम कीडा पालन कि सुविधाएँ के पास बहाव न होने दें। फसलों के बाद मलबरी के बागानों को न लगाये जहां आमतौर पर क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल आधारित सूत्रीकरण का उपयोग पत्ते या मिट्टी में किया जाता हो। ३. उत्पाद का सीधे अनुप्रयोग,बहाव या निपटान, जलमार्गों में न करें। ४.यह उत्पाद जलीय जीवों , ताजे पानी की मछली और मधुमक्खियों के लिए कम विषैला होता है, इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जलीय कृषि के आसपास नही किया जाना चाहिए और जब मधुमक्खियाँ सक्रिय हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

निर्माता : एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफीस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी–५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र।

फैक्टरी: प्लॉट नं. ११, जी.आई.डी.सी., सावली, गांव: मंजुसार, जिल्हा: वडोदरा–३९१७७५, गुजरात. २ गांव निंबूआ, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर, तहसिल– देरा बस्ती, जिला: एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब–४४०५०७.

विक्रेता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफीस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी–५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र।

टुवेंटा™
क्लोरेन्ट्रानिलिप्रोल ४७.८५% व/ व एससी (कीटकनाशक)

हेतु: कृषि वापरा साठी।

पीक आणि कीटक गट : क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ४७.८५% व/ व एससी हे ॲंथ्रनिलिक डायमाइड कीटकनाशक आहे आणि उच्च, मका, भात, चणा, तूर डाळ, मूग, सोयाबीन, भुईमूग, कापूस, मिरची आणि टोमॅटोच्या लेपिडोप्टेरन कीटकांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केली जाते.

शिफारशी :

पीक	कीटाचे सामान्य नाव	प्रमाण प्रति हेक्टर ग्रॅम स.त	प्रमाण प्रति हेक्टर (मि.मी.)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (ली.)	शेवटच्या फवारणी व काढणीमधील कालावधी (दिवसात)
ऊस	प्ररोपिका शेंडा पोखरणारी (चिलो इन्फ्युसेटेलस) शेंडा पोखरणारी (स्किपोफेगा एक्सरप्टालिस), खोड पोखरणारी (चिलो ऑरिसिलियस)	75	125	1000	214
मका	फॉल आर्मीवर्म (स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपर्डा) खोड पोखरणारी (चिलो पार्टेलस) गुलाबी खोड पोखरणारी (सेसमिया इनफरेन्स)	40-50	66.60-83.30	500	87
भात	पिवळी खोड पोखरणारी (सिरपोफगा इन्कर्टुलास), भाताची पाने दुमडणारी (नॉक्लोकोक्रिस मेडिनेलिस)	30	50	500	47
चना	शेंगा पोखरणारी (हेलिकोवरपा आर्मिगेरा) तंबाखू सुरवंट (स्पोडोप्टेरा एक्सपी.)	25	41.66	500	26
तूर डाळ	शेंग पोखरणारी (हेलिकोवरपा आर्मिगेरा) पिसेकवर शेंग पोखरणारी (मारुका एक्सपी.) शेंग माशी (मेलानाग्रोमायझा ऑब्टूसा)	30	50	500-750	31
मूग डाळ	शेंग पोखरणारी (हेलिकोवरपा आर्मिगेरा) तंबाखू सुरवंट (स्पोडोप्टेरा लिटूरा) हीरवी उंटअळी (क्रिसोडेक्सिस एक्युटा) ठिपकेदार शेंग अळी (मारुका टेस्टुलालिस)				
सोयाबीन	तंबाखूवरा सुरवंट (स्पोडोप्टेरा लिटूरा) गर्डल बीटल (ओबेरिओप्सिस ब्रेविस) खोड माशी (मेलन-एग्रोमिझा एसपीपी.) हीरवी उंट अळी (क्रिसोडेक्सिस अक्युटा)	30	50	500	44
मूगफली	तंबाखूवरा सुरवंट (स्पोडोप्टेरा लिटूरा) मूंडमुगली पाने पोखरणारी (एप्रोरेमा मोडिसेला)	30	50	400-500	34
कापूस	अमेरिकन बोंडअळी (हेलिकोवरपा आर्मिगेरा) तंबाखूवरा सुरवंट (स्पोडोप्टेरा लिटूरा)	30	50	500	67
मिरची	फळ पोखरणारी (हेलिकोवरपा आर्मिगेरा) तंबाखूवरी सुरवंट (स्पोडोप्टेरा लिटूरा) बीट आर्मीवर्म (स्पोडोप्टेरा एक्सिगुआ)	30	50	400-500	3
टोमॅटो	तंबाखूवरा सुरवंट (स्पोडोप्टेरा लिटूरा) फळ पोखरणारी (हेलिकोवरपा आर्मिगेरा)	30	50	400-500	3

वापरासाठी निर्देश ,अजींची पध्दत आणि वेळ आणि अनुप्रयोग तंत्रासाठी, फवारणीची कमाल संख्या आणि पेरणीनंतरच्या फिकांच्या टप्प्यासह वारंवारता : १) **उस :** लागवडीच्या वेळी लवकर अंकुर, प्रारंभिच्या शेंडा पोखरणारी, शेंडा पोखरणारी आणि खोड पोखरणाऱ्या नियंत्रणासाठी उसाच्या सेटवर ड्रेंचिंग म्हणून एकच वापर. नव्याने उगवलेल्या उसाच्या रोपांच्या पायथ्याशी माती भिजवून प्रथम (पेलव्हा लावणी) किंवा दुसरे सिंचन (कोरडी लागवड) म्हणून देखील फवारणी केली जाऊ शकते. शेंडा पोखरणारी नंतरच्या ब्रूडसच्या व्यवस्थापनासाठी (३ री ते ५ वी), मे, जून महिन्यात माती भिजवून एकच फवारणी केली जाऊ शकते. पीक चक्रात एपापेक्षा जास्त फवारणी करू नका. २) **मका:** पोखरणारी आणि फॉल वॉर्मच्या व्यवस्थापनासाठी, प्रथम फवारणी पीकाच्या २–३ पानांच्या टप्प्यावर पर्णिय फवारणी म्हणून करावी आणि त्यानंतर १० दिवसांनी दुसरी फवारणी करावी. पीक चक्रात दोन पेक्षा जास्त फवारण्या करू नका. ३) **उस आणि मका व्यतरिक्त इतर पिके :** जेव्हा कीटक इंटीएल (आर्थिक उंबरठा पातळी) पर्यंत पोहोचते तेव्हा प्रथम पर्णिय फवारणी सुरू करा आणि त्यानंतर कीटक दाबावर अवलंबून १०–१४ दिवसांच्या अंतराने दुसरी फवारणी करा. पीक चक्रात दोनपेक्षा जास्त फवारण्या करू नका. **उपकरण प्रकार आणि नोजल प्रकार :** नॅपसॅक स्प्रेयर (मॅन्युअल/ बॅटरी ऑपरेटेड) / हॉलोकोन नोजलसह फूट स्प्रेअर.

डोस : कृप्या शिफारस सारणी पहा.

मिश्रण संबंधी निर्देश: क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ४७. ८५% एससी चे शिफारस केलेले प्रमाण घ्या आणि ते थोडेश्या प्रमाणात पाण्यात घाला पूर्णपणे मिसळा आणि नंतर जोमाने ढवळत असताना उर्वरित पाणी घाला.

हवामानाची सामान्य स्थिती: हवामानाच्या प्रतिकूल स्थितीच्या वेळी वापर करू नये.

कोणत्या टप्प्याच्या दरम्यान कीटकनाशके कोणत्याही पिकावर लागू केली जात नाहीत: लागू नाही.

माती आणि पाणी: कोणत्याही खास माती आणि जल प्रबंधनाची आवश्यकता नाही

पुन: प्रवेश अवधि: फवारणी सुके पर्यंत २४ तासा पर्यंत उपचारित शेतात प्रवेश करु नये.

पूर्व पीक अनुक्रमणिका(पीएचआई): कृप्या शिफारस सारणी पहा.

फायदेशीर कीटक जसे की मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू यांचे नुकसान टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी: लागू नाही.

सुरक्षेतले संबंधी खबरदारी: १. उत्पादनाचा वापर करते वेळी कहीही खायू, पीयू व धुम्रपान करु नये, पान चघळू नये. २. उत्पादनाचा वापर करते वेळी पूर्ण बाहींचा शर्ट, लांब पैंट, रासायन प्रतिरोधक हातमोजे, मास्क आणि छाकलेले बूट धारण. २. हवेच्या दिशेने फवारणी करत फवारणीचा तुषारा पासून स्वत:ला वाचवा. ४. फवारणी नोजलला तोंडाने फूंकू नये, अवरोधित नोझलला स्टेम वा ब्रश ने स्वच्छ करावे. ५. शरीरावर कोणत्याही गळतीच्या परिस्थितीत, उघड्या भागाला साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा. ६. हात आणि शरीराचा उघड्या भागाला व्यवस्थित धुवा. फवारणी नंतर दूषित कपडे काढून धुवा.

साठवणीसाठी सुचना:१) हे कीटकनाशक असणारी पॅकेजिस इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा वा खोल्या या पासून दूर जागी वा खोल्यात किंवा कीटकनाशकांचा दर्जा व स्वरुप यांचा विचार करुन कपाटात कडीकुलपात ठेवावीत. २) हे कीटकनाशक साठा करुन ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी, भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदूषण टळेल.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट : १) रिकामी डब्यांचा पुनर्वापर धोकादायक आहे. २) आधि ट्रिपल प्रेशरने डब्यांना स्वच्छ धुवा व विल्हेवाट लावा स्प्रे टाकीमध्ये रिसिंग जोडा. अमिश्रित रसायनांची साइटवर किंवा जलमार्गात विल्हेवाट लावू नका ३) रिकामी डबे खोदून मोडून तोडून, बस्तीपासून दूर गाडून टाकले पाहिजेत. ४) रिकामे डबे किंवा खोके अथवा उरलेले द्रावण किंवा मशीनचे धुवण यांची सुरक्षितपणे, म्हणजे वातावरण वा पाणी प्रदूषित होणार नाही अशाप्रकारे विल्हेवाट लावली पाहिजे.

विषबाधेची लक्षणे : डोळ्यांच्या त्वचेवर सौम्य जळजळ होवू शकते.

प्रथमोपचार: १.जर गिळले गेल्यास: व्यक्ती शुध्दीवर असेल तर, पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी प्यायला द्या.व्यक्ती जर बेशुध्द असेल तर तोंडाद्वारे काहीही देवू नये. डॉक्टरला बोलवा. जोपर्यंत उपस्थित चिकित्सक द्वारे उल्टी करण्यास सांगितले जात नाही तो पर्यंत उल्टी करू नये. २.**जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास:** रूग्णास मोकळ्या हवेत आणा आणि शरीर तापमानावर लक्ष ठेवा. जर रूग्ण श्वास घेत नसेल वा श्वास घेण्यास जास्त होत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने . तोंडस बासोच्छवास द्या. चिकित्सकाचा सल्ला द्या. ३.**जर त्वचेशी संपर्क आल्यास:** शरीराशी संपर्क आलेले भाग साबण व भरपूर पाण्याने धुवा, या सह केस व नखे देखील धुवा, जर वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहील्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या सर्व दूषित झालेले कपडे वेगवेगळे आणि साबर कपण्यापूर्वी व्यवस्थित धोले साबण व पाण्याने वेगळे धुतले पाहिजेत.४. **जर डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास:** तर डोळे भरपूर पाण्याने जबळ–जवळ १५ मिनिटे स्वच्छ धुवा, जर वेदना, जळजळ शहर होत नसेल लालसर पणा व प्रकाश अतिवेदन होत असेल तर नेत्र चिकित्सकाचा सल्ला घ्या.

विषरोधकता: कोणताही खास विषोपचार उपलब्ध नाही, लक्षणानुसार उपचार करा.

रासायनिक संरचना	**%व/व**
क्लोरोट्रानिलिप्रोल स.त.	४७.८५
मिथाइल मेथाक्रिलेट इथोक्सिलेटेड ग्राफ्ट कोपोलिमर	४.००
सोडियम अल्काइलनाफ्थालेनेसल्फोनेट, फॉर्मेल्डिहाइड कंडेन्सेट	२.००
२,४,७,९ – टेट्रामेथिल्डेक–५ – येन– ४, ७ डायोल	०.५०
पॉलीकलिलनि ऑक्साइड ब्लॉक कोपॉलिमर	२.००
अल्कोहोल, सी११–१४ – आईएसओ, सी १३ समृद्ध, एथोक्सिलेटेड	०.३०
हाइड्रेटेड ॲल्युमिनियम मॅग्नेशियम सिलिकेट	०.५०
यावर आधारित जलीय द्रावण: हायड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनोपोलि

ṭuvēṇṭa™

ṭrōṇōṭaṉiṭēlpōl 47.85% ṭaṉṭu/ṭaṉṭu eṉcēṭi (ṭūcaṟkaṉkoḷḷi)

ṭaṉṭu eṉpatu: ṭaṉṭukoḷḷaṉiṭaṉkaḷil aṭaṅkiyaṉa ṭūcaṟkaṉkaḷ.

ṭuvēṇṭa & ṭiṉṭōcaṉ (ṭrōṇ): ṭrōṇōṭaṉiṭēlpōl 47.85% ṭaṉṭu/ṭaṉṭu eṉcēṭi (ṭūcaṟkaṉkoḷḷi) eṉṟa ōṭṭi eṉa ṭaṉṭukoḷḷaṉiṭaṉkaḷil ṭaṉṭiṉaṟkāṉa ṭūcaṟkaṉkaḷ. aṭaṅkiyuḷḷa ṭaṉṭiṉaṟkāṉa ṭūcaṟkaṉkaḷ: ṭēṟṟaṉkaḷ, ṭēṟṟaṉkaḷ, ṭōṭṭaṉkaḷ, ṭōṭṭaṉkaḷ, ṭōṭṭ