LEAFLET BACK

கோரஜன்™

(பருத்த செயலுறற்றும் பூச்சிக்கொல்லி)

க்ளோராண்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% வ/வ எஸ்சி

நோக்கம்: வேளாண் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

அறிவிக்க - பயிர் - பூச்சிகள் பெயர்: க்ளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% வ/வ எஸ்சி (20% எ/கொ.) இது ஒரு ஆந்த்ரானிலிக் டைஅமைடு பூச்சிக்கொல்லி ஆகும். பரந்த வரிபயனுடன் செயல்படும் இந்த பூச்சிக்கொல்லி நெற்பயிரில், டீகடை, பருத்தி, கறும்பு, தக்காளி, மிளகாய், கோபாரமிகள், கத்தரி, துவரை, கொண்டைகடலை, உளுந்து, பாசறை, வெண்டை, சோளம் மற்றும் நிலக்கடலை, பச்சைப் பயறு ஆகிய பயிர்களில் கீழ்வகை பூச்சிகளுக்கு பயிர்பாதுகாப்பு கொடுக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

பரிந்துரைகள்

இராமகவசக் கலவை:

	% எ/எ
குளோராண்ட்ரானிலிப்ரோல் தூ.மு.	18.5
மெனாதம் நெறுக்கச்சாலேட் மெதோக்ஸிலேட்டட்	3.0
ஹைட்ரப் கோ-பாலிமர்	2.0
எதைலெனெயிமினோகைடைடு/ பொலிகார்பாக்சைலேட்	2.0
பொரக் கோ-பாலிமர் மற்றும்	
ஒருங்கிணைப்பு	
ஹைட்ரோஃபோபிக் ஆக்ஸைடுகள்	1.0
ஹைட்ரோஃபோபிக் மாவுப்பொருள்	0.3
1,2 பென்ஃபாக்ஸ் ஹைமெலீன் -3- டீன்	0.1
ஸிலிகான் வழவழப்பான்	0.3
ஹைட்ரோஃபோபிக் ஃபிலர்	6.8
நீரால்	கூ.ம வரைவில
மொத்தம்	100

1. லீச்டன்/ஸ்பாக்ஸ்லாந்து பிராஜெக்ஷன்களிலிருந்து ஒன்பது மாவுப்பிண்ட வளர்ச்சிகளுக்கு மேல் மாவுப்பிண்ட வளர்ச்சி. 2. ஈக் வயதுக்கு ரீஸ்ஸுக்கும்/ஸ்பாக்ஸ்லாந்துக்கு. மேற்குவிர்ஜினியாவில் ஒரு ரீஸ்ஸுக்கு ஒரு மாவுப்பிண்ட வளர்ச்சி. 3. ஈக் வயதுக்கு ரீஸ்ஸுக்கு/ஸ்பாக்ஸ்லாந்துக்கு ஒரு மாவுப்பிண்ட வளர்ச்சி.

பயன்கள் (முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. மருந்தைக் கையாளும் போதும் பயன்படுத்தும் போதும் எலுமிச்சை சாப்பிட்டு குடிக்க அல்லது புகைபிடிக்கக் கூடாது. 2. குளோரின் சட்டை, முழு கால் பேண்டு, இரசாயனத் தடுப்பு கையுறைகள், முகக் கவசம் மற்றும் காலணிகள் மற்றும் ஒரு ஒரிக்கன் ஆகியவற்றை அணிந்து மருந்தைக் கையாள வேண்டும். 3. காற்றுக்கும் திறந்தவெளிக்கும் மருந்தைக் கொளிக்க வேண்டும். மருந்து மழை மீதி தெறிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். 4. தெளிப்பான் கலப்பு மூலனை வாய் மைத்து ஒருமுப்பாலும் அதற்கு கூடாது. அளப்பட்டதுக்கும் கலப்பு மூலனை பெரும்பாலை நிரம்பி அல்லது பிரேஷ் பயன்படுத்தப்பட்டு தனியான அளவுகில் அல்லது கட்டுக்கிளில் அல்லது தனியான கலப்பாளியில் கொடித்து பூட்டு வைக்கவும். 5) கொப்பு அல்லாத நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்து, தூய்மையாக, காற்றோட்டம், ஈரத் தன்மையிலான மாக ஏற்படுவதை தவிர்க்க போதுமான பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

விவரம் தரக்கிய அறிவுறுதல்: கண்பார்வை மங்கல் உடன் வேளை கண் எரிச்சல் ஆகியவைகளாக ஒருக்கில் நிகழப்படுகிறது.

முதலுதவி: விழுங்கியிருந்தால்: தொடர்ச்சி வருமானால் உடனடியாக விஷ்பிடிப்பின் இருந்தால், வாமலை கொடுப்பதைக் கொடுத்து அல்லது மருத்துவரை அணுகவும். 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கச் செய்யுங்கள். கடுமையை தவிர்க்கிப்பட்டவர்களுக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவரைக் கலப்பு மூலனை வேண்டும். மருத்துவரின் மேற்பார்வை இல்லாமல் தோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. 2 **கவாசிக்கிற்குதல்:** தோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுங் உடல்பாகத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். ஒருவேளை தோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், வாயுடன் வாய் வழியாக ஊதி செயற்கை சுவாசமளிக்க வேண்டும். மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். 3. **மருந்து சுருதத்தில் பட்டிருந்தால்:** நன்றாகக் குளிக்க வேண்டும். மொடுப் போட்டு துணிகளை மாற்றி கவனிக்க வேண்டும். மாசுபட்ட ஆடைகளை தனியாக தண்ணாக கோப்பு போட்டு துவைத்த பிறகே மறுபடியும் பயன்படுத்த வேண்டும். 4. **கண்களில் படாமுருந்தால்:** கண்களை நன்றாக அலம்பிவிடுவதை வேண்டும். தொடர்ந்து 15 நிமிடங்கள் வரை கண்களில் தண்ணீரை அடித்து கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். வலி, உறுத்தல், கண்ணுக் அல்லது சிவப்பாகுதை கண்டால் மருத்துவரிடம் இருந்தால், கண் மருத்துவரிடம் கொண்டுபோய் காண்பிக்க வேண்டும்.

விவரமுறிவு மருந்து: குறிப்பிட்ட விவரமுறிவு மருந்து ஏதுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை கவனிப்புங்கள்.

இராமகவசக் கலவை:

	% எ/எ
குளோராண்ட்ரானிலிப்ரோல் தூ.மு.	18.5
மெனாதம் நெறுக்கச்சாலேட் மெதோக்ஸிலேட்டட்	3.0
கூடாட்ட கோ-பாலிமர்	2.0
எதைலெனெயிமினோகைடைடு/ பொலிகார்பாக்சைலேட்	2.0
பொரக் கோ-பாலிமர் மற்றும்	
ஒருங்கிணைப்பு	
ஹைட்ரோஃபோபிக் ஆக்ஸைடுகள்	1.0
ஹைட்ரோஃபோபிக் மாவுப்பொருள்	0.3
1,2 பென்ஃபாக்ஸ் ஹைமெலீன் -3- டீன்	0.1
ஸிலிகான் வழவழப்பான்	0.3
ஹைட்ரோஃபோபிக் ஃபிலர்	6.8
நீரால்	கூ.ம வரைவில
மொத்தம்	100

பயிர்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. மருந்தைக் கையாளும் போதும் பயன்படுத்தும் போதும் எலுமிச்சை சாப்பிட்டு குடிக்க அல்லது புகைபிடிக்கக் கூடாது. 2. குளோரின் சட்டை, முழு கால் பேண்டு, இரசாயனத் தடுப்பு கையுறைகள், முகக் கவசம் மற்றும் காலணிகள் மற்றும் ஒரு ஒரிக்கன் ஆகியவற்றை அணிந்து மருந்தைக் கையாள வேண்டும். 3. காற்றுக்கும் திறந்தவெளிக்கும் மருந்தைக் கொளிக்க வேண்டும். மருந்து மழை மீதி தெறிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். 4. தெளிப்பான் கலப்பு மூலனை வாய் மைத்து ஒருமுப்பாலும் அதற்கு கூடாது. அளப்பட்டதுக்கும் கலப்பு மூலனை பெரும்பாலை நிரம்பி அல்லது பிரேஷ் பயன்படுத்தப்பட்டு தனியான அளவுகில் அல்லது கட்டுக்கிளில் அல்லது தனியான கலப்பாளியில் கொடித்து பூட்டு வைக்கவும். 5) கொப்பு அல்லாத நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்து, தூய்மையாக, காற்றோட்டம், ஈரத் தன்மையிலான மாக ஏற்படுவதை தவிர்க்க போதுமான பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

விவரம் தரக்கிய அறிவுறுதல்: கண்பார்வை மங்கல் உடன் வேளை கண் எரிச்சல் ஆகியவைகளாக ஒருக்கில் நிகழப்படுகிறது.

முதலுதவி: விழுங்கியிருந்தால்: தொடர்ச்சி வருமானால் உடனடியாக விஷ்பிடிப்பின் இருந்தால், வாமலை கொடுப்பதைக் கொடுத்து அல்லது மருத்துவரை அணுகவும். 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கச் செய்யுங்கள். கடுமையை தவிர்க்கிப்பட்டவர்களுக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவரைக் கலப்பு மூலனை வேண்டும். மருத்துவரின் மேற்பார்வை இல்லாமல் தோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது. 2. **கவாசிக்கிற்குதல்:** தோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுங் உடல்பாகத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். ஒருவேளை தோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், வாயுடன் வாய் வழியாக ஊதி செயற்கை சுவாசமளிக்க வேண்டும். மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். 3. **மருந்து சுருதத்தில் பட்டிருந்தால்:** நன்றாகக் குளிக்க வேண்டும். மொடுப் போட்டு துணிகளை மாற்றி கவனிக்க வேண்டும். மாசுபட்ட ஆடைகளை தனியாக தண்ணாக கோப்பு போட்டு துவைத்த பிறகே மறுபடியும் பயன்படுத்த வேண்டும். 4. **கண்களில் படாமுருந்தால்:** கண்களை நன்றாக அலம்பிவிடுவதை வேண்டும். தொடர்ந்து 15 நிமிடங்கள் வரை கண்களில் தண்ணீரை அடித்து கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். வலி, உறுத்தல், கண்ணுக் அல்லது சிவப்பாகுதை கண்டால் மருத்துவரிடம் இருந்தால், கண் மருத்துவரிடம் கொண்டுபோய் காண்பிக்க வேண்டும்.

விவரமுறிவு மருந்து: குறிப்பிட்ட விவரமுறிவு மருந்து ஏதுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை கவனிப்புங்கள்.

பிரிந்துரைகள்

a) வேதுகமானால் பயன்பாட்டிற்கு:

பயிர்	பூச்சிகள் பெயர்	ஹெக்டேருக்குத் தேவை தூ.மு (கிராம்)	ஹெக்டேருக்குத் தேவை நீர் (லி.ம.)	ஹெக்டேருக்குத் தேவை நீர் அளவு (லி.ம.)	RM இன்பாட் ஒரு பயிர் சுழற்சியில் அதிபட்ச எண்ணிக்கை (ஒரு பயிரை ஒரு பயிர் சுழற்சியாக கொண்டால்)
நெற்பயிர்	தண்டு துளைப்பான் (சுவர்ணியாவை கேப்சிஸ்டாலிஸ்)	30	150	500	47
பருத்தி	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	3
கறும்பு	தண்டு துளைப்பான் (சிலோபைனா நிவெல்லா)	30	150	500	2
தக்காளி	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	3
மிளகாய்	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	2
கத்தரி	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	2
துவரை	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500-750	2
பாசறை	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500-750	2
வெண்டை	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500-750	2
சோளம்	தண்டு துளைப்பான் (சிலோபைனா நிவெல்லா)	30	150	500-750	2
நிலக்கடலை	தண்டு துளைப்பான் (ஸ்பொடாப்டெரா லிட்டுரா)	30	150	500	2
பச்சைப் பயறு	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	2
உளுந்து	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	2
மரவள்ளி	தண்டு துளைப்பான் (ஒலிகோசிரா வெரிகோலா)	30	150	500	2
வெங்காயம்	வெங்காய ஈக்கள் (ஹெலியோதிஸ் ஒனோனிஸ்)	30	150	500	2
கொண்டைகடலை	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500-750	2
பருத்தி	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	3
கறும்பு	தண்டு துளைப்பான் (சிலோபைனா நிவெல்லா)	30	150	500	2
மிளகாய்	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	2
கத்தரி	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	2
துவரை	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500-750	2
பாசறை	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500	2
வெண்டை	காய்ப்புழு (ஹெலிகோவெர்பா ஆர்மிஜெரா)	30	150	500