LEAFLET FRONT



FMC

Manufactured and Marketed by : FMC India Private Limited, Registered Office: Phoenix Paragon Plaza, Unit No. 2B-39-41, Second Floor, Phoenix Market City, L.B.S. Marg, Kurla (w) Mumbai-400070, Maharashtra. **Factory:** Village Nimbua, Post Office Mubarkpur, Tehsil - Dera Bassi, Distt. S.A.S Nagar (Mohali), Punjab - 140 507.

निर्माता एवं विपणनकर्ता:एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: फीनिक्स पैरागॉन प्लाजा, युनिट संख्या २बी-३९-४१, दूसरी मंज़िल, फीनिक्स मार्केट सिटी, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०००७०, महाराष्ट्रा. **फैक्टरी:** गाँव निंबूआ, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर, तहसिल - डेरा बस्सी, जिला : एस. ए. एस. नगर (मोहाली), पंजाब - १४०५०७.

In Case of Complaints, please contact customer Cell ✆: **1800 102 6545** or ✉: **Ask@fmc.com** or write at Regd. Office of FMC India Private Limited.

FMC, the FMC logo, Resonex, રેઝોનેક્સ, **રેઝોનેક્સ**, રેઝોનેક્સ, ચીઝેલનમ, ગીઝેલનોક્સ, ઇન્સેક્ટ્સ, ઇન્સેક્ટીસાઈડ્સ and રસજોનેક્સ are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.
©2026 FMC Corporation. All rights reserved.

Resonex™
Chlorantraniliprole 5% w/w DT (Insecticide)

Purpose: For Agricultural Use
For crop & pest group: Chlorantraniliprole 5% w/w DT (Tablet for direct application) is an anthranilic diamide insecticide, recommended to control Yellow Stem Borer (Scirpophaga incertulas) Rice Leaf Folder (Cnaphalocrosis medinalis) in rice.
Recommendation:

Crop	Common Name of the target Pest	Dosage per hectare			Waiting period from last spray to harvest (in days)
		A.I. (g)	Formulation (No. of tablets)	Dilution in water (L)	
Rice	Yellow Stem Borer (Scirpophaga incertulas) Rice Leaf Folder (Cnaphalocrosis medinalis)	40-50	1000-1250	NA	47

Directions For Use/ Manner and Time of application / Application techniques/ Frequency including maximum number of sprays and Crop stage of application: Place the required number of tablets uniformly in the field. Kindly make sure that there is a 3-5 cm standing water in field at the time of application. One application in a crop cycle shall be done at 15-25 days after transplanting coincided with active tillering stage of the crop when adults or egg masses of stem borer are visible in the field.

Weather condition (in general): Avoid application during adverse weather conditions.

Soil and water (where ever applicable) : Make sure that standing water in the field at least 5-7 days after the application.

Equipment type: Mechanical disperser ,hand-wearing chemical resistant gloves.

Nozzle type: NA

Instruction for mixing: NA.

Re-entry period: Do not enter treated areas for 24 hours.

Pre harvest interval (PHI) : 47.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: NA.

Precaution to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: Please refer to cautionary statements.

Symptoms Of Poisoning: No clinical signs and symptoms of poisoning have been found.

First aid:1. If ingested: Drink plenty of water. Do not induce vomiting or give anything by mouth to an unconscious person. If vomiting does occur, rinse mouth and drink fluids again. Call a physician immediately. **2. If inhaled:** Take the person to fresh air. If the person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration and consult a physician immediately. **3. In case of skin contact:** Immediately remove contaminated clothing and footwear, wash thoroughly the affected parts of body with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4. In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Antidote Statement : There is no specific antidote. Hence, symptomatic and supportive therapy should be given.

Safety Precautions: Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while applying the product. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, goggles and knee-length rubber boots while handling the product. Wash hands and unprotected parts of the body properly after handling and before eating, drinking or smoking. Remove and wash contaminated clothing separately after use.

Instructions for storage:1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed, or shall be kept in a separate almirah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapors of insecticide.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material :1. Dangerous to reuse empty containers. 2. Packages shall be broken and buried away from habitation. 3. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 4. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Chemical Composition:

Ingredient	Weight (% w/w)
Chlorantraniliprole a.i.	5.00
Sodium dioctyl-sulphosuccinate	0.80
Polycarboxylate	2.50
D, L- Tartaric Acid	21.00
Sodium bi- carbonate	30.00
Sodium carbonate	8.00
Magnesium stearate	0.70
Denatonium benzoate	0.05
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-hydro-ω-hydroxy-ethane-1,2-diol,ethoxylated	5.50
Hydrated Magnesium Silicate	6.00
Maltodextrin	Q. S
Total	100.00

Cautionary Statements: Not to be used for any purpose other than specified on label/ leaflet. 2. The product is highly toxic to aquatic organisms and fish and moderately toxic to honey bees with long lasting effects thus the product containing molecules may be avoided near aquaculture and during active bee foraging period of the day.

Manufactured and Marketed by : FMC India Private Limited, Regd. Office: Phoenix Paragon Plaza, Unit No. 2B 39-41, Second Floor, Phoenix Market City, L.B.S. Marg, Kurla (w) Mumbai- 400070, Maharashtra. **Factory:** Village Nimbua, Post Office Mubarkpur, Tehsil - Dera Bassi, Distt. S.A.S Nagar (Mohali), Punjab - 140 507.

रेज़ोनेक्स™
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ५% भार/भार डीटी (कीटनाशक)

उद्देश्य: कृषि उपयोग के लिए।

फसल और कीट समूह: क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ५% भार/भार डीटी (सीधे उपयोग के लिए गोली) एक एंथ्रानिलिक डायमाइड कीटनाशक है, जिसे चावल में पीला तना छेदक (सिरपोफैगा इनकर्टुलास) चावल पत्ती मोडक (नैफलोक्रोसिस मेडिनेलिस) कीटों को नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जाता है।

अनुशंसा:

फसल	कीट का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर			कटाई से पहले अंतराल (दिनों में)
		स.त. (ग्रा.)	फॉर्मूलेशन (गोलियों की संख्या)	पानी की मात्रा (ली.)	
चावल	पीला तना छेदक (सिरपोफैगा इनकर्टुलास) चावल पत्ती मोड़क (नैफलोक्रोसिस मेडिनेलिस)	४०-५०	१०००-१२५०	लागू नहीं	४७

इस्तेमाल के लिए निर्देश/आवेदन का तरीका और समय/आवेदन तकनीक /स्प्रे की अधिकतम संख्या सहित आवृति और आवेदन के लिए फसल चरण: क्षेत्र में समान रूप से गोलियों की आवश्यक संख्या रखें। कृपया सुनिश्चित करें कि उपयोग के समय खेत में ३-५ सेमी खड़ा पानी रहे। फसल चक्र में एक उपयोग रोपाई के १५-२५ दिनों के बाद किया जाना चाहिए जब फसल सक्रिय टिलरिंग (कल्ले निकलना) के चरण मे हो और खेत में व्यसक या तना छेदक के अंडे दिखाई दें।

मौसम की स्थिति(सामान्य रूप में): प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान उपयोग से बचें।

मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो): सुनिश्चित करें कि उपयोग के बाद खेत में कम से कम ५-७ दिनों तक पानी खेत में खड़ा रहे।

उपकरण के प्रकार: यांत्रिक फैलाव का उपयोग करके या हाथ में रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने पहनकर इस्तेमाल करें।

नोजल प्रकार : लागू नहीं।

मात्रा बनाने की विधि: लागू नहीं।

मिलाने का निर्देश: लागू नहीं।

पुन: प्रवेश अवधि: २४ घंटे के लिए उपचारित क्षेत्रों में प्रवेश न करें।

फसल पूर्व अंतराल (पीएचआय) : ४७

चरणों के दौरान वे अवस्थाएं जिनके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए: लागू नहीं।

एहतिहास मधु मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रु जैसे लाभकारी कीडों को नुकसान से बचाने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: कृपया चेतावनी कथन देखें।

विषाक्तता के लक्षण: विषाक्तता के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं।

प्राथमिक चिकित्सा: १. **अगर निगल लिया:** खूब सारा पानी पिलाएं। बेहोश व्यक्ति को उल्टी के लिए प्रेरित न करें या मुंह से कुछ भी न दें। अगर उल्टी होती है, तो मुंह कुल्ला और फिर से तरल पदार्थ पीएं। तुरंत एक चिकित्सक को बुलाओ। २. **अगर सांस ली जाए:** व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। ३. **त्वचा संपर्क के मामले में :** दूषित कपड़ों और जूतों को तुरंत हटा दें, शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन से खूब सारे पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। ४. **आँख से संपर्क के मामले में :** कम से कम १५ मिनट तक काफी सारे पानी से छींटे मारें। यदि दर्द, लालिमा, खुजली या फोटोफोबिया जारी रहे, तो आंखों के डॉक्टर की सलाह लें।

विषनाशक कथन: कोई विशिष्ट विषहर औषध नहीं है। लक्षण के अनुसार और चिकित्सक के आधार पर इलाज दी जानी चाहिए।

सुरक्षा सावधानियां: प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पियें, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरे बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने और ढके हुए जूते पहनें। हाथ और शरीर के असुरक्षित हिस्सों को सँभालने और खाने, पीने या धूम्रपान करने से पहले अच्छी तरह से धो लें उपयोग के बाद दूषित कपड़ो को अलग से हटाएं और धो लें।

भंडारण के लिए निर्देश: १. कीटनाशक युक्त पैकेज को मूल कंटेनर में अलग कमरे में या परिसर में अन्य वस्तुएं रखे जाने वाले कमरे या परिसर से दूर, बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर, पशुओं के चारे से दूर अथवा अलग अलमारी में ताला और चाबी लगाकर रखना चाहिए। २. कीटनाशक के संग्रहण के लिए बने कमरे या परिसर अच्छी तरह निर्मित, खुश्क, अच्छी रोशनी वाले, और हवादार और वाष्प के साथ संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त आयाम वाले होने चाहिए।

प्रयुक्त कंटेनरों का निपटान: १. खाली डिब्बों का दुबारा उपयोग करना हानिकारक है। २. खाली डिब्बों को तोड़कर निवास से दूर जमीन में गाड़ दें। ३. खाली डिब्बों को दुबारा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ४. यह कीटनाशक निर्माताओं तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है की वह डिब्बों/पैकेजिस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।

रासायनिक संरचना:

संघटक वजन	(% भार/भार)
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल स.त.	५.००
सोडियम डाइऑक्टाइलसक्सिनेट	०.८०
पॉलीकार्बोक्सिलेट	२.५०
डी, एल- टार्टरिक एसिड	२१.००
सोडियम बाई -कार्बोनेट	३०.००
सोडियम कार्बोनेट	८.००
मैग्नीशियम स्टीयरेट	०.७०
डेनेटोनियम बेंजोएट	०.०५
पॉली (ऑक्सी -१,२-एथेनेडियल), α-हाइड्रो-ω- हाइड्रॉक्सी-एथेन-१,२-डायोल, एथॉक्सिलेटेड	५.५०
हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेटस	६.००
माल्टोडेक्सट्रिन	पर्याप्त मात्रा
कुल	१००.००

चेतावनी बयान:१. लेबल/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २.यह उत्पाद जलीय जीवों और मछलियों के लिए अत्यधिक विषैला है और मधुमक्खियों के लिए मध्यम विषैला है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए इस अणु युक्त उत्पाद को जलीय कृषि के निकट और दिन मधुमक्खियों के सक्रिय चारागाह के समय उपयोग से बचाया चाहिए।

निर्माता एवं विपणनकर्ता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस: फीनिक्स पैरागॉन प्लाजा, युनिट संख्या २बी ३९-४१, दूसरी मंज़िल, फीनिक्स मार्केट सिटी, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०००७०, महाराष्ट्रा. **फैक्टरी:** गाँव निंबूआ, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर, तहसिल - डेरा बस्सी, जिला : एस. ए. एस. नगर (मोहाली), पंजाब - १४०५०७.

રેઝોનેક્સ™
ક્લોરેંટ્રાનિલિપ્રોલ ૫%વ/વ ડીટી (કીટકનાશક)

હેતુ: કૃષિ વાપરાસાઠી.

પીક આણિ કીટક ગટાસાઠી: ક્લોરેંટ્રાનિલિપ્રોલ ૫% વ/વ ડીટી (થેટ વાપરાસાઠી ગોળી) હે ઍંથ્રેનિલિક ડાયમાઇડ કીટકનાશક આહે. જે ભાતા મથિલ પિવળા ખોડકિડા (સ્કિરપોફાગા ઇન્સર્ટુલાસ) ભાતાચી પાને દુમડણારી (કેનૅરૉફોક્રોસિસ મેડિનાલિસ) નિયંત્રિત કરણ્યાસાઠી શિફારસ કેલેલે આહે.

શિફારશે:

પીક	કીટકાચે સામાન્ય નાવ	પ્રમાણ પ્રતિ હેક્ટર			શેવટચી ફવારણી તે કાપણી-તીલ વાટ પાહણ્યાચા કાલાવધી (દિવસાત)
		સ.ત. (ગ્રં.)	દ્રાવણ (ગોળ્યાંચી સંખ્યા)	સોય કરણ્યા-સાઠી પાણી (લી.)	
ભાતા	પિવળા ખોડકિડા (સ્કિરપોફાગા ઇન્સર્ટુલાસ) ભાતાચી પાને દુમડણારી (કેનૅરૉફોક્રોસિસ મેડિનાલિસ)	૪૦-૫૦	૧૦૦૦-૧૨૫૦	લાગૂ નાહી.	૪૭

વાપરાચ્યા સૂચના/ વાપરણ્યાચી પધ્દત આણિ વેળ/ વાપરણ્યાચે તંત્રે/ ફવારાચ્યાંચી જાસ્તીત જાસ્ત સંખ્યા આણિ વાપરણ્યાચ્યા પીક ટપ્પ્યાસહ બોરંયવારતા: આવશ્યક સંખ્યેત ગોળ્યા શેતાત એકસારખ્યા ઠેવા. વાપરાચ્યા વેળી શેતાત ૩-૫ સેંમી પાણી સાચલે આહે યાચી ખાત્રી કરા. લાગવડીનંતર ૧૫-૨૫ દિવસાંની પીક ચક્રાત એકચ વાપર કરાવા, જેવ્હા પિકાચ્યા સક્રિય મશાગતીચ્યા અવેસ્થેત પ્રૌઢ કિંવા ખોડકિડ્યાચી અંડી શેતાત દિસતીલ.

હવામાનાચી સામાન્ય સ્થિતી: હવામાનાચ્યા પ્રતિકૂલ સ્થિતીચ્યા વેળી વાપર કરુ નયે.

માતી આણિ પાણી (જેથે લાગૂ અસેલ તેથે): વાપરલ્યાનંતર કિમાન ૫-૭ દિવસાંની શેતાત પાણી સાચૂન રાહીલ યાચી ખાત્રી કરા.

ઉપકરણાચા પ્રકાર: મેકેંનિકલ ડિસ્પર્સર, હાતાને વાપરતા યેણારે રાસાયનિક પ્રતિરોધક હાતમોજે.

નોજલ પ્રકાર: લાગૂ નાહી.

મિશ્રણાસાઠી નિર્દેશ: લાગૂ નાહી.

પુન: પ્રવેશ અવધિ: ફવારણી સુકે પર્યંત ૨૪ તાસા પર્યંત ઉપચારિત શેતાત પ્રવેશ કરુ નયે.

કાપણી/તોડણી પૂર્વી મધ્યાંતર (પીએચઆય): ૪૭

કોણત્યા ટપ્પ્યાચ્યા દરમ્યાન કીટકનાશકે કોણત્યાહી પિકાવર લાગૂ કેલી જાત નાહીત: લાગૂ નાહી.

મધમાશ્યાસારખ્યા ફાયદેશીર કીટકાંના આણિ કીટકાંચ્યા નૈસર્ગિક શત્રુંના હાની પોહોચૂ નયે મ્હણૂન ધ્યાવયાચી ખબરદારી: કૃપયા સાવધગિરીચી વિધાને પહા.

વિષબાધેચી લક્ષણે: વિષબાધેચી કોણતીહી ક્લિનિકલ ચિન્હે આણિ લક્ષણે આઢળલી નહીત.

પ્રથમોપચાર: ૧) જર સેવન કેલેતર : ભરપૂર પાણી પ્યા. બેશુધ્દ વ્યક્તીલા ઉલટ્યા કરૂ દેવૂ નકા કિંવા તોંડાને કાહીહી દેવૂ નકા. જર ઉલટ્યા ઝાલ્યા તર તોંડ સ્વચ્છ આણિ પુન્હે દ્રવ્ય પ્યા. **તાબડતોબ ડૉક્ટરાંના બોલવા.** ૨) જર શ્વાંસાદ્વારે આત ઘેતલે અસેલ તર: વ્યક્તીલા મોકળ્યા હવેત ઘેવૂન જા. જર વ્યક્તી શ્વાંસ ઘેત નસેલ કિંવા શ્વાંસ ઘેણ્યાસ ત્રાસ હોત અસેલ તર કૃત્રિમ શ્વાંસન દ્યા આણિ તાબડતોબ ડૉક્ટરાંચા સલ્લા ઘ્યા. ૩) **ત્વચેશી સંપર્ક ઝાલ્યાસ:** દૂષિત કપડે આણિ પાદત્રાણે તાબડતોબ કાઢૂન ટાકા, શરીરાચે પ્રભાવિત ભાગ સાબણાને આણિ ભરપૂર નાણ્યાને પૂર્ણપણે ધુવા. જર વેદના, લાલસરપણા કિંવા જળ્જળ કાયમ રાહિલી તર ડૉક્ટરાંચા સલ્લા ઘ્યા. વાપરણ્યાપૂર્વી સર્વ દૂષિત કપડે વેગળે કરુન સાબણાને આણિ પાણ્યાને પૂર્ણપણે ધુવાવેત. **ડોળ્યાંશી સંપર્ક ઝાલ્યાસ:** કમીત કમી ૧૫ મિનટા પર્યંત ભરપૂર પાણ્યાને વ્યવસ્થિત ધુવા. જર વેદના, જળ્જળ, લાલસરપણા વા ફોટોફોબિયા પરસિસ્ટ સતત રહીલ્યાસ ડોળ્યાચ્યા વિશેષજ્ઞાચા સલ્લા ઘ્યા.

ઉતારા વિધાન: કોણતાહી વિશિષ્ટ વિષોપચાર નાહી, મ્હણૂન, લક્ષણાનુસાર આણિ સહાય્યક થેરપી દિલી પાહિજે.

સુરક્ષેતતે સંબંધી ખબરદારી: ઉત્પાદનાચા વાપર કરતે વેળી કાહીહી ખાવૂ, પીવૂ વ ધુમ્રપાન કરુ નયે, પાન ચઘલૂ નયે. ઉત્પાદનાચા વાપર કરતે વેળી પૂર્ણ બાહીચા શર્ટ, લાંબ પૅંટ, રાસાયન પ્રતિરોધક હાતમોજે, માસ્ક આણિ છાકલેલે બૂટ વાપરા.હાત આણિ શરીરાચા ઉઘડ્યા ભાગાલા વ્યવસ્થિત ધુવા. ફવારણી નંતર દૂષિત કપડે કાઢૂન ધુવા.

સાઠવણ : ૧) હે કીટકનાશક અસણારી પૅકેજિસ ઇતર માલ ઠેવણ્યસાઠી અસલેલ્યા જાગા વા ખોલ્યા યા પાસૂન દૂર જાગી વા ખોલ્યાત કિંવા કીટકનાશકાંચા દર્જા વ સ્વરુપ યાંચા વિચાર કરુન કપાટાત કડીકુલપાત ઠેવાવીત. ૨) હે તણનાશક સાઠા કરુન ઠેવણ્યાચી જાગા ઉત્તમ બાંધણીચી, કોરડી, હવા ખેલતી રાહણારી, ભરપૂર ઉજેડાચી વ પુરેશી મોઠી અસાવી ત્યામુળે વાપાંની હોણારે પ્રદૂષણ ટળેલ.

રિકામ્યા ડબ્યાંચી વિલ્હેવાટ: વાપરલેલી પૅકેજિસ ઇતર સાહીત્ય આણિ કિટકનાશકાચ્યા પાણ્યાચી વિલ્હેવાટ : ૧) રિકામી ડબ્યાંચા પુર્નવાપર ધોકાદાયક આહે. ૨) વાપરલેલી પૅકેજિસ મોડૂન-તોડૂન વસ્તીપાસૂન દૂર જાગી જમિનીત ખોલ પુરાવીત.૩) પુન: અન્ય કામાસાઠી વાપરલી જાઉ નયેત મ્હણૂન રિકામી પૅકેજિસ ઉઘડ્યાવર ટાકૂ નયેત. ૪) તણનાશક નિર્માતા વ ઉપયોગકર્તા ઘ્યાંચે કર્તવ્ય આહે કિ પૅકેજિસ કિંવા ડરલેલે દ્રાવણ કિંવા ફવારણીચી ઉપકરણી ધુતલેલે પાણી યાંચી વિલ્હેવાટ પર્યાવરણ કિંવા પાણી પ્રદુષિત હોણાર નાહી અશા સુરક્ષિત પદ્ધતીને કરાવી.

રાસાયનિક સંરચના:

ઘટક	વજન (% વ/વ)
ક્લોરેંટ્રાનિલિપ્રોલ સ.ત.	૫.૦૦
સોડિયમ ડાયઑક્ટિલ પૉલીકાર્બોક્સિલેટ	૦.૮૦
પૉલી કાર્બોક્સિલેટ	૨.૫૦
ડી,એલ- ટાર્ટરિક એસિડ	૨૧.૦૦
સોડિયમ બાય- કાર્બોનેટ	૩૦.૦૦
સોડિયમ કાર્બોનેટ	૮.૦૦
મૅગ્નેશિયમ સ્ટીયરેટ	૦.૭૦
ડેનાટોનિયમ બેન્ઝોટ	૦.૦૫
પૉલી (ઑક્સી-૧,૨- ઈથેનિડાઈલ), અ-હાયડ્રો- ડબ્લ્યૂ- હાયડ્રૉક્સી- ઇથેન- ૧,૨ - ડાયૉલ, ઇથૉક્સિલેટેડ	૫.૫૦
હાયડ્રેટેડ મૅગ્નકેશિયમ સિલિકેટ	૬.૦૦
મલ્ટોડેક્સટ્રિન	ક્યૂ. એસ.
એકૂણ	૧૦૦.૦૦

સાવધગિરીચે વિધાન: ૧. લેબલ/ લિફલેટ વર નમૂદ કેલેલ્યા શિવાયા ઇતર કોણત્યાહી કારણાસાઠી વાપરલે જાઊ નયે. ૨ . હે ઉત્પાદન જલીય જીવ આણિ માસે યાંચ્યાસાઠી અત્યંત વિષારી આહે, હે જલીય જીવાંસાઠી માફક પ્રમાણાત વિષારી આહે ત્યામુળે હે રેણૂ અસલેલે મત્સ્યપાલન ઉત્પાદના જવળ આણિ દિવસા મધમાશી સક્રિય અસતાનાચ્યા કાળાત ફવારણી ટાળાવી.

નિર્માતા આણિ વિક્રેતા: એફ એમ સી ઇંડિયા પ્રાયવેટ લિમિટેડ, રજિ. ઑફિસ: ફિનિક્સ પેરાગૉન પ્લાઝા, યુનિટ નં.-૨ બી ૩૯-૪૧ ૨ રા માળા, ફિનિક્સ માર્કેટ સિટી, એલ.બી.એસ. માર્ગ, કુર્લા (પશ્ચિમ), મુંબઈ- ૪૦૦૦૭૦, મહારાષ્ટ્ર. **ફૅક્ટરી:** ગાંવ નિંબૂઆ, પોસ્ટ ઑફિસ મુબારકપુર, તહસિલ- દેરા બસ્સી, જિલા: એસ.ઍ.એસ. નગર (મોહાલી), પંજાબ- ૧૪૦૫૦૭.

રેઝોનેક્સ™
ક્લોરેંટ્રાનિલિપ્રોલ ૫%ભાર/ભાર ડીટી (જંતુનાશક)

હેતુ: કૃષિ ઉપયોગ માટે.

પાક અને જંતુના સમૂહ માટે : ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૫% ભાર/ ભાર ડીટી (પ્રત્યક્ષ છંટકાવ માટે ગોળી) એન્થ્રાનિલિક ડાયામાઈડ જંતુનાશક છે, જે ડાંગરમાં પીળા થડ ભેદક (સ્કર્પોફાગા ઈન્સર્ટુલાસ), ડાંગર પાન કોતરિયા (નેફાલોકોસિસ મેડિનાલિસ) ને કાબૂમાં લેવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ભલામણ:

પાક	જંતુનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા			છંટકાવથી લણણી સુધીના પ્રતિક્ષા સમય
		સા.ત. (ગ્રામ)	ફૉર્મ્યુલેશન (ગોળી ઓની સંખ્યા)	પાણીમાં ઘોળ (લિ.)	
ડાંગર	પીળા થડ ભેદક (સ્કર્પોફાગા ઈન્સર્ટુલાસ), ડાંગર પાન કોતરિયા (નેફાલોકોસિસ મેડિનાલિસ)	૪૦-૫૦	૧૦૦૦-૧૨૫૦	લાગુ નહીં	૪૭

ઉપયોગની રીત/ છંટકાવની રીત અને સમય/ છંટકાવની ટેક્નિક/ છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સાતત્યતા અને છંટકાવ માટે પાકના તબક્કા: ગોળીઓની આવશ્યક સંખ્યાને ખેતરમાં એકસમાન ગોઠવી દો. કૃપા કરીને એ ખાતરી રાખો કે છંટકાવના સમયે ખેતરમાં ૩-૫ સેમી ઊભું પાણી હોય. ખેતરમાં થડભેદકના પુખ્ત અને ઈંડાંના સમૂહો દેખાય ત્યારે પાકના સક્રિય ખેડાણના તબક્કા સાથે યોગાનુયોગ પ્રત્યારોપણી પછી ૧૫-૨૫ દિવસે પાકના ચક્રમાં એક છંટકાવ કરાશે.

સામાન્ય રીતે હવામાનની સ્થિતિ: માઠી હવામાનની સ્થિતિ દરમિયાન છંટકાવ કરવાનું ટાળો.

માટી અને પાણી (જ્યાં પણ લાગુ હોય): ખેતરમાં ઊભું પાણી છંટકાવ પછી ઙમસેકમ ૫-૭ દિવસ રહે તેની ખાતરી રાખો.

ઉપકરણનો પ્રકાર: યાંત્રિક ડિસ્પેન્સર, હાથમાં પહેરવાનાં રસાયણ પ્રતિરોધક હાથમોજાં.

નોઝલનો પ્રકાર: લાગૂ નહીં.

મિશ્રણ તૈયાર કરવા અંગે સૂચનાઓ : લાગૂ નહીં.

પુન:પ્રવેશ સમયગાળો: છંટકાવ સુકાઈ નહીં જાય ત્યાં સુધી ૨૪ કલાક માટે ઉપચારિત જગ્યામાં પ્રવેશ નહીં કરવો.

લણણી-પૂર્વ સમયાંતર (પીએચઆઈ) : ૪૭.

કોઈપણ પાક પર જંતુનાશકનો છંટકાવ કરવાના તબક્કા: લાગુ નહીં.

મધમાખીઓ અને જંતુના નૈસર્ગિક શત્રુઓ જેવા લાભકારી જંતુઓને હાનિ ટાળવા માટે લેવાની સાવચેતીઓ: કૃપા કરી સાવચેતીનું નિવેદન જુઓ.

ઝેરનાં લક્ષણો:કોઈ વોક્કસ વિષનાશક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

પ્રાથમિક ઉપચાર:૧. પેટમાં જવા પર: ભરપૂર પાણી પીઓ. જો વ્યક્તિ બેભાન હોય તો બળજબરીથ ઊલટી નહીં કરાવો અને મોઢા વાટે કશું જ નહીં આપવું જોઈએ. જો ઊલટી થાય તો મોઢું પાણીમાં બોળો અને ફરી પ્રવાહી પીઓ. તુરંત ડોક્ટરને બોલાવો.૨. **શ્વાસમાં જવા પર:** દર્દીને ખુલ્લી હવામાં બહાર લાવો. જો દર્દી શ્વાસ નહીં લેતો હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય તો કૃત્રિમ શ્વાસોશ્વાસ આપો. તુરંત તબીબને બોલાવો.૩.**ત્વચા સાથે સ્પર્શ થવા પર:** તુરંત દૂષિત કપડાં અને ચગરખાં કાઢી નાખો, શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગોને સાબુ અને ભરપૂર પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. જો દર્દ, લાલાશ કે દાહક રહેજો તે છતાં નહીં જાય તો ડોક્ટરને બોલાવો. સર્વ દૂષિત કપડાં અલગ કરવાં જોઈએ અને ફરીથી ઉપયોગ કરવા પૂર્વે સાબુ અને પાણીથી અલગ કરીને ધોવાં જોઈએ. **જો આંખોને સ્પર્શ થયો હોય :** ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ માટે પુષ્કળ પાણી વડે નરમાશપૂર્વક આંખોને ધોવો. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અથવા પ્રકાશને કારણે આંખોમાં અસ્વસ્થતા (ફોટોફોબિયા) ચાલુ રહે તો, નેત્ર-વિશેષજ્ઞનો સંપર્ક કરવો.

વિષનાશક અંગે નિવેદન: કોઈ વોક્કસ વિષનાશક નથી. આથી લક્ષણાત્મક અને સમર્થક ઉપચાર આપવો જોઈએ.

સુરક્ષાની સાવચેતીઓ: ઉત્પાદન છંટકાવ કરવા સમયે કશું ખાવું, પીવું, તમાકુ ચગળવું કે ધૂમ્રપાન નહીં કરવું જોઈએ. મિશ્રણ હાથ ધરતી વખતે લાંબી બાંયનું શર્ટ, લાંબું પેન્ટ, રસાયણ પ્રતિરોધક હાથમોજાં, માસ્ક અને આવરણવાળાં જૂતાં પહેરવાં. હાથ અને શરીરના અસુરક્ષિત ભાગોને હાથ ધર્યા પછી અને ખાવા- પીવા કે ધૂમ્રપાન કરવા પૂર્વે સાફ ધોઈ નાખવા જોઈએ. ઉપયોગ પછી દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને અલગથી ધોઈ નાખો.

સંગ્રહ: ૧. જંતુનાશક ધરાવતાં પૅકેજીસ બીજી ચીજવસ્તુઓ સંગ્રહવા માટે વપરાતાં ઓરડા અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડા અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવાં અથવા જંતુનાશકના જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધાર રાખીને અલગ કબાટમાં તાળાંચાવીમાં બંધ કરીને રાખવાં. ૨. નિંદણનાશક સંગ્રહવા માટેનાં ઓરડા અથવા જગ્યા સારી પેઠે બાંધેલાં, સૂકાં, સારો પ્રકાશ ધરાવતાં, હવાઠાર અને પૂરતી મોકળાશ ધરાવતાં હોવાં. જોઈએ જેથી વરાળથી દુષિત થતું ટાળી શકાય.

જંતુનાશકકોનાં વપરાયેલાં પૅકેજીસ, વધારાની સામગ્રી તથા ધોવાણોનો નિકાલ: ૧. ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે. ૨) પૅકેજીસ ભાંગી નાંખવાં અને વસ્તીથી દૂર ઠાટી દેવા. ૩) વપરાયેલાં પૅકેજીસ બહાર રાખવાં નહીં જેથી તેમનો ફરી ઉપયોગ થતો અટકે. ૪) જંતુનાશક ના ઉત્પાદકો, તૈયાર કરનારાઓ તથા સંચાલકોની એ ફરજ રહેશે કે પૅકેજીસ અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાણનો એની સલામત રીતમાં નિકાલ કરવામાં આવે જેથી પર્યાવરણનું અથવા જળ પ્રદુષણ થતું અટકાવી શકાય.

રાસાયણિક સંમિશ્રણ:

સામગ્રી	વજન (% ભાર/ ભાર)
ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ એ.આઈ.	૫.૦૦
સોડિયમ ડાયોક્ટાઈલ સલ્ફોસક્સિનેટ	૦.૮૦
પોલીકાર્બોક્સિલેટ	૨.૫૦
ડી,એલ- ટાર્ટરિક એસિડ	૨૧.૦૦
સોડિયમ બાય- કાર્બોનેટ	૩૦.૦૦
સોડિયમ કાર્બોનેટ	૮.૦૦
મેગ્નેશિયમ

LEAFLET BACK

ರೀಜೆನೆಕಸ™
ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ 5% ಇ/ಇ ಡಿಟಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಲಕಷ: ಖೆತಿಬಾಷಿ ವಿಂಚ ವರತಣ ಲಲಿ.

ಪ್ರಸಲ ಅತ ಕೀಟ ಸಮೂಹ ಲಲಿ: ಕಲೆರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ 5% ಇ/ಇ ಡಿಟಿ (ಸಿಯೆ ರೂಪ ವಿಂಚ ವರತಣ ಲಲಿ ಗೆಲಿ) ಇಕ ಔಷ್ಧಾನಿಲಿಕ ಶಾಥಾಮಾಲಿಡ ಕಿಟನಾಶಕ ಹಿ। ಇಸ ಠಿ ಶೆಂ ವಿಂಚ ಪಿಲಿ ತಣಾ ಪ್ರೆಂಕ (ಸಕಿರಪೊಷಾಗಾ ಇನಸಗರ್ಟಾಸ), ಶೆಂ ರೆ ಪತ್ತಿ ಮೆಂಕ (ನಾಷಾಲೆಕರೆಸಿಸ ಮೆತಿನಾಲಿಸ) 'ತಿ ಕಾಬ್ಬು ಪಾಲಿಂ ಲಲಿ ವರತಣ ರಾ ಸೂಶಾಂ ದಿಂತಾ ಜಾಂದಾ ಹಿ। (ಗೆಲಿಆಂ ದೆ ಸಂಖಿಆ)

ಸಿಫಾರಸ:

ಫಸಲ	ಕೀಟಾಂ ದಾ ಆಮ ನಾ	ಪತಿ ಹೆಕ್ಟರ ಮಾತಾ			ಆಖರಿ ಸಪ್ಪೆ ತೋಕಾಲಿ ತಕ ಉಡೀಕ (ದಿನ)
		ಕಿ.ತಿ. (ಗ್ರಾ.)	ಡ್ರಾಗ್ಸ (ಗೆಲಿಆಂ ದಿ ಸಂಖಿಆ)	ಘಿಲ ಪಾಣಿ (ಲಿ.)	
ಝೆಂ	ಪಿಲೆ ತಣಾ ಛೆದಕ (ಸಕಿರಪೊಷಾಗಾ ಇನಸಗರ್ಟಾಸ), ಶೆಂ ಪತ್ತಿ ಮೆಂಕ (ನಾಷಾಲೆಕರೆಸಿಸ ಮೆತಿನಾಲಿಸ)	೪೦-೪೦	೧೦೦೦-೧೨೫೦	ಲಾಗು ನಹಿಂ	೪೨

ವರತಣ ಲಲಿ ದಿಹಾಇತಾಂ/ ವರತಣ ದಾ ತರೀಕಾ ಅತ ಸಮಾಂ/ವರತಣ ದಿ ತಕನಿಕ/ ಬಾರಂಬಾರತಾ ತಿ ಸಪ್ಪೆಂಗಾಂ ದಿ ಅಧಿಕತಮ ಸಂಖಿಆ ಅತ ವರತಣ ಲಲಿ ಫ಼ಸಲ ದಿ ಅವಸಥಾ: ಗೆಲಿಆಂ ದಿ ಲೆತೀದಿ ಸಂಖಿಆ ದೆ ಖೆತ ವಿಚ ಖಿಲಾರ ಕೆ ರೆಂಖೆ। ಇಹ ಪೆಂಕಾ ವರತ ಲಓ ಕಿ ಗೆಲಿಆಂ ರೆಂಖಣ ಸಮೆ ಖೆತ ವಿಚ ೩-೫ ಸೈಂಟೀ ಮೀಟರ ಪಾಣಿ ಖಲೆತಾ ಹೊಣಾ ಚಾಹಿದಾ ಹಿ। ಇಕ ಫ಼ಸಲ ಚೆಂಕರ ವಿಚ ಇಕ ವರತೆಂ ಫ಼ಸಲ ರೋಪಣ ತೆಂ ೧೫-೨೦ ದಿನ ಬಾಅದ ಕೀತೀ ಜಾಏಗಿ ಜದ ಫ಼ಸಲ ದೀಆಂ ವರೂಬಲಾಂ ಸರಗರಮೀ ನಾಲ ಪೂಗರ ರಹೀಆಂ ಹೊಣ ಅತ ತಣಾ ಛೆದಕ ದೆ ಬಾಇಗ ಜಾಂ ಅಂತಿ ಖೆತ ವಿಚ ದಿಖಾಈ ದೇಣ। **ಆಮ ತೌರ'ತಿ ಮೆಸಮಿ ಹಾಲಾತ:** ವಿಪರೀತ ಮೆಸಮಿ ಹಾಲತ ವಿಚ ಜಾ ವರತೆಂ।

ಮಿಟೀ ಅತ ಪಾಣಿ (ಸಿಂಚೆ ವೀ ಲಾಗೂ ಹೋವೆ): ಇಹ ಯಕಿನ ಕರ ಲಓ ಕಿ ವರತಣ ತೆಂ ಘೆಂಟೆ ಘೆಂಟ ೪-೨ ದಿನ ಬಾಅದ ಖೆತ ವಿಚ ಪಾಣೀ ಖಲೆತಾ ರೌವೇ।

ಉಪಕರಣ ಪ್ರಕಾರ: ಸೈನಿಕಲ ಡಿಸಪೌಂಜರ, ರಸಾಇಣ ಪ್ರತೀರೋಧಕ ದಸತಾನೆ ಪಹಿರತ ಕೆ।

ನೆಜ಼ಲ ಲಾಗೂ: ಲಾಗೂ ನಹಿಂ।

ಮಿಲಾಉಣ ಲಲಿ ದಿಹಾಇತ: ಲಾಗೂ ನಹಿಂ।

ವಾಪಸೀ ಪ್ರವೇಶ ಮಿಆದ: ೨೪ ಘಂಟಿಆಂ ದೆ ಬೆಂಧಸ ವಾಲೆ ಪ್ರವೇಸ ಕರಣ ಸೇ (ಆಗತೀಆಂದಿ) ಚೌರಾನ ಇಲಾಜ ಕೀತೆ ಹಲಕೆ ವಿಚ ನಾ ಜಾಓ।

ವಾಪಸೀ ಪ್ರವೇಶ ಮಿಆದ: ಪೂರಬ- ಕಟಾಲಿ ವಕಫ಼ಾ (ಪೀಐಕಆಂದಿ): ೪೨

ಉಹ ಅಸಹಿತಿಆಂ ಜದೆ ಕೆಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಕಿಸೆ ಲಲಿ ಫ಼ಸಲ ವಿಚ ನಹಿಂ ವರತಣಾ ಚಾಹಿದಾ: ಲಾಗೂ ನಹಿಂ।

ಸಾಹಿದ ದೀಆಂ ಮಕಿಆಂ ವರಗೆ ಲಾಭಕಾರಿ ಕೀಟಾಂ ಅತ ಕೀಟಾಂ ದೆ ಕುದರತಿ ವೈರೀಆಂ ನೂಂ ನುಕಸಾನ ನಾ ಪಹುಂಚೆ, ಇಸ ಬಾರೆ ಸಾವಧಾನೀಆಂ: ವಿರಪಾ ಕರಕೆ ಸಾವಧಾನಿ ಝಿಆಂದ ವೇಖೆ।

ವಿಸ಼ಿಲೆ ಅಸರ ದೆ ಲೌಣ: ವಿಸ಼ಿಲೆ ಅಸರ ದೆ ಕೋಈ ಕಲಿನಿಕಲ ಲೌಣ ಜಾಂ ನಿಸಾನ ನಹಿಂ ವೇಖೆ ಗಏ।

ಫ಼ಸರ ಏಡ: ೧. **ನಿಗಲಿ ಜಾಣ'ತಿ :** ಬಹುತ ಸಾರಾ ಪಾಣೀ ಪೀಓ। ಕಿಸೆ ವೀ ಬೆಹೋಸ ವಿಆಕತಿ ದೆ ಉಲಟೀ ಕರನ ಲಈ ಜಾ ಉಕಸಾಓ ಜಾಂ ಮೂಂಹ ರಾಹೀಂ ವೇಖ ಲಓ। ಇಸ ಉಲಟೀ ರೋ ಹೀ ಜಾಏ ತಾಂ ಚುಲೀಆಂ ನಾಲ ಮೂಂಹ ಸಾಫ಼ ಕರೋ ಅತೆ ಫಿರ ತರಲ ಪದಾರಥ ಪಿಲಾಓ। ಡಿಹಿಸಿಸಿಆಂ ದೆ ಛೆಂಕ ಕಾಲ ಕರೋ। ೨. **ಸೂಖ ಚಿಕ ತ'ತಿ:** ಪೀಡಿತ ದೆ ಖಲ್ಲೀ ತಾಜೀ ಹವಾ ವಿಚ ಲೈ ಜಾಓ। ಜೇ ಪೀಡಿತ ಸಾಹ ನಾ ಲೈ ರಿಹಾ ಹೋವೆ ತಾಂ ಸಾಹ ಮುಸ಼ಕಿಲ ನಾಲ ಲೈ ರಿಹಾ ಹೋವೆ, ತಾಂ ಗೈರಕುದರತೀ ಸವಾಸ ದಿವಾಓ ಅತೆ ಡಿಹಿಸಿಸಿಆಂ ದೀ ಛೆಂಕ ಸಲಾಹ ಲಓ। ೩. **ತವಚಾ ನಾಲ ಸಂಪರಕ ಹೋಣ'ತಿ :** ಪಲೀತ ಹೋಏ ವಸತರ ಅತೆ ಬೂಟ ಉತಾರ ದಿಓ, ಪ್ರಭಾವಿತ ಸರೀರಕ ಭಾಗಾಂ ದೂ ಸಾಬಣ ತೆ ಪಾಣೀ ನಾಲ ಚೆಂಗೀ ತರ್ಹಾಂ ಧೋ ದಿಓ। ಜೇ ದರದ, ಲಾಲೀ ಜಾಂ ಜಲಣ ಬಣೀ ರಹೇ, ತಾಂ ಡಾಕಟರ ದೀ ಸಲಾಹ ಲಓ। ಪಲೀತ ಹೋಏ ಸಾರೇ ವಸತರಾಂ ದೂ ವೇಖರೇ ಕರ ಕೆ ಸಾಬಣ ತೆ ಪಾಣೀ ನಾಲ ವೇಖರೇ ದೀ ಧೋಣೇ ಚಾಹೀದೇ ಹನ। **ಜೇ ಅಖಾಂ ನಾಲ ಲಗ ಜಾಏ:** ಸಾಫ಼ ಪಾಣೀ ನಾಲ ಆರಾಮ ನಾಲ ಘಂಟೇಘಂಟ ೧೫ ಮಿಂಟಾಂ ತಕ ಧೋಣೇ ರಹೋ। ಜೇ ದರದ, ಜಲಣ, ಲಾಲೀ ಜಾಂ ರೋಸ಼ನೀ ದಾ ತರ ಕಾಇಮ ರಹೇ ತಾಂ ಡಾಕಟರ ದೀ ಸಲಾಹ ಲಓ।

ವಿಸ಼ಿರೋವಾರಕ ಬಿಆನ: ಕೋಈ ನಿರಧಾರಿತ ವಿಸ಼ ನಿಆರಕ ನಹಿಂ ಹೈ। ಇಸ ಲಈ ಇಲಾಮತೀ ಅತೆ ಸಹಾಇಕ ಇಲಾಜ ಕರಣಾ ಚಾಹೀದಾ ಹೈ।

ಸುರೆಖಿಆ ಸಾವಧಾನೀಆಂ: ದವಾ ದೀ ವರತೋಂ ದೌರಾನ ನಾ ಕುಝ ಖಾಓ ಪೀಓ ನಾ ಹೀ ಧೂಮರಪಾನ ಕರೋ, ನಾ ಪಾನ ಚಬಾಓ। ೨. ದವಾ ದೆ ಹೈಂಡಲ ಕರನ ದೌರಾನ ಬಚಾಅಕಾರೀ ವಸತರ ಪಹಿನೆ ಜಿವೇಂ ಲೀಮೀಆಂ ಬಾಂಹಾಂ ದೀ ಕಮೀಜ಼, ಪತಲೂನ, ರಸಾಇಣ ರೋಧಕ ದಸತಾನೆ, ಮಾಸಕ ಅತೆ ಚೆಂಕೆ ಹೋಏ ಬೂಟ। ಕೀಮ ಖತಮ ಕರನ ಅತೆ ಕುಝ ಖಾಣ ಪೀಣ ತೆ ಪಹಿಲಾಂ ಹೱಥಾಂ ಅತೆ ಸರೀರ ದೇ ಅನಚೆಕೆ ಭಾಗಾಂ ದೂ ಪೂರೀ ತರ್ಹಾಂ ಧೋ ಲಓ। ದವಾ ವರತಣ ತೆಂ ಬಾಅದ ಆಪಣೇ ವಸತರಾಂ ದೂ ಉತಾರ ಕೆ ಧೋ ಲಓ।

ಸರೋವರ : ೧. ಕೀಟನಾಶಕ ದೆ ಪೈಕೇಜಾಂ ದೂ ದೂಜೀಆಂ ಚೀಜಾಂ ವಸತರಾಂ ರೱಖಣ ವಾಲೇ ಕಮರಿಆಂ ತೆ ದೂರ ರೱಖರೇ ಕಮರಿಆಂ ವಿಚ ಜಾಂ ದವಾಈ ದೀ ಕಿಸಮ ಅತೆ ಮಾತರಾ ದೇ ಆಧಾರ'ತಿ ಅಲಗ ಅಲಮಾರೀ ಅಂದರ ತಾಲಾ ಮಾರ ಕೆ ರೱಖೋ। ೨. ಕೀಟನಾಸಕ ರೱಖಣ ವಾಲೇ ಕಮರೇ ಮಜಬೂತ ಬನೇ ಹೋಏ, ಸುಕೇ, ಚೆಂಗೇ ರೋಸನೀದಾರ, ಹವಾದಾರ ಅತೆ ಖುಲ್ಹೇ ಭೂಲ್ಹೇ ಸಾಈಜ಼ ದೇ ಹೋಣೇ ಚಾಹೀದೇ ಹನ ತಾಂ ಕಿ ಹವಾಫ಼ ನಾಲ ಪ್ರದೂಷಣ ನಾ ಫೈಲ ಸಕೇ।

ಖಾಲೀ ಹೋಏ ಕಂಟೆನರಾಂ ದಾ ನಿಪಟಾರಾ : ಖಾಲೀ ಹೋಏ ಪೈಕೆಜಾಂ, ವಾಧೂ ಬರೀದವಾರೀ,ಮಸ಼ೀನಾಂ ದೇ ಘೋಣ ದಾ ನಿಪಟಾರಾ: ೧. ಖಾಲೀ ಹೋಏ ಕೆಂನೆತರಾಂ ದೂ ದುಬಾರಾ ವರತಣಾ ಖತರನಾಕ ಹೈ। ಕಂಟೆನರಾಂ ದೂ ತಿಂನ ಕಾರ ಪಾಣೀ ನಾಲ ಧೋ ಕೆ ಇಸ ಪಾಣೀ ದೂ ಸಪ್ಟೇ ಮಿಕಸ ವಿಚ ಮಿಲಾ ದೇಣಾ ಚಾಹೀದಾ ಹೈ। ೨. ಪೈಕೆಜಾಂ ದೂ ತೇಜ಼ ಭಂನ ಕೆ ಬಸತೀ ತೆಂ ದೂರ ಜಮೀನ ಹೇಠಾಂ ದಬಾ ಕೆ ನಸ಼ರ ಕರ ದಿಓ। ೩. ಖಾಲೀ ಕಂಟೆನರಾಂ ದೂ ಬಾಹರ ನಾ ಪಏ ರಹಿಣ ತದಓ ತಾಂ ಕಿ ದುಬಾರಾ ನಾ ವರತೇ ಜಾ ಸಕಣ। ೪. ಇಹ ನದೀನಾಸಕ ದೇ ನಿರಮಾತಾ, ಫಾರಮೂಲೇರ ತೇ ವರತಣ ವಾಲೇ ದಾ ಫ಼ರಜ಼ ಹೈ ಕಿ ವಾಧೂ ಬಚೀ ದವಾಈ, ಮಸ಼ೀನ ವಿಚೋಂ ನಿಕಲೇ ಹೋಣ ದೇ ಪಾಣೀ ಅತೆ ಕಂಟೆನರಾಂ ದಾ ನಿಪಟಾರಾ ಏದಾಂ ದೇ ಸುರೆಖಿಆ ನಾಲ ಕರನ ಕಿ ಇಸ ನಾಲ ವಾತಾವರಣ ಅತೆ ಪಾಣೀ ದಾ ಪ್ರದೂಷಣ ನಾ ಹೋವೇ।

ರಸಾಇಣಕ ಮಿಸ್ರಣ:

ತತ	ವಜನ (%ಇ/ಇ)
ಕಲೆರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ ಏ. ಆಈ.	೫.೦೦
ಸೈಲಿಅಮ ಡಾಯಿಕಟಾಇಲ-ಸಲಫೋಸಕಸಿನೆಟ	೦.೬೦
ಪೋಲಿಕಾರಬೋಕಸಿಲೇಟ	೭.೫೦
ಡಿ, ಎಲ- ಟಾರಟಾರಿಕ ಏಸಿಡ	೨೧.೦೦
ಸೈಲಿಅಮ ಬಾಈ-ಕಾರಬೋನೇಟ	೩೦.೦೦
ಸೈಲಿಅಮ ಕಾರಬೋನೇಟ	೮.೦೦
ಮಗನೇಶಿಅಮ ಸಟೀಅರೇಟ	೦.೨೦
ಡೋಂಟೆನಿಅಮ ಬೈನಜೋಯಟ	೦.೦೫
ಪೋಲಿ (ಆಕಸೀ-೧,೨- ಇಥಾನೆಡಾಇಲ), ಆ- ಹಾಇಡ್ರೆ- ಆ -ಹಾಇಡ್ರಾಕ್ಸೀ-ಇಥೀನ- ೧,೨-ಡಾಇಲ, ಇಥಾಕಸಿಲೇಟ	೫.೦೦
ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ ಏ. ಆಈ.	೫.೦೦
ಕುಲ	೧೦೦.೦೦

ಸಾವಧಾನೀ : ೧. ಲೆಬಲ/ ಪರಚೆ ವಿಚ ನಿರಧಾರಿತ ಕೀತೆ ಬಿನಾ ಕಿಸೇ ವೀ ಹೋರ ಮತಲಬ ಲಲಿ ನಾ ವರತೋ। ೨. ಜೋ ಉತಪಾದ ಜಲ-ಜೀವ ಅತೆ ಮೌಜೀಆಂ ಲಈ ಬಹುತ ಜಹರೀಲಾ ಹೈ, ಜೋ ಜಲ ದೇ ಜೀವಾಂ ಲಈ ದರಮಿಆನಾ ಜಹರೀಲಾ ಹೈ ಇಸಲಈ ಇಸ ಉತಪಾದ ದಾ ಇಸತೇಮಾಲ ಮೌಜೀಪಾಲತ ದೇ ನೈ ಅತೆ ದಿನ ದೇ ಸಮೇ ಸ಼ಹಿದ ದೀಆಂ ಮೌಜೀಆಂ ದೇ ಚಾರೇ ದೇ ಆಲೇ-ದುಆಲೇ ಸರಗರಮ ರಹಿತ ದೇಸ ದೌರಾನ ನಹಿಂ ಕೀತಾ ಜಾಣಾ ಚಾಹೀದಾ ಹೈ।

ನಿರಮಾತಾ ಅತೆ ವಿಕ್ರೇತಾ: ಔಗ್ರ ಔಮ.ಸೀ. ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಈವೇಟ ಲಿಮಿಟೇಡ, ರಜಿಸಟರ. ಆಫಿಸ: ಫೀನಿಕಸ ಪೈರಾಗನ ಪಲಾಜಾ, ಯೂನಿಟ ನಂಬರ - ೨ಬಿ-೩೯-೪೧,ರಂಡದ ಅಂತಸ್ತು, ಫಿನಿಕ್ಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಟಿ,ಎಲ.ಬಿ.ಎಸ ಮಾರ್ಗ,(ಕುರಲಾ ವೆಸ್ಟ), ಮುಂಬಾಯಿ-400070, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. **ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ:** ಗ್ರಾಮಂ ನಿಂಬಾಸ, ಪೋಸ್ಟ ಆಫಿಸ ಮುಬಾರಕಪೂರ್, ತಿಹಸೀಲ-ಡೆರಾ ಬಾಸಿ, ಜಿಲ್ಲ : ಎಸ.ಎ.ಎಸ ನಗರ (ಮೊಹಾಲಿ), ಪಂಜಾಬ್, ಪಿನಕೋಡ್ -140507.

ರಿಸೋನಿಕ್ಸ್™
ಕ್ಲೋರಂಟ್ರನಿಲಿಪ್ರೋಲ 5% W / W DT
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಉದ್ದೇಶ: ಕೃಷಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ.

ಎಂಟ - ತೆಗುಳು ಗ್ರೂಪ್ ಕೀಟಂ: ಕ್ಲೋರಂಟ್ರನಿಲಿಪ್ರೋಲ 5% w//w DT (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಡಿಸಲು ಕೊಸಂ ಪಾಲ್ಬಿಟ್) ಒಕ ಯಂತ್ರಾನಿಲಿಕ ಡಯಾಮೈಡ್ ಕೀಟನಾಶನಿಗಿ ವರಿ ಪಂಟನಾಶಿಂಚೆ ವಿಧವಾಚ ಚ್ಯ(ಸ್ಕೆಲೋಫಾಗಾ ಇನಸಿರ್ಯುಲಸ್)ವರಿ ಆಕುಮುಡತ (ನಫಲೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್).

ಸಿಫಾರಸು:

ಸಂಖ	ಕೀಟಾಲು ಸಿಫಾಸ್ಸುಂಗಾ ಪಿಲಿವೆ ಪೆರು	ಹೆಕ್ಟಾರುಕು ಮೊತ್ತಾಲು		ಮಿಂ ನಿಲ್ಚುಟ ಕೊರಕು ಸೆಲ್ಲುಬಡೆಡು ಸಮಯಂ (ರೋಜುಲು)
		ಮಿಲಿ. (ಗ್ರಾ.)	ಮಾತ್ರಿಕಂಗಾ ಬ್ರೌಜ್ಡಿಮ ಸಂಖ್ಯ	ವಾಡಾಲ್ಸಿನ ನೀರು ಮೊತ್ತಂ (ಲಿ.)	
೧	ವರಿ ಸುವ್ವಕಂಕಿ ಲೆದಾ ಮುವ್ವಚುವು (ಸಿರೆಲ್ಫಾಗಾ ಇನಸರ್ಯುಲಸ್), ವರಿ ಆಕುಮುಡತ (ನಫ್ಲಕ್ರೆಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್)	40-50	1000-1250	ವುಂಡಲು	47

ವಾಡುಕು ಸೂಚನಲು/ವಾಡಾಲ್ಸಿನ ವಿಧಾನಮು ಮರಿಯು ಸಮಯಂ/ವಾಡುಕಲೆ ಮಿಶುಕುವಲು/ಎನ್ನಿ ಸ�ರ್ಲು ವಾಡಾಲಿ ತೌಪಾಟು ಸ್ಪ್ರೆಲ ಗಿರಿಪ್ಪ ಸಂಖ್ಯ ಮರಿಯು ವಂಟ ಏ ದಶಲೋ ದಿನ್ನಿ ವಾಡಾಲಿ : ಅವಸರಮೈನನ್ನಿ ಬ್ಯಾಟ್ಟಲನುನ್ನಂಟಿಸಿ ಅನ್ನಿಂಟಿಸಿ ಪಾಲಮಂತಾ ಏಕರಿತಿಲೋ ಪೆಟ್ಟಲೆಗಾ.ಪಿಚಿನಿ ಪಾಲಂಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕುನೆಟಪ್ಪುಡು ಪಾಲಂಲೋ 3 -5 ಸಂ. ಮೀ., ಎತ್ತುಲೆ ನೀರು ನಿಲ್ಚ ವುಂಡಾಲೆ ನಿಶ್ಚಯಿಂಚುಕೌವಾಲಿ.

ಪ್ರಸಾದ ಏಡ: ೧. **ನಿಗಲಿ ಜಾಣ'ತಿ :** ಬಹುತ ಸಾರಾ ಪಾಣೀ ಪೀಓ। ಕಿಸೇ ವೀ ಬೆಹೋಸ ವಿಆಕತಿ ದೆ ಉಲಟೀ ಕರನ ಲಈ ಜಾ ಉಕಸಾಓ ಜಾಂ ಮೂಂಹ ರಾಹೀಂ ವೇಖ ಲಓ। ಇಸ ಉಲಟೀ ರೋ ಹೀ ಜಾಏ ತಾಂ ಚುಲೀಆಂ ನಾಲ ಮೂಂಹ ಸಾಫ಼ ಕರೋ ಅತೆ ಫಿರ ತರಲ ಪದಾರಥ ಪಿಲಾಓ। ಡಿಹಿಸಿಸಿಆಂ ದೆ ಛೆಂಕ ಕಾಲ ಕರೋ। ೨. **ಸೂಖ ಚಿಕ ತ'ತಿ:** ಪೀಡಿತ ದೆ ಖಲ್ಲೀ ತಾಜೀ ಹವಾ ವಿಚ ಲೈ ಜಾಓ। ಜೇ ಪೀಡಿತ ಸಾಹ ನಾ ಲೈ ರಿಹಾ ಹೋವೆ ತಾಂ ಸಾಹ ಮುಸ಼ಕಿಲ ನಾಲ ಲೈ ರಿಹಾ ಹೋವೆ, ತಾಂ ಗೈರಕುದರತೀ ಸವಾಸ ದಿವಾಓ ಅತೆ ಡಿಹಿಸಿಸಿಆಂ ದೀ ಛೆಂಕ ಸಲಾಹ ಲಓ। ೩. **ತವಚಾ ನಾಲ ಸಂಪರಕ ಹೋಣ'ತಿ :** ಪಲೀತ ಹೋಏ ವಸತರ ಅತೆ ಬೂಟ ಉತಾರ ದಿಓ, ಪ್ರಭಾವಿತ ಸರೀರಕ ಭಾಗಾಂ ದೂ ಸಾಬಣ ತೆ ಪಾಣೀ ನಾಲ ಚೆಂಗೀ ತರ್ಹಾಂ ಧೋ ದಿಓ। ಜೇ ದರದ, ಲಾಲೀ ಜಾಂ ಜಲಣ ಬಣೀ ರಹೇ, ತಾಂ ಡಾಕಟರ ದೀ ಸಲಾಹ ಲಓ। ಪಲೀತ ಹೋಏ ಸಾರೇ ವಸತರಾಂ ದೂ ವೇಖರೇ ಕರ ಕೆ ಸಾಬಣ ತೆ ಪಾಣೀ ನಾಲ ವೇಖರೇ ದೀ ಧೋಣೇ ಚಾಹೀದೇ ಹನ। **ಜೇ ಅಖಾಂ ನಾಲ ಲಗ ಜಾಏ:** ಸಾಫ಼ ಪಾಣೀ ನಾಲ ಆರಾಮ ನಾಲ ಘಂಟೇಘಂಟ ೧೫ ಮಿಂಟಾಂ ತಕ ಧೋಣೇ ರಹೋ। ಜೇ ದರದ, ಜಲಣ, ಲಾಲೀ ಜಾಂ ರೋಸ಼ನೀ ದಾ ತರ ಕಾಇಮ ರಹೇ ತಾಂ ಡಾಕಟರ ದೀ ಸಲಾಹ ಲಓ।

ವಿಸ಼ಿರೋವಾರಕ ಬಿಆನ: ಕೋಈ ನಿರಧಾರಿತ ವಿಸ಼ ನಿಆರಕ ನಹಿಂ ಹೈ। ಇಸ ಲಈ ಇಲಾಮತೀ ಅತೆ ಸಹಾಇಕ ಇಲಾಜ ಕರಣಾ ಚಾಹೀದಾ ಹೈ।

ಸುರೆಖಿಆ ಸಾವಧಾನೀಆಂ: ದವಾ ದೀ ವರತೋಂ ದೌರಾನ ನಾ ಕುಝ ಖಾಓ ಪೀಓ ನಾ ಹೀ ಧೂಮರಪಾನ ಕರೋ, ನಾ ಪಾನ ಚಬಾಓ। ೨. ದವಾ ದೆ ಹೈಂಡಲ ಕರನ ದೌರಾನ ಬಚಾಅಕಾರೀ ವಸತರ ಪಹಿನೆ ಜಿವೇಂ ಲೀಮೀಆಂ ಬಾಂಹಾಂ ದೀ ಕಮೀಜ಼, ಪತಲೂನ, ರಸಾಇಣ ರೋಧಕ ದಸತಾನೆ, ಮಾಸಕ ಅತೆ ಚೆಂಕೆ ಹೋಏ ಬೂಟ। ಕೀಮ ಖತಮ ಕರನ ಅತೆ ಕುಝ ಖಾಣ ಪೀಣ ತೆ ಪಹಿಲಾಂ ಹೱಥಾಂ ಅತೆ ಸರೀರ ದೇ ಅನಚೆಕೆ ಭಾಗಾಂ ದೂ ಪೂರೀ ತರ್ಹಾಂ ಧೋ ಲಓ। ದವಾ ವರತಣ ತೆಂ ಬಾಅದ ಆಪಣೇ ವಸತರಾಂ ದೂ ಉತಾರ ಕೆ ಧೋ ಲಓ।

ಸರೋವರ : ೧. ಕೀಟನಾಶಕ ದೆ ಪೈಕೇಜಾಂ ದೂ ದೂಜೀಆಂ ಚೀಜಾಂ ವಸತರಾಂ ರೱಖಣ ವಾಲೇ ಕಮರಿಆಂ ತೆ ದೂರ ರೱಖರೇ ಕಮರಿಆಂ ವಿಚ ಜಾಂ ದವಾಈ ದೀ ಕಿಸಮ ಅತೆ ಮಾತರಾ ದೇ ಆಧಾರ'ತಿ ಅಲಗ ಅಲಮಾರೀ ಅಂದರ ತಾಲಾ ಮಾರ ಕೆ ರೱಖೋ। ೨. ಕೀಟನಾಸಕ ರೱಖಣ ವಾಲೇ ಕಮರೇ ಮಜಬೂತ ಬನೇ ಹೋಏ, ಸುಕೇ, ಚೆಂಗೇ ರೋಸನೀದಾರ, ಹವಾದಾರ ಅತೆ ಖುಲ್ಹೇ ಭೂಲ್ಹೇ ಸಾಈಜ಼ ದೇ ಹೋಣೇ ಚಾಹೀದೇ ಹನ ತಾಂ ಕಿ ಹವಾಫ಼ ನಾಲ ಪ್ರದೂಷಣ ನಾ ಫೈಲ ಸಕೇ।

ಖಾಲೀ ಹೋಏ ಕಂಟೆನರಾಂ ದಾ ನಿಪಟಾರಾ : ಖಾಲೀ ಹೋಏ ಪೈಕೆಜಾಂ, ವಾಧೂ ಬರೀದವಾರೀ,ಮಸ಼ೀನಾಂ ದೇ ಘೋಣ ದಾ ನಿಪಟಾರಾ: ೧. ಖಾಲೀ ಹೋಏ ಕೆಂನೆತರಾಂ ದೂ ದುಬಾರಾ ವರತಣಾ ಖತರನಾಕ ಹೈ। ಕಂಟೆನರಾಂ ದೂ ತಿಂನ ಕಾರ ಪಾಣೀ ನಾಲ ಧೋ ಕೆ ಇಸ ಪಾಣೀ ದೂ ಸಪ್ಟೇ ಮಿಕಸ ವಿಚ ಮಿಲಾ ದೇಣಾ ಚಾಹೀದಾ ಹೈ। ೨. ಪೈಕೆಜಾಂ ದೂ ತೇಜ಼ ಭಂನ ಕೆ ಬಸತೀ ತೆಂ ದೂರ ಜಮೀನ ಹೇಠಾಂ ದಬಾ ಕೆ ನಸ಼ರ ಕರ ದಿಓ। ೩. ಖಾಲೀ ಕಂಟೆನರಾಂ ದೂ ಬಾಹರ ನಾ ಪಏ ರಹಿಣ ತದಓ ತಾಂ ಕಿ ದುಬಾರಾ ನಾ ವರತೇ ಜಾ ಸಕಣ। ೪. ಇಹ ನದೀನಾಸಕ ದೇ ನಿರಮಾತಾ, ಫಾರಮೂಲೇರ ತೇ ವರತಣ ವಾಲೇ ದಾ ಫ಼ರಜ಼ ಹೈ ಕಿ ವಾಧೂ ಬಚೀ ದವಾಈ, ಮಸ಼ೀನ ವಿಚೋಂ ನಿಕಲೇ ಹೋಣ ದೇ ಪಾಣೀ ಅತೆ ಕಂಟೆನರಾಂ ದಾ ನಿಪಟಾರಾ ಏದಾಂ ದೇ ಸುರೆಖಿಆ ನಾಲ ಕರನ ಕಿ ಇಸ ನಾಲ ವಾತಾವರಣ ಅತೆ ಪಾಣೀ ದಾ ಪ್ರದೂಷಣ ನಾ ಹೋವೇ।

ಸುರಕ್ಷಿತತೆ ತೆಗುಸುಕೊಳಬೆಸಿನ ಮುಂದುಜಾಗ್ರತ್ತಲು: ದಿನ್ನಿ ಜಲ್ಲೆಬಟ್ಟುಡು ವಿಧ್ರಿನಾ ತಿನಡಂ,ಗ್ರಾಗಟಂ,ಲೆದಾ ಪಾಗೆಲ್ಪುದಂ ಮರಿಯು ಕಿಳ್ಳೆ ದೆದಾ ತಮುಂಡಾಲು ನುಮುಂದಂ ಪಾಲುಬಡುತುಂದಿ. ದಿನ್ನಿ ಜಲ್ಲೆವಾರು ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ಷಣ ದುಸ್ತುಲನು ಧರಿಂಚಾಲಿ. ಅಂದೆ: ಪಾದವಾಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ಸುಲು ಪ್ಯಾಂಟ್,ತಿಮಿಲ್ಸುನು ಅಟ್ಟುಕೌಗಲ ಚೆತಿ ಕೊಡುಗುಲು, ಮುಖಾನಿಕಿ ಮಾಸ್ಕು, ಕಾಳುಕು ಬೂಟು, ಕಳುಕು ಸಲ್ಲಕಳ್ಳದಾಲು, ತಲಕು ಟೋಪಿ ಲಾಂಟಿವಿ ಧರಿಂಚಾಲಿ. ದಿನ್ನಿ ಜಲ್ಲುಕೌಂದಂ ಅಯಿಪೋಗಾನೆ ಕಾಳ್ಳು, ಚೆತುಲನು ಅಲೌಗೆ ತುಂದುಲು ಪಡಿನ ಶರೀರಭಾಗಾಲನು, ಮರಿಯು ವಿಧ್ರಿನಾ ತಿನಡಾನಿಕಿ, ಗ್ರಾಗಡಾನಿಕಿ ಮರಿಯು ಪಾಗೆಲ್ಪುದಾನಿಕಿ ಮುಂದು ಸಬ್ಬುವಾಡುತಾ ಎಕ್ಕುನ ನೀಟಿತೆ ಶುಭ್ರಪರುಚುಕೌವಾಲಿ. ಪಿಚಿತಾರಿ ನಿನ ಅನ್ನಾನೆ ಕಲುಷಿತಮೈನ ಬಟ್ಟಲನು ತೀಸಿನೆ ಪೆರುಗಾ ಉತುಕುನಿ ಅರಿಸುಬಡುತಾಲಿ.

ನಿಲ್ವು: 1.ಕೀಟನಾಶಿನಿ ನಿಲ್ವ ಚೇಸಿ ಗಡುಲು ಲೆದಾ ಆಹರಣಲು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಮುಲನು ಅಂಟೆ ಮರಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಆಹರ ಪದಾರ್ಥಮುಲನು, ಪಶುವುಲ ದಾಣಾನು ನಿಲ್ವ ಚೇಸಿ ಗಡುಲು ಆಹರಣಕು ದೂರಂಗಾ ನೀಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾನು ಮರಿಯು ನೈಜಾನ್ಬಟ್ಟಿ ನೆರುನೆರು ಅಲಮಾರಾಲೋ ಪೆಟ್ಟಿ ತಾಳಂ ಪೆಸಿ ಬಿಗಿಂಚಿ ಮೂಸಿವಿ ಜಿಲ್ಲ ಚೇಯಾಲಿ. 2. ಕೀಟನಾಶಿನಿ ನಿಲ್ವ ಚೇಸಿ ಗಡುಲು ಲೆದಾ ಆಹ