ଅମାଡିସ®

ପାଇରିପ୍ରୋକ୍ସିଫେନ୍ ୧୦% ଇସି
(କୀଟନାଶକ)

ସତର୍କତା:

ଲେବଲ୍ ଓ ଲିଫଲେଟ୍‌ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନଥିବା ଫସଲ ଓ କୀଟ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୁହେଁ । ଲିଫଲେଟ୍‌ସ ଅମଳ ପରସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।

ମାଛ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ/କ୍ଷତିକାରକ–ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ ବା ଝରଣାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ପାଇରିପ୍ରୋକ୍ସିଫେନ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୀଟ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯାହା ଏମ୍ବ୍ରିଓଜେନେସିସ୍‌କୁ ଦବାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କୀଟର ମେଟାମୋର୍ଫୋସିସ୍ ଓ ପ୍ରଜନନକୁ ନିଷେଧ କରିଥାଏ । ଏହା କପା ଫସଲ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଓ ଲଙ୍କା ଫସଲ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶୋଷଣକାରୀ କୀଟପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

ସୁପାରିଶ :

ଫସଲ	ରୋଗର ସାଧାରଣ ନାମ	ମାତ୍ରା/ହେକ୍ଟର		ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ (ଲିଟର)	ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ ଓ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନରେ)
		ଏ.ଆଇ. (ଗ୍ରାମ)	ମିଶ୍ରଣ (ମି.ଲି)		
କପା	**ଧବଳମକ୍ଷିକା**	**୫୦**	**୫୦୦**	**୫୦୦**	**୫୦**
ଲଙ୍କା	**ଧବଳମକ୍ଷିକା, ଏଫିଡ୍‌ସ**	**୫୦**	**୫୦୦**	**୩୦୦**	**୭**
ବାଇଗଣ	ଧଳା ମାଛି, ଜଉଆ	୫୦	୫୦୦	୩୦୦	୭
ଭେଣ୍ଡି	ଧଳା ମାଛି, ଜଉଆ	୫୦	୫୦୦	୩୦୦	୭

ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି: ଏହା ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଉଚିତ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଅବସ୍ଥା ସୁପାରିଶକୃତ ନୁହେଁ । ଫୁଲଧାରଣ ସମୟରେ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ (ପିଏଚ୍‌ଆଇକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫଳପ୍ରଦ କୀଟପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ସମାନ କଭରେଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ହୋଲୋ କୋନ୍ ନୋଜଲ୍ ପ୍ରକାର ର ଫିଟ୍ ହେଉଥିବା ସରଳ ନାପସ୍ୟାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ।

ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ରବଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସୁପାରିଶକୃତ ମାତ୍ରାକୁ ଫେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସିଞ୍ଚନ ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା ସୁପାରିଶକୃତ ଜଳ ପରିମାଣର ୧/୪ ରେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ । ଅନବରତ ଫେଣ୍ଟିବା ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳ ମିଶାନ୍ତୁ । ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ରବଣ ସିଞ୍ଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ । ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ଫେଣ୍ଟିବା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ: ଖେତରେ କୀଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଇକୋନୋମିକ୍ ଥ୍ରେଶହୋଲ୍ଡ ଲିଭେଲ୍ (ଇଟିଏଲ୍) ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପାଗ ପରିଷ୍କାର, ଶାନ୍ତ ଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ନଥିବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରୟୋଗ ସଂଖ୍ୟା: କୀଟ ସଂକ୍ରମଣ ଅନୁସାରେ ୭–୧୪ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ୨–୩ ସିଞ୍ଚନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ତିନୋଟି ସିଞ୍ଚନରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ ।

ପୁନଃ–ପ୍ରବେଶ ଅବଧି: ଫସଲରେ ସିଞ୍ଚନ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ପରେ ।

ସୁରକ୍ଷା: ମିଶ୍ରଣ ଓ ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ପୋଷାକ ଓ ଶରୀରର ଅଂଶକୁ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ । ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ଧୂମ୍ରପାନ, ପାନୀୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚୋବାଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ।

ବିଷଗ୍ରସ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ: ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡବୁଲାଇବା, ଦୁର୍ବଳତା, ବମନ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ବା ଇସୋଫାଗସ୍ ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ୍ ଟ୍ରାକ୍‌ର ଜଳନ ।

ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ:

ଯଦି ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁକୁ ନିଅନ୍ତୁ । ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡକାନ୍ତୁ ।

ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଘଟଣାରେ ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଛାଟି ଅନ୍ତତଃ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସଫା କରନ୍ତୁ (କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍‌ସ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ସହଜରେ ସମ୍ଭବ) ତେବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଯଦି ତ୍ୱଚା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ ପ୍ରଚୁର ସାବୁନ ଓ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ । ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ରମିତ ପୋଷାକକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଗିଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ପାଟିକୁ ପାଣିରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ । ତତ୍‌କ୍ଷଣାତ୍ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ।

ବିଷଘ୍ନ : କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷଘ୍ନ ଜଣାନାହିଁ । ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରର ବିନାଶ: ୧. ପରିବେଶ ତଥା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବା ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସଫାକାର୍ଯ୍ୟ ନିରାପଦ ଉପାୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ୨. ପୁନର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାହାରେ ରଖାଯିବା ଅନୁଚିତ୍ । ୩. ଖାଲି ପାତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଭାଙ୍ଗି ପୋତାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

"ଖାଲି କଣ୍ଟେନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦଜନକ ଅଟେ ।"

ସଂରକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା: କୀଟନାଶକ ଗଚ୍ଛିତ ପ୍ୟାକ୍‌କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷ ଅଥବା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲମୀରାରେ ବନ୍ଦକରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କି (ଚାବି) କୀଟନାଶକର ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।

ସଂରକ୍ଷଣ କକ୍ଷ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ମିତ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନେବା ଆଣିବା କରିହେଉଥିବା, ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳକ୍ଷମ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ । ସଂରକ୍ଷଣର ଶୁଷ୍କ ଓ ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ହେବା ଉଚିତ ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

ସଂରଚନା:	ପରିମାଣ (% ଓ/ଓ)
ପାଇରିପ୍ରୋକ୍ସିଫେନ୍ ଏ.ଆଇ.	୧୦.୦୦%
ଇମୁଲ୍‌ସିଫାୟର୍ସ:	
ଅଲକିଲ୍ ଆରିଲ ସଲଫୋନେଟ୍‌ର ଆୟୋନିକ୍ ଓ ନୋନିଓନିକ୍ କେ–ସଲ୍‌ଟ ଓ ପଲି ଅକ୍ସି ଏଥିଲିନ୍ ଇଥର ର ମିଶ୍ରଣ	୮.୦୦%
ସଲଭେଣ୍ଟ ସିଆଇଏକ୍ସ:	କ୍ୟୁଏସ୍
ମୋଟ୍	**୧୦୦% ଓ/ଓ**
ସାନ୍ଦ୍ରତା:	୦.୯୨±୦.୦୨ ଗ୍ରା/ସିସି

ସାବଧାନତା: ଏହି ଲେବଲ / ଲିଫ୍‌ଲେଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ବିପଣନକର୍ତ୍ତା : ଏଫ୍‌ଏମ୍‌ସି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ, ଟିସିଜି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍, 2ୟ ମହଲା, ସି–53, ବାନ୍ଦ୍ରା କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବାନ୍ଦ୍ରା (ପୂ), ବାନ୍ଦ୍ରା ସବ୍‌ଅର୍ବାନ୍, ମୁମ୍ବଇ – 400098, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଇଣ୍ଡିଆ ।

ନିର୍ମାତା : ପାରିଜାତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀଜ୍ (ଇଣ୍ଡିଆ) ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ । ଗ୍ରାମ ଖେରା ଗନି, ଫତେହଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ, ରାୟପୁର ରାଣୀ ରୋଡ, ଜିଲ୍ଲା: ଅମ୍ବାଲା, ହରିୟାଣା, ୧୩୪୨୦୧, ଭାରତ ।

அமாடிஸ்®

பைரிப்ரோக்ஸிஃபென் 10% EC
(பூச்சிக்கொல்லி)

எச்சரிக்கை:
லேபிள் மற்றும் பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டவை தவிர வேறு பயிர்கள் மற்றும் பூச்சிகள் மீதாக தெளிக்கக் கூடாது.
அறுவடைக்குப் பின்னர் பயன்படுத்தக் கூடாது.

"மீன்களுக்கு அபாயகரமானது/ தீங்கானது. குளங்கள், குட்டைகள், ஆறுகள் அல்லது நீரோடைகளை மாசுபடுத்தக் கூடாது"

பைரிப்ரோக்ஸிஃபென் உடல்முழுவதும் பரவி வேலை செய்யும் வளர்ச்சி ரெகுலேட்டர் ஆகும். இது பூச்சிகளில் முட்டைகள் மற்றும் புழு பூச்சியாக வளர்ச்சியடைதல் மற்றும் பூச்சிகளின் இனப்பெருக்கம் ஆகியவற்றை தடுக்கிறது. இது பருத்தி கத்தரி மற்றும் வெண்டை பயிரில் ராறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப்பெயர்	ஹெக்டேருக்கான மருந்தளவு			கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு காத்திருக்கும் காலம்
		ஏ.ஐ. (கிலோ)	கலவை (மி.லி.)	கரைசல் (லிட்டர்)	
பருத்தி	**வெள்ளை ஈ**	50	500	500	50
மிளகாய்	**வெள்ளை ஈக்கள், அந்துக்கள்**	50	500	300	7
கத்தரி	வெள்ளை ஈ, தத்துப்பூச்சி	50	500	300	7
வெண்டை	வெள்ளை ஈ, தத்துப்பூச்சி	50	500	300	7

பயன்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்:

பயன்படுத்தும் முறை: இதனை ஃபோலியர் தெளிப்பானில் பயன்படுத்த வேண்டும். குறிப்பிட்ட மண் நிலைகள் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. பூப்பூக்கும்போது மற்றும் (பிஎச்ஐ-யை கண்காணித்த பின்னர்) அறுவடைக்கு சற்று முன்னதாக பயன்படுத்தக் கூடாது. பூச்சிகளை ஆற்றலுடன் கட்டுப்படுத்த ஒரே மாதிரியாக தெளிப்பது அவசியமானது. தெளிக்க ஹாலோ கோன் நாஸல் வகை பொருத்தப்பட்ட எளிய நாப்சாக் ஸ்பிரேயர் கொண்டு தெளிக்கலாம்.

தெளிப்பு கரைசலை உருவாக்குதல்: பரிந்துரைக்கப்பட்ட தண்ணீரில் 1/4 பங்கில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்தளவை தெளிப்பான் டேங்கில் ஊற்றி கலக்கவும். தொடர்ந்து கலக்கிக் கொண்டே மீதியுள்ள தண்ணீரை ஊற்றவும். தெளிப்புக்கான கரைசலை தெளிக்கும் முன்பாக மருந்து முழுவதுமாக தண்ணீரில் கலந்துள்ளதை உறுதி செய்யவும்.

பயன்படுத்தும் நேரம்: வயலில் பூச்சிகள் தோன்றியதுமே மருந்தை தெளிக்கவும். ஆனால் அது கட்டுப்படுத்தும் உச்ச அளவை(ஈடிஎல்) அடையும் முன்பாக தெளிக்கவும். காலநிலை தெளிவாக, அமைதியாக இருக்க வேண்டும். மழை பெய்யவோ, வேகமாக காற்று வீசுவதாகவே இருக்கக் கூடாது.

பயன்படுத்தும் முறைகள்: பூச்சியின் பரவலை பொறுத்து 7-14 நாட்கள் இடைவெளியில் தேவைக்கேற்ப 2-3 முறை தெளிக்கவும். ஒரு பருவத்தில் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறைகள் தெளிக்கக் கூடாது.

மீண்டும் தெளிக்கும் காலம்: பயிரில் தெளிக்கப்பட்ட மருந்து உலர்ந்ததும் தெளிக்கவும்.

பாதுகாப்பு: கலந்து தெளிக்கும்போது பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணிய வேண்டும். பயன்படுத்திய பிறகு மருந்து பட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை கழுவவும். உட்சுவாசிப்பதை தவிர்க்கவும். பயன்படுத்தும்போது புகைப்பிடிக்க, பானங்கள் அருந்த, சாப்பிட மற்றும் எதையும் மெல்லக் கூடாது.

விஷமேறியதற்கான அறிகுறிகள்: தலைவலி, தலைசுற்றல், பலவீனம், குமட்டல் மற்றும் ஈஸோபிகஸ் அல்லது உணவுப்பாதையில் எரிச்சல் அல்லது எரிதல்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள்:

உட்சுவாசித்து விட்டால் நோயாளியை காறறோட்டம் உள்ள இடத்திற்கு கொண்டு செல்லவும். மருத்துவரை உடனே அழைக்கவும்.

கண்களில் பட்டுவிட்டால் (எளிதாக எடுக்க முடிந்ததாக இருந்தால் கன்டாக்ட் லென்ஸ்களை நீக்கி விடவும்) குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான தண்ணீர் விட்டு கழுவவும். அதன் பின் மருத்துவரிடம் கொண்டு செல்லவும்.

சருமத்தில் பட்டுவிட்டால் ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் விட்டு கழுவவும். மருந்து பட்ட ஆடைகளை மீண்டும் பயன்படுத்தும் முன்பாக துவைக்கவும். விழுங்கிவிட்டால், வாயை கொப்புளிக்கவும். உடனே மருத்துவரை அழைக்கவும்.

எதிர் மருந்து: குறிப்பிட்ட எதிர் மருந்து இல்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சைஅளிக்கவும். பயன்படுத்திய கண்டெய்னரை

அப்புறப்படுத்துதல்: 1. சுற்றுப்புறம் மற்றும் தண்ணீர் மாசுபடுவதை தடுக்கும் வகையில் பேக்கேஜ் அல்லது எஞ்சியுள்ள மருந்துக்கலவை மற்றும் மெஷினை கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்கள் அல்லது பேக்கேஜ்களை மீண்டும் பயன்படுத்தும் வண்ணம் வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. வெற்று கொள்கலன்களை உடைத்து குடியிருப்பு பகுதிக்கு அப்பால் புதைக்க வேண்டும்.

"வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமனாது"

சேமித்து வைக்கும் நிலைகள்: பூச்சிக்கொல்லி கொண்ட பேக்கேஜ்களை மற்ற பொருட்களை சேமித்து வைக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களிலிருந்து தொலைவில் உள்ள அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களில் பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையை பொறுத்து பூட்டு சாவியுள்ள அலமாரிகளில் வைக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு எட்டாத இடத்தில் வைக்கவும்.

சேமித்து வைக்கும் அறை நன்கு கட்டப்பட்டு, நல்ல வெளிச்சம், காற்றோட்டம் உள்ளதாக மற்றும் போதுமான பரிமாணங்களில் இருக்க வேண்டும். சேமித்து வைக்கப்படும் நிலை ஈரமில்லாததாக மற்றும் குளிர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும்.

ரசாயன சேர்க்கை:

சேர்க்கை	உட்பொருள் (% w/w)
பைரிப்ரோக்ஸிஃபென் ஏ.ஐ.	10.00%
எமல்ஸிஃபயர்ஸ்:	
அல்கைல் சல்ஃபோனேட் மற்றும் பாலி ஆக்ஸிஎத்திலின் ஈத்தரின் அயனிக் மற்றும் நான் அயனிக் சிஏ சால்ட் கலவை	8.00%
சால்வென்ட்:	க்யூஎஸ்
மொத்தம்	100% w/w
அடர்த்தி:	0.92±0.02g/cc

எச்சரிக்கை : இந்த லேபிலில் / கையேட்டில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

விற்பனை: எஃப்எம்சி இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், டிசிஜி ஃபைனான்ஷியல் சென்டர், 2வது தளம், இ-53, பாந்திரா குர்லா காம்ப்ளெக்ஸ், பாந்திரா (கி), பாந்திரா சபர்பன், ம்பை - 400098, மகாராஷ்டிரா, இந்தியா.

உற்பத்தியாளர்கள்: பாரிஜாத் இண்டஸ்டிரீஸ் (இந்தியா) பிரைவேட் லிமிடெட், கிராமம் கேரா கானி, படேகர் கிராமம் அருகில், ராய்பூர் ராணி ரோடு, ஜில்லா - அம்பாலா, ஹரியானா, 134201, இந்தியா.

అమాడిస్®

పైరిప్రాక్సిఫెన్ 10% ఇసి
(కీటకనాశని)

హెచ్చరిక:
లేబుల్ మరియు లీఫ్‌లెట్స్‌పై పేర్కొన్న పంటలు తప్ప ఇతర పంటలపై వాడరాదు.
కోత తర్వాత వాడరాదు.

"చేపలకు ప్రమాదకరం/హానికరం. సరస్సులు, నదులు, చెరువులు లేదా వాగులను మలినపరచకండి."

పైరిప్రాక్సిఫెన్ అనేది అంతర్వాహికంగా పనిచేసే కీటకాల వృద్ధి నియంత్రకం (గ్రోత్ రెగ్యులేటర్). ఇది కీటకాల భ్రూణాల ఉత్పత్తిని అణచివేస్తుంది, మెటామార్ఫోసిస్‌ని మరియు పునరుత్పత్తిని నిరోధిస్తుంది. దీన్ని మిరప, వంగ, బెండ మరియు ప్రత్తి పంటల్లో రసంపీల్చు పురుగులను నియంత్రించేందుకు ఉపయోగించాలి.

సిఫారుసులు:

పంట (లు)	కీటకాల సాధారణ పేరు	ప్రతి హెక్టారుకు మోతాదు			చివరి స్ప్రే నుండి కోత సమయం మధ్య వేచి ఉండే కాలం (రోజులు)
		ఏ.ఎల్ (గ్రా)	సూత్రం (మి.లి)	నీటి మిశ్రమం (లీటర్లు)	
ప్రత్తి	తెల్లదోమ,	50	500	500	50
మిరప	తెల్లదోమ, పేనుబంక	50	500	300	7
వంగ	తెల్లదోమ, పచ్చదోమ	50	500	300	7
బెండ	తెల్లదోమ, పచ్చదోమ	50	500	300	7

ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశనం:

వినియోగించే పద్ధతి: దీన్ని ఆకులపై పిచికారిగా ఉపయోగించాలి. నిర్దిష్టమైన నేల పరిస్థితులు ప్రిస్క్రయిబ్ చేయబడలేదు. పూత పూచేటప్పుడు మరియు పంట కోయడానికి కొద్ది ముందుగా (పిహెచ్ఐని గమనించిన తరువాత) వినియోగించకూడదు. చీడపీడలను ప్రభావవంతంగా నియంత్రించేందుకు ఒకేవిధంగా కవరేజి ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. హాలో కోన్ నాజిల్ రకం బిగించివున్న సింపుల్ న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ని పిచికారి చేసేందుకు ఉపయోగించాలి.

పిచికారి ద్రావకం తయారుచేయుట: సిఫారసు చేసిన మోతాదును పిచికారి ట్యాంకులో కలియబెడుతూ సిఫారసు చేసిన నీటి పరిమాణంలో 1/4వ వంతుకు మిశ్రమం చేయండి. అదే పనిగా కలియబెడుతూ మిగతా నీటిని కలపండి. పిచికారి ద్రావకాన్ని పిచికారి చేయడానికి ముందు నీటిలో ఉత్పాదన బాగా మిశ్రమం అయ్యేలా చూడండి. పిచికారి చేసేటప్పుడు కలియబెడుతూ ఉండండి.

ఉపయోగించే సమయం: పొలంలో కీటకాలు కనిపించడం ప్రారంభమైన వెంటనే, కానీ అది ఎకనామిక్ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్‌కి చేరుకోవడానికి ముందు వినియోగించాలి. వాతావరణం నిర్మలంగా, ప్రశాంతంగా ఉండాలి, వర్షాలు కురవకుండా ఉండాలి మరియు పెనుగాలులు వీచకూడదు.

వినియోగించవలసిన సార్ల సంఖ్య: కీటకాల బెడదను బట్టి, 7-14 రోజుల విరామంలో 2-3 పిచికారిలు అవసరమవుతాయి. ఒక సీజనులో మూడు కంటే ఎక్కువ పిచికారిల అవసరం ఉండదు.

తిరిగి పంటలోనికి ప్రవేశించే వ్యవధి: పంటలో పిచికారి ఆరిపోయిన వెంటనే.

సురక్షణ సూచనలు :

మిశ్రమం మరియు పిచికారి చేసేటప్పుడు రక్షణాత్మక దుస్తులు ధరించాలి. వినియోగించిన తరువాత మలినపడిన బట్టలు ఉతకాలి మరియు శరీర భాగాలను కడగాలి. పీల్చకూడదు. వినియోగించేటప్పుడు ధూమపానం, మద్యపానం చేయకూడదు, తినకూడదు మరియు నమలకూడదు.

విషపు లక్షణాలు: తలనొప్పి, తలతిరగడం, నీరసం, వికారం, అన్నవాహిక లేదా గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ మార్గం చికాకు లేదా మంటపుట్టడం.

ప్రాథమిక చికిత్స చర్యలు

ఒకవేళ పీల్చితే రోగిని తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి. వెంటనే ఫిజీషియన్‌ని పిలిపించండి.

ఒకవేళ కళ్ళకు తగిలితే వెంటనే ఎక్కువ నీటిని కనీసం 15 నిమిషాల సేపు చల్లుకొని (సులభంగా సాధ్యపడితే కాంటాక్టు లెన్స్‌లు తీసేయాలి) డాక్టరు వద్దకు వెళ్ళాలి.

చర్మంపై పడితే ఎక్కువ సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. మళ్ళీ ఉపయోగించడానికి ముందు మలినపడిన బట్టలు ఉతకాలి. ఒకవేళ మింగితే, నోటిని కడిగి 1-2 గ్లాసుల నీటిని త్రాగించండి విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. వెంటనే ఫిజీషియన్‌ని పిలిపించాలి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీ లేదు. జాగ్రత్తగా చికిత్స చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయుట : 1. ప్యాకేజీ లేదా సర్‌ప్లస్ మెటీరియల్ మరియు వాషింగ్ చేసేటప్పుడు సురక్షితంగా చెయాలి వాతావరణం కాలుష్యం లేదా జల కాలుష్యం ఆవకుండా చూడాలి. 2. వాడిన ప్యాకేజీలని తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు. 3. ప్యాకేజీలు లేదా మిశ్రమం మరియు మెషీన్ల నుండి కడుగుతున్నపుడు లేదా డబ్బాలనుండి పారేసేటప్పుడు సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని చూడాలి, పరిశరాలకు దూరంగా పారేయాలి లేదా నీటి కాలుష్యం కాకుండా చూడాలి.

"ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం"

నిల్వ పరిస్థితులు: కీటకనాశినిలుగల ప్యాకేజీలను ఇతర వస్తువులను, ప్రత్యేకించి ఆహార వస్తువులను నిల్వ ఉంచే గదులకు లేదా పరిసరాలకు దూరంగా వేరే గదులలో లేదా పరిసరాలలో నిల్వ ఉంచాలి మరియు కీటకనాశిని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని అనుసరించి తాళం మరియు తాళం చెవులుగల వేరే అల్మారిలలో ఉంచాలి. పిల్లలకు అందకుండా దూరంగా ఉంచాలి

నిలవ ఉంచే గది చక్కగా నిర్మించబడి, గాలి , వెలుతురు చక్కగా వచ్చేలా చాలినంత చుట్టుకొలతలతో ఉండాలి. నిలవ ఉంచే ప్రదేశం చల్లగా మరియు పొడిగా ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

మిశ్రమం	కంటెంట్ (% బ/బ)
పైరిప్రాక్సిఫెన్ ఎ.ఐ	10.00%
ఎమల్సిఫైయర్‌లు:	8.00%
ఆల్కైల్ అరైల్ సల్ఫోనేట్ మరియు పాలి ఆక్సి ఎథిలీన్ ఇథర్ యొక్క అయానిక్ మరియు నాన్‌అయానిక్ క్యాల్షియం సాల్ట్ మిశ్రమం	
సాల్వెంట్ సి9:	కావలసినంత
మొత్తం	**100% బ/బ**
సాంద్రత:	0.92±0.02గ్రా/సిసి

హెచ్చరిక: లేబుల్/కరపత్రం మీద వున్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడరాదు.

మార్కెట్ చేయువారు : ఎఫ్ఎమ్‌సి ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, టిసిజి ఫైనాన్షియల్ సెంటర్, 2వ అంతస్తు, సి–53, బాంద్ర కుర్ల కాంప్లెక్స్, బాంద్ర (తూర్పు) బాంద్ర సబర్బన్, ముంబాయి – 400098, మహారాష్ట్ర, ఇండియా.

తయారు చేయువారు: పారిజాత్ ఇండస్ట్రీస్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఖేరా గానీ గ్రామం, ఫతేఘర్ గ్రామం దగ్గర, రాయపూర్ రాణి రోడ్, జిల్లా –అంబాల, హర్యానా– 134201, ఇండియా.

ಅಮಾಡಿಸ್®

ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೇನ್ 10% ಇಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ವಿವರಣಾ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

"ಮೀನಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ / ಹಾನಿಕಾರಕ- ಕೊಳಗಳನ್ನು, ನದಿಗಳನ್ನು, ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕಲ್ಮಶಗೊಳಿಸಬೇಡಿ."

ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೇನ್ ಒಂದು ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೀಟಗಳ ಭ್ರೂಣವಾಗುವದನ್ನು ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ರಸಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಕೀಟನಾಶಕ (ಮಿ.ಲಿ.)	ನೀರು (ಲೀ)	
ಹತ್ತಿ	ಬಿಳಿನೊಣ	50	500	500	50
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಬಿಳಿನೊಣಗಳು ಗಿಡಹೇನುಗಳು	50	500	300	07
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಬಿಳಿನೊಣ, ಹಸಿರು ಜಿಗಿ ಹುಳು	50	500	300	07
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಬಿಳಿನೊಣ, ಹಸಿರು ಜಿಗಿ ಹುಳು	50	500	300	07

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ:

ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ : ಇದನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲಾ, ಇದನ್ನು ಹೂವಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ತುಸು ಮೊದಲು (ಪಿಎಚ್‌ಐ ಪಾಲಿಸಿದ ನಂತರ) ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕೀಟಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪರಣೆಗಾಗಿ ಹೊಲೊ ಕೋನ್ ನಾಝಲ್ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಕೈ ಪಂಪಿನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು: ಶಿಫಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶಿಫಾರಿತ 1/4 ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕದಡಿಸುತ್ತಾ ಸಿಂಪರಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿರಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕದಡಿಸುತ್ತಾ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ. ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಕದಡಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ.

ಬಳಸುವ ಸಮಯ: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಆದರೆ ಕೀಟ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ರೇಖೆ(ಇಟಿಎಲ್) ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಬಳಸಿರಿ. ಹವಾಮಾನವು ತಿಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಮಳೆ ಇರಬಾರದು ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರಬಾರದು.

ಬಳಸುವಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೀಟದ ಬಾದೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ 7-14 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಾಂತರದಲ್ಲಿ 2-3 ಸಿಂಪರಣೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ಪುನರ್-ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿಂಪರಣೆಯು ಒಣಗಿದ ಕೂಡಲೇ.

ಸುರಕ್ಷತೆ: ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಬಳಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನನಾಳ ಅಥವಾ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಉರಿತ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ, 1-2 ಗ್ಲಾಸ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿರಿ. ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು:

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. ಕೂಡಲೆ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ.

ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಧಾರಾಳ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ (ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಲೆನ್ಸ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ) ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರರಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.

ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಧಾರಳ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಎಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿರಿ. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು. 3. ಬರಿದಾದ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

"ಬರಿದಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ."

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಇರಿಸಿರಿ.

ಶೇಖರಣಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಶೇಖರಣಾ ಜಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಶುಷ್ಕ ಹಾಗೂ ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಸಂಯೋಜನೆ	ಪ್ರಮಾಣ (% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು)
ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೇನ್ ಸ.ಘ.	10.00%
ಇಮಲ್ಸಿಫಯರ್ಸ್:	
ಅಯೊನಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಅಯೊನಿಕ್ ಕಾ-ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್	8.00%
ಅಲ್ಕಾಲ್ ಅರಿಲ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸಿ ಇಥಲೀನ್ ಇಥರ್‌ನ ಬ್ಲೆಂಡ್	
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿ IX:	ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು
ಒಟ್ಟು	100%
ಸಾಂದ್ರತೆ:	0.92±0.02 ಗ್ರಾಂ/ಸಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಮಾರಾಟಗಾರರು: ಎಫ್ ಎಮ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ ಲಿ., ಟಿಸಿಜಿ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ-53, ಬಾಂದ್ರಾಕುರ್ಲಾಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪೂ), ಬಾಂದ್ರಾಸಬರ್ಬನ್, ಮುಂಬಯಿ-400098, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಪಾರಿಜಾತಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ. ಲಿ., ಗ್ರಾಮಖೇರಾ ಗನಿ, ವಿಲೇಜ್ ಫತೇಘರ್ ಬಳಿ, ರಾಯಪುರ್ ರಾಣಿ ರೋಡ್, ಜಿಲ್ಲೆ-ಅಂಬಾಲಾ, ಹರಿಯಾಣಾ- 134201, ಭಾರತ

അമാടിസ്®

പിരിഫ്രോക്സിഫെൻ 10% ഇസി
(കീടനാശിനി)

മുന്നറിയിപ്പ്:
ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിളകളിലും കീടങ്ങളിലും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ഉപയോഗിക്കരുത്
വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്

' മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അപകടം/ ഹാനി വരുത്തുന്നതാണ്. അരുവി, നദി, കുളങ്ങൾ , തടാകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കലർത്തരുത്'

പിരിഫ്രോക്സിഫെൻ അന്തർവ്യാപന ശേഷിയുള്ള ഒരു കീട വളർച്ചാ നിയന്ത്രകം ആണ്. ഇത് കീടങ്ങളെ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അടിച്ചമർത്തുകയും അവയുടെ രൂപാന്തരീകരണവും തുടർന്നുള്ള പ്രത്യുൽപാദനവും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരുത്തി കൃഷിയിലെയും മുളക്, വഴുതന, വെണ്ട, കൃഷിയിലെയും നീരൂറ്റുന്ന കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇതുപയോഗിക്കുന്നു

ശുപാർശചെയ്യുന്ന ഉപയോഗരീതി:

വിള	രോഗങ്ങളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്	ഡോസേജ്/ഹെക്ടർ		ലഘൂകരണം (ലിറ്റർ)	അവസാനം തളിച്ചതിനും വിളവെടുപ്പിനും ഇടയിൽ വേണ്ട കാത്തിരിപ്പു സമയം (ദിവസം)
		എ.ഐ. (ഗ്രാം)	മിശ്രിതം (മി.ലി.)		
പരുത്തി:	വെള്ള ഈച്ച	50	500	500	50
മുളക്:	വെള്ള ഈച്ച, മുഞ്ഞ	50	500	300	7
വഴുതന	വെള്ളീച്ച, ജാസ്സിഡ്സ്	50	500	300	7
വെണ്ട	വെള്ളീച്ച, ജാസ്സിഡ്സ്	50	500	300	7

ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള നിർദ്ദേശം: തുള്ളി സ്പ്രേ ആയി പ്രയോഗിക്കണം. മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേക സ്ഥിതി ഒന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ല. പൂവിടുന്ന സമയത്തും വിളവെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുമ്പും ഉപയോഗിക്കരുത് (പി എച്ച് ഐ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം) . കീടങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വിളകളിൽ ഒരേപോലെ തളിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഹോളോ കോൺ നോസിൽ പിടിപ്പിച്ച ലളിതമായ ഒരു നാപ്സാക്ക് സ്പ്രെയർ ഉപയോഗിച്ച് തളിക്കുക.

തളിക്കുന്നതിനുള്ള ലായനി തയ്യാറാക്കൽ: ആവശ്യത്തിന് അളവിൽ കീടനാശിനി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപർശ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കാൽ ഭാഗത്തിൽ സ്പ്രേ ടാങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കലർത്തുക. . ഇതിലേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അളവ് വെള്ളം തുടർച്ചയായി ഇളക്കികൊണ്ട് ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കുക. തളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉൽപന്നം നന്നായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നു എന്നുറപ്പാക്കുക. തളിക്കുന്നതിനിടക്കും കുലുക്കികൊണ്ടിരിക്കുക

പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയം : കീടത്തെ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ അവ സാമ്പത്തികമായ നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് (ഇടിഎൽ) പ്രയോഗം നടത്തണം. കാലാവസ്ഥ ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കണം, മഴയോ കനത്ത കാറ്റോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.

പ്രയോഗിക്കേണ്ട തവണകൾ: കീടബാധയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 7-14 ദിവസ ഇടവേളകളൽൽ 2-3 തളികൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. ഒരു സീസണിൽ 3 തളിയിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല.

പുനഃ പ്രവേശന കാലയളവ്: വിളയിൽ സ്പ്രേ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ

സുരക്ഷ: കലക്കുമ്പോഴും തളിക്കുമ്പോഴും സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. പ്രയോഗം കഴിഞ്ഞ് മലിനമായ വസ്ത്രവും ശരീര ഭാഗങ്ങളും കഴുകുക. ശ്വസിക്കൽ ഒഴിവാക്കുക. പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പുകവലിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ : തലവേദന, തലചുറ്റൽ, തളർച്ച, ഓക്കാനം, ക്ഷോഭം, ശ്വാസനാളി അല്ലെങ്കിൽ അന്ന നാളിയിൽ പുകച്ചിൽ.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷാ നടപടികൾ : ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗിയെ ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് മാറ്റുക. ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക.

കണ്ണിൽ ആയാൽ, 15 മിനിറ്റോളം ധാരാളം വെള്ളത്തിൽ കണ്ണ് കഴുകുക (കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പം നീക്കാമെങ്കിൽ നീക്കുക) . ഉടനെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക.

ചർമ്മത്തിൽ ആയാൽ, ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ചർമ്മ ഭാഗം നന്നായി കഴുകുക. മലിനമായ വസ്ത്രം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കഴുകുക.

വിഴുങ്ങിപോകുകയാണെങ്കിൽ, വായ കഴുകുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടുക.

മറുമരുന്ന്: പ്രത്യേക മറുമരുന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കണ്ടെയിനറിന്റെ നശിപ്പിയ്ക്കൽ: 1. പായ്ക്കേജോ അധികം വന്ന മരുന്നോ അവ കഴുകി കളയുവാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളമൊ, പരിസ്ഥിതിയും ജലവും മലിനമാകാത്ത തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നശിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 2. ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയിനർ അല്ലെങ്കിൽ പായ്ക്കേജ് അവ വീണ്ടും ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത് തടയുവാനായി തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിയ്ക്കരുത്. 3. കാലിയായ കണ്ടെയിനർ പൊട്ടിച്ച് ജനവാസ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ദൂരെ മാറ്റി കുഴിച്ചിടേണ്ടതാണ്.

"ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്"

സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കേണ്ട രീതി: കീടനാശിനി അടങ്ങിയ പായ്ക്കേജ് , അവയുടെ അളവും സ്വഭാവവുമനുസരിച്ച്, ഒരു പ്രത്യേക മുറിയിലൊ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്നൊ സമീപപ്രദേശത്ത് നിന്നോ മാറ്റി ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലുമൊ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുറപ്പുള്ള പ്രത്യേക അലമാരിയിലൊ സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് എത്താത്തിടത്ത് സൂക്ഷിക്കുക

സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന മുറി ഉറപ്പുള്ളതും കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കുന്നതും ആവശ്യത്തിനു വലിപ്പം ഉള്ളതും ആയിരിക്കണം. മുറി തണുപ്പുള്ളതും വരണ്ടതും ആയിരിക്കണം.

രാസ ഘടന

ഘടന	ഉള്ളടക്കം % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
പിരിഫ്രോക്സിഫെൻ എ ഐ	10.00%
എമൽസിഫയേഴ്സ്:	
ആൽകൈൽ ആരിൽ സൾഫണേറ്റിന്റെഅയോണിക്, നോൺ അയോണിക് കാൽസ്യം ലവണവും പോളി ഓക്സി എതിലീൻ ഈതറും	8.00%
സോൾവന്റ് CIX:	ക്യൂ.എസ്
മൊത്തം	**100 % ഡബ്ലിയൂ/ഡബ്ലിയൂ**
സാന്ദ്രത	0.92±0.02ഗ്രാ/ഡഡ

സൂചന: ഈ ലേബലിൽ/ലഘുലേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റു വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്.

വിപണനം: എഫ്എംസി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ടിസിജി ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ, 2-ൻഡ് ഫ്ലോർ , സി-53, ബാന്ദ്ര കുർല കോംപ്ലക്സ്, ബാന്ദ്ര (ഈസ്റ്റ്) , ബാന്ദ്ര സബർബൻ, മുംബൈ - 400098 , മഹാരാഷ്ട്ര , ഇന്ത്യ

നിർമ്മാതാക്കൾ: പാരിജാത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, വില്ലേജ് ഖേര ഗാനി, നിയർ വില്ലേജ് ഫത്തേഗർ, റായ്പൂർ റാണി റോഡ്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അംബാല, ഹരിയാന, 134201, ഇന്ത്യ.

অমাডিস®

পাইরিপ্রক্সিফেন ১০% ইসি
(কীটনাশক)

সতর্কতা :

এই লেবেল এবং লিফলেটের বর্ণনা ছাড়া অন্য কোন শস্য এবং কীটের জন্যে ব্যবহার করা উচিৎ হবে না।
ফসল ফলনের পরবর্তী ব্যবহারের করা উচিৎ নয়।

"মাছেদের জন্য ক্ষতিকারক বিপজ্জনক, হ্রদে, পুকুরে, নদীতে বা জল প্রবাহে মেশাবেন না।"

পাইরিপ্রক্সিফেন হল একটি প্রক্রিয়াগত পোকা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক যেটি পোকার ভ্রূণপ্রজনন দমন করে এবং পোকার রূপান্তরে বাধাপ্রদান করে এবং পোকার বংশবৃদ্ধি নাশ করে। এটি শোষক জাতীয় পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য তুলা, বেগুন, ঢ্যাড়শ, এবং লঙ্কা গাছে ব্যবহার করা হয়।

অনুমোদন :

শস্য	কীটের সাধারণ নাম	প্রতি এইচ এ			গত স্প্রে থেকে বপন করার মধ্যে অপেক্ষা করার সময়কাল (দিন)
		এ.আই. (গ্রাম)	মিশ্রণ (মি.লি.)	দ্রবণ (লিটার)	
তুলা	সাদামাছি	৫০	৫০০	৫০০	৫০
লঙ্কা	সাদামাছি, এফিডস	৫০	৫০০	৩০০	৭
বেগুন	সাদা মাছি, জ্যাসিড	৫০	৫০০	৩০০	৭
ঢ্যাড়শ	সাদা মাছি, জ্যাসিড	৫০	৫০০	৩০০	৭

ব্যবহারবিধী:

প্রয়োগ পদ্ধতি: এটি অবশ্যই ফলিয়ার স্প্রে দ্বারা প্রয়োগ করতে হবে। মৃত্তিকার কোনো নির্দিষ্ট শর্ত নির্ধারিত নেই। গাছে ফুল আসলে এবং ফসল তোলার আগে প্রয়োগ করবেন না (পিএইচআই পরীক্ষার পর)। কীটপতঙ্গের দমনের জন্য ক্ষেতের এলাকা অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। সাধারন ন্যাপস্যাক্ স্প্রেয়ারে ফাঁপা শঙ্কু জাতীয় নজল লাগিয়ে স্প্রে করবেন।

স্প্রে দ্রবন তৈরি করার পদ্ধতি: প্রস্তাবিত মাত্রা ১৪ অংশ এবং প্রস্তাবিত পরিমাণ জল নিয়ে স্প্রে ট্যাঙ্কে নাড়িয়ে নাড়িয়ে ভালোভাবে মেশান। অবশিষ্ট পরিমাণ জল একই ভাবে মিশ্রনটিতে মেশান।

ব্যবহারের সঠিক সময়: ক্ষেতে পোকার বংশবৃদ্ধির আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু ইকোনমিক থ্রেশোল্ড লেভেল (ইটিএল)–এ পৌছানোর আগে। আবহাওয়া অবশ্যাই পরিস্কার ও শান্ত হতে হবে, বৃষ্টি এবং জোরালো বাতাস যেন না থাকে।

প্রয়োগের সংখ্যা: কীটপতঙ্গের উপদ্রবের ওপর নির্ভর করে ২–৩ বার স্প্রে করার প্রয়োজন হয় ৭–১৪ দিন অন্তর। এক ঋতুতে তিনবারের বেশি কখনোই প্রয়োগ করবেন না।

পুনঃ প্রয়োগের সময়: ফসলে স্প্রে শুকিয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

নিরাপত্তা: মিশ্রনটি তৈরি করার এবং স্প্রে করার সময় অবশ্যই সংরক্ষণশীল পোশাক ব্যবহার করবেন। মিশ্রনটি করবার পর দূষিত পোশাক এবং শরীরের অনাবৃত অংশ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবেন। প্রয়োগ করার সময় শ্বাসজনিত অসুবিধার থেকে দূরে থাকার জন্য ধূমপান, পানীয় সেবন, খাদ্য সেবন এবং কোনো কিছু চর্বন করা থেকে বিরত থাকুন। **বিষক্রিয়ার লক্ষন:** মাথাযন্ত্রনা, মাথাঘোরা, দুর্বলতা অনুভব, বমি বমি ভাব, খাদ্যনালীতে বা পাকাশয়ে জ্বালা বা দহন অনুভব করা।

প্রাথমিক চিকিসা ব্যবস্থা:

যদি শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় তাহলে রোগীকে বিশুদ্ধ বাতাবরনে নিয়ে যান। অবিলম্বে চিকিসককে ডাকুন।

যদি চোখে চলে যায় অন্তত ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর পরিমাণে জল দিযে চোখ ধুয়ে ফেলুন (যদি সহজে সম্ভব হয় তাহলে কন্ট্যাক্ট লেন্স খুলে নিন)। তারপর চিকিসকের কাছে যান।

যদি ত্বকের সংস্পর্শে আসে তাহলে সাবান এবং জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। দূষিত পোশাক পুনর্ব্যবহারের আগে ধুয়ে নিন।

যদি মুখে চলে যায় বা গিলে ফেলেন, তাহলে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন এবং বিশ্রাম নিন। অবিলম্বে চিকিসক ডাকুন।

প্রতিষেধক : বিশেষ কোনো প্রতিষেধক জানা নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ব্যবহৃত পাত্রগুলির বিনষ্টিকরণ : ১. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি অথবা অতিরিক্ত অব্যবহৃত মিশ্রণটি যাতে দ্বিতীয়বার কেউ ব্যবহার না করতে পারে এমনভাবে নষ্ট করে ফেলুন যাতে পরিবেশ এবং জলের দূষণ না হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি অথবা অতিরিক্ত বস্তু এবং কীটনাশক ধোয়ার যন্ত্রপাতিগুলিকে নিরাপদভাবে বিনষ্ট করতে হবে এমনভাবে যাতে পুনরায় না ব্যবহার করা যায়। ৩. খালি পাত্রগুলি নষ্ট করে মাটির তলায় আবাস–স্থলের থেকে দূরে কোথাও পুঁতে ফেলুন।

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

সংগ্রহ করার শর্ত : কীটনাশকগুলির প্যাকেজ আলাদা ঘরে অথবা ঘর থেকে দূরে কোনো বাড়িতে অথবা বিশেষত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হয় এমন কোনো জায়গায় অথবা তালা চাবি দেওয়া আলাদা কোনো আলমারিতে রাখতে হবে, ওষধিনাশকটির পরিমাণ এবং গুণের উপর নির্ভর করে। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে

সংগ্রহ করার ঘরটি হতে হবে শক্তপোক্ত, দৃঢ় এবং যেন যথেষ্ট আলোবাতাস চলাচল করতে পারে এমন আয়তনযুক্ত। সংগ্রহ করার জায়গাটি হতে হবে শুকনো এবং ঠান্ডা।

রাসায়নিক গঠন:

রাসায়নিকের নাম	পরিমাণ % ওঃওঃ
পাইরি প্রক্সিফেন এ. আই	১০.০০%
এমুলসিফায়ারস্:	
আয়োনিক এবং নন–আয়োনিক সিএ–সল্ট –এর অ্যালকাইল আরাইল সালফোনেট এবং পলি অক্সি ইথিলিন ইথার –এর মিশ্রণ	৮.০০%
দ্রাবক সিআইএক্স:	কিউএস
মোট	১০০% ওঃওঃ
ঘনত্ব:	০.৯২±০.০২ গ্রা. সিসি

সাবধানতা : এই লেবেল/লিফ্লেটে নির্দিষ্ট ফসল ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

বিক্রেতা : এফএমসি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, টীসীজী ফাইনেন্সিয়েল সেংটর, ২ম তল, সী-৫৩, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পু.), বান্দ্রা সবর্বন, মুম্বই - ৪০০০৯৮, মহারাষ্ট্রা, ভারত।

প্রস্তুতকারক : পারিজাত ইন্ডাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) প্রা. লি., গ্রাম খেরা গানি, ফতেগড় গ্রামের কাছে, রাইপুর রানি রোড, জেলা.-আমবালা, হরিয়াণা, ১৩৪২০১, ইন্ডিয়া।