

SAFARI®

**Erbicida di post-emergenza selettivo per la
barbabetola da zucchero e da foraggio.
Granuli idrodispersibili**

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Triflusaluron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi (P280). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi animali (P401). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).

Titolare della Registrazione

FMC Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
- Tel. 03519904468

Officina di Produzione

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
FMC France SAS - 23 rue de la Scierie, F-68700 Uffholtz, Francia

Officina di Rietichettatura

Althaller Italia s.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San
Colombano al Lambro MI

Arco Logistica S.r.l., Via Antonio Battistella, 22 - Ferrara (FE)

Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 100-120-200-250

PARTITA N:



ATTENZIONE

abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.

Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche tecniche: SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione. SAFARI deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

EFFICACIA ERBICIDA

Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Galium aparine* (Attaccamani), *Polygonum aviculare* (Corregiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis alba* (Senape bianca), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus arvensis* (Grespino), *Sonchus asper* (Grespino spinoso), *Veronica hederifolia* (Veronica a foglie d'edera).

Le malerbe manifestano una maggiore sensibilità negli stadi iniziali di sviluppo (2-3 foglie vere).

DOSE D'IMPIEGO: 30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato ad un coadiuvante non ionico (es. Trend 90), oppure olio di colza (es. Codacide), oppure olio bianco alle rispettive dosi autorizzate in etichetta, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie.

La dose maggiore è consigliata quando il prodotto è impiegato da solo per il controllo di *Polygonum aviculare*, *Solanum nigrum ed Abutilon theophrasti*.

SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 7 - 14 gg tra di loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), può rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura. Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune infestanti non sensibili al prodotto è opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.

EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza della coltura e delle infestanti.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: SAFARI, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il serbatoio ed aggiungere il coadiuvante. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.

È importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.

Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:

- 1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
- 2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
- 3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
- 4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
- 5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.

SAFARI è poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabetola da zucchero.

Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.

In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con SAFARI, è possibile la risemina della sola barbabetola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare SAFARI con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto che si verificano nel tempo.

COMPATIBILITA': SAFARI è fisicamente compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabetola da zucchero. Si sconsigliano miscele con formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O
CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

© Safari è un marchio registrato FMC Corporation o di sue società affiliate

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

SAFARI®	
Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio. Granuli idrodispersibili	
Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)	
COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: Triflusaluron metile p.a. puro 50 g Coformulanti q. b. a 100	
INDICAZIONI DI PERICOLO Sospettato di provocare il cancro (H351). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).	
CONSIGLI DI PRUDENZA Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270). Indossare guanti/indumenti protettivi (P280). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+313). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi animali (P401). Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).	ATTENZIONE
Titolare della Registrazione FMC Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 03519904468	
Officina di Produzione Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia FMC France SAS - 23 rue de la Scierie, F-68700 Uffholtz, Francia	
Officina di Rietichettatura: Althaller Italia s.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San Colombano al Lambro MI Arco Logistica S.r.l., Via Antonio Battistella, 22 – Ferrara (FE)	
Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità	
Contenuto netto: g 100-120-200-250	PARTITA N.:

**PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo
per la barbabietola da zucchero e da foraggio.
Granuli idrodispersibili in sacchetti idrosolubili

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Triflurosulfuron metile p.a. puro 50 g
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Sospettato di provocare il cancro (H351).
Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata (H410). Per
evitare rischi per la salute umana e per
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
(EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini
(P102). Non mangiare, né bere, né fumare
durante l'uso (P270). Indossare
guanti/indumenti protettivi (P280). IN
CASO di esposizione o di possibile
esposizione, consultare un medico
(P308+313). Raccogliere il materiale
fuoriuscito (P391). Conservare lontano da
alimenti, bevande e mangimi animali
(P401). Smaltire il contenuto/recipiente in
conformità con le normative vigenti (P501).

Titolare della Registrazione

FMC Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
- Tel. 03519904468

Officina di Produzione

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia
FMC France SAS - 23 rue de la Scierie, F-68700 Uffholtz, Francia

Officina di Rietichettatura:

Althaller Italia s.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San --
Colombano al Lambro MI

Arco Logistica S.r.l., Via Antonio Battistella, 22 - Ferrara (FE)

Registrazione n. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della Sanità

Contenuto netto: g 30 (contiene 1 sacchetto da g 30), g 40

(contiene 1 sacchetto da g 40), g 120 (contiene 4 sacchetti da g 30),

g 300 (contiene 10 sacchetti da g 30)

PARTITA N:



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di

contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.

Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche tecniche: SAFARI, erbicida ad assorbimento fogliare, blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi (ingiallimenti, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 15 giorni dalla applicazione. SAFARI deve essere applicato su infestanti giovani (entro le 2-4 foglie vere) ed in attiva crescita e, poiché non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

EFFICACIA ERBICIDA

Infestanti sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Galium aparine* (Attaccamani), *Polygonum aviculare* (Corregiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis alba* (Senape bianca), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus arvensis* (Grespino), *Sonchus asper* (Grespino spinoso), *Veronica hederifolia* (Veronica a foglie d'edera).

Le malerbe manifestano una maggiore sensibilità negli stadi iniziali di sviluppo (2-3 foglie vere).

DOSE D'IMPIEGO: 30 - 40 g/ha in 150-300 litri d'acqua addizionato ad un coadiuvante non ionico (es. Trend 90), oppure olio di colza (es. Codacide), oppure olio bianco alle rispettive dosi autorizzate in etichetta, su coltura allo stadio compreso tra i cotiledoni e le 6 foglie.

La dose maggiore è consigliata quando il prodotto è impiegato da solo per il controllo di *Polygonum aviculare*, *Solanum nigrum* ed *Abutilon theophrasti*.

SAFARI va utilizzato con due interventi distanziati di 7 - 14 gg tra di loro. Su terreni torbosi ed in presenza di infestanti ad emergenza ritardata o scalare (es. *Abutilon theophrasti*), può rendersi necessaria una terza applicazione, comunque effettuata entro lo stadio di 6 foglie della coltura. Per completare lo spettro d'azione di SAFARI su alcune infestanti non sensibili al prodotto è opportuna la miscela con uno o più formulati contenenti sostanze ad attività erbicida complementare.

EPOCA D'IMPIEGO: Post emergenza della coltura e delle infestanti.

AVVERTENZE D'USO

Nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all'introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione chiudere bene la scatola. Dopo l'uso lavare accuratamente il serbatoio, la pompa e gli ugelli dell'attrezzatura utilizzata.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: SAFARI, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito circa a 1/4, mantenendo in movimento l'agitatore. Portare al volume desiderato il

serbatoio ed aggiungere il coadiuvante. Eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate. La sospensione deve essere preparata poco prima dell'applicazione in campo.

E' importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare SAFARI. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.

Subito dopo il trattamento con SAFARI è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:

- 1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
- 2) Riempire il serbatoio con acqua pulita addizionata di una soluzione detergente (0.5 lt di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 lt di acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
- 3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
- 4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
- 5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Si sconsigliano le miscele di SAFARI con formulati contenenti Ethofumesate e Clopiralid. Non effettuare i trattamenti in presenza di brina o gelo o a temperature superiori a 23 C. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacco di parassiti, asfissia radicale o per effetto di precedenti interventi antiparassitari.

SAFARI è poco persistente nel suolo; la sua utilizzazione non comporta alcuna restrizione per le colture che rientrano nel normale avvicendamento della barbabietola da zucchero.

Si sconsiglia l'impianto di colture floricole, ornamentali ed arbustive nei 12 mesi successivi al trattamento effettuato con SAFARI.

In caso di distruzione accidentale o volontaria della coltura precedentemente trattata con SAFARI, è possibile la risemina della sola barbabietola da zucchero; tale raccomandazione non tiene conto degli eventuali altri erbicidi impiegati sulla medesima coltura.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di miscelare o alternare SAFARI con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione le variazioni di sensibilità delle malerbe al prodotto che si verificano nel tempo.

COMPATIBILITA': SAFARI è fisicamente compatibile con i più comuni antiparassitari impiegati sulla barbabietola da zucchero. Si sconsigliano miscele con formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura - ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del

ETICHETTA CONFEZIONI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI/FOGLIO ILLUSTRATIVO

trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali ed all'ambiente.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO


IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE

ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

© Safari è un marchio registrato FMC Corporation o di sue società affiliate

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE



1

Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua

2

Assicurarsi di avere le mani asciutte

3

Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo

4

Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte

5

Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)

6

Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: il rispetto delle indicazioni soprariportate fa' sì che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

SAFARI®

Erbicida di post-emergenza selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio.

Granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili

Meccanismo d'azione gruppo B (HRAC)

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Triflusaluron metil p.a. puro 50g

coformulanti q. b. a 100

Titolare della Registrazione

FMC Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124

Bergamo - Tel. 03519904468

Officina di Produzione

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, Francia

FMC France SAS - 23 rue de la Scierie, F-68700 Uffholtz,

Francia

Officina di Rietichettatura

Althaller Italia s.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 --

San Colombano al Lambro MI

Arco Logistica S.r.l., Via Antonio Battistella, 22 - Ferrara (FE)

Registrazione N. 8886 del 19.06.1996 del Ministero della

Sanità

Contenuto netto del sacchetto: 30 - 40 g

AVVERTENZA: Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI

DA SCIogliere IN ACQUA SENZA ROMPERE

NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE



ATTENZIONE