WEEDAGRO 600 D

(EMULSIONE CONCENTRATA)
Erbicida a base di 2,4D per il diserbo selettivo
di frumento, orzo, segale e avena
Meccanismo d'azione HRAC: O

WEEDAGRO 600 D - Reg. Ministero della Salute n. 15186 del 11/02/2013

FMC AGRO ITALIA S.r.l.
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

COMPOSIZIONE

2,4 D Acido puro (da etilesilestere)	g	55 (=600 g/l)
Coformulanti q. b. a	g.	100

Contenuto: 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 litri **Partita N.**

Stabilimenti di produzione:
SPACHEM S.L.
Poligono industrial Guadassequies – Guadassequies (Valencia) Spagna
Laboratorios SIRGA S.A.
C. Jaime I, 7 - Pol. Ind. Mediterraneo – E46560 Masalfasar (Valencia) Spagna
ALTHALLER Italia Srl
Str. Com.le per Campagna, 5 - 20078 S. Colombano al Lambro (MI)
Stabilimento di rietichettatura:
Arco Logistica S.r.l.
Via Antonio Battistella, 22 - Ferrara (FE)

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il contenuto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi del suolo non applicare su suoli in cui si prevedano condizioni anaerobiche. Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da zona non coltivata. Per proteggere le piante acquatiche rispettare una fascia di sicurezza non trattata e vegetata di:
- 20 m da corpi idrici superficiali nei cereali invernali;
- 10 m da corpi idrici superficiali nei cereali primaverili.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ DI IMPIEGO
WEEDAGRO 600 D è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza. Controlla le più comuni infestanti a foglia larga di frumento, orzo, segale e avena quali Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis),* Ranuncolo *(Ranunculus arvensis),* Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum),* Farinello *(Chenopodium album)*, Grespino *(Sonchus spp.)*, Stoppione *(Cirsium arvense),* Erba storna *(Thalaspi arvense),* Papavero *(Papaver roheasa*), Poligoni *(Poligonum spp.)*.
Mediamente sensibili all'azione di WEEDAGRO 600 D risultano invece alcune malerbe quali Fumaria *(Fumaria officinalis),* Soffione *(Taraxacum officinalis) e* Ortica *(Urtica dioica).*

DOSI DI IMPIEGO
WEEDAGRO 600 D si impiega alla dose di 0,6-1,0 litro/ha, in funzione della tipologia di infestanti da controllare e del loro stadio di accrescimento. Impiegare volumi di acqua sufficienti a garantire una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione (200-300 litri per ha).

EPOCA DI APPLICAZIONE
L'epoca di intervento va dalla fine dell'accestimento alla levata. Eseguire il trattamento con temperature comprese fra 8 e 25°C.

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può danneggiare, anche sotto forma di vapori portati dal vento, colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, e le colture ornamentali e floreali.
Non applicare il prodotto a meno di 20 metri da colture sensibili.

Consentito un solo trattamento da effettuarsi almeno 60 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 9 dicembre 2021 con validità dal 01/01/2022