



Venzar® 500 SC

Neu: Zulassung in Rote, Gelbe und Weiße Bete


HERBIZID

- Mit Lenacil zweifach stark gegen Unkräuter
- Idealer Misch- und Bodenpartner zum vervollständigen des Wirkspektrums, auch gegen Problemunkräuter
- Einsatz im Freiland und Gewächshaus
- Bewährt bei Zierpflanzen in Topf- und Container gegen Moose (u. a. Lebermoos)

Wirkstoff	500 g/l Lenacil
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SC)
Wirkstoffgruppe	Uracile: WSSA: 5
Wirkmechanismus	Hemmung des Photosystem II
Wirkstoffaufnahme/-verteilung	Vorwiegend über die Wurzeln; systemisch
Kulturen	Beten (BBCH 10–31), Baumschulgehölzpflanzen, Zierpflanzen (siehe Tabellenteil)
Indikationen	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter und Moose
Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge	Während der Vegetationsperiode: Zierpflanzen als Topf- und Containerpflanzen in FX und UG; Baumschulgehölz in FX: 1 l/ha oder 2 x 0,5 l/ha als Splittinganwendung in 150–600 l/ha Wasser; Beten (Rote, Gelbe, Weiße): 1 l/ha in 150–600 l/ha Wasser oder als Splittinganwendung im Abstand von 5–8 Tage: 2 x 0,5 l/ha; 3 x 0,33 l/ha; 4 x 0,25 l/ha in jeweils 150–600 l/ha Wasser
Bienen/Nützlinge	B4 / NN2001, NN2002
Wartezeit	N
Gebindegröße	1 l, 5 l
Zulassung	Bis 31.12.2024

So wirkt Lenacil:

- Primärwirkung**
Lenacil hemmt das Photosystem II. Das führt bei Unkräutern zu Blattaufhellung und Nekrose.
- Sekundärwirkung**
Lenacil bewirkt bei Unkräutern zusätzlich das Öffnen der Spaltöffnungen und verhindert das Schließen. Es kommt zu unkontrollierter Verdunstung und Wasserverlust.



GUT ZU WISSEN

Die Splitting-Anwendung ermöglicht Anwendung auf drainierten Flächen.