

# Verimark®

## INSEKTIZID



- Formulierung für die Aufnahme über die Wurzel optimiert
- Schützt die Wurzel, Blätter und den Neuzuwachs über die systemische Verteilung in der Pflanze



- Gezielte Wirkstoffausbringung in Wurzelnähe durch Gießverfahren an den Jungpflanzen



- Sehr gute Wirkungsdauer (bis zu 3 Wochen)
- Effektive Bekämpfung der an den Wurzeln sitzenden Larven

|                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wirkstoff</b>                              | 200 g/l Cyazypyr® (Cyantraniliprol)                                                                                                                                                                              |
| <b>Formulierung</b>                           | Suspensionskonzentrat (SC)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wirkstoffgruppe</b>                        | Diamide (Anthranildiamide), IRAC: 28                                                                                                                                                                             |
| <b>Wirkungsweise</b>                          | Kontakt- und Fraßwirkung                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze</b> | Systemisch                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kulturen</b>                               | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl), Blumenkohle (Blumenkohle, Brokkoli)                                                                                                                     |
| <b>Indikationen</b>                           | Kopfkohle, Blumenkohle: Kleine Kohlfliege                                                                                                                                                                        |
| <b>Anwendungsbereich</b>                      | Freiland                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Aufwandmenge/ Anwendungstechnik</b>        | Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl, Blumenkohl, Brokkoli: 15 ml/1.000 Pflanzen in max. 30 l Wasser pro 1.000 Pflanzen/gießen; max. 600 ml/ha (entspricht max. 40.000 Pflanzen pro ha), max. 1 Anwendung |
| <b>Bienen/Nützlinge</b>                       | B3 / NN3001, NN1002                                                                                                                                                                                              |
| <b>Wartezeit</b>                              | Kopfkohle, Blumenkohle: XF (nicht erforderlich)                                                                                                                                                                  |
| <b>Gebindegröße</b>                           | 1 l                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zulassung</b>                              | Bis 14.09.2027                                                                                                                                                                                                   |



## Verimark® – Wirkungsspektrum

| Wirkung gegen                |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Kleine Kohlflye              | Weißer Fliegen*               |
| Thripse (Larven und Adulte)* | Blattläuse (bestimmte Arten)* |
| Lepidoptera (Raupe)*         | Erdbeerblütenstecher*         |
| Minierer*                    |                               |

\* Keine Zulassung

In 2022 war Verimark® über eine Notfallgenehmigung nach Art. 53 in Fruchtgemüse unter Glas zugelassen.



Larve der Kleinen Kohlflye



Thripse fliegen in Gewächshäuser ein und schädigen dort Gurken, Paprika und Auberginen