



Aktuan^{®2}

FUNGIZID

- -
- -
- -

Wirkstoff	100g/kg Cymoxanil + 250g/kg Dithianon
Formulierung	Wasserlösliches Spritzpulver (WP)
Wirkstoffgruppe	Azetamide, FRAC 27 und Anthraquinone, FRAC M09
Wirkungsweise	Cymoxanil wirkt an verschiedenen Wirkorten des Stoffwechsels der Pilze; Dithianon hemmt die Sporenkeimung und verhindert die Bildung des Keimschlauchs
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Lokalsystemisch (Bildung von Wirkstoffdepots an der Pflanzenoberfläche) und Kontaktwirkung
Kulturen	Weinbau (Keltertrauben), Hopfenbau
Indikationen	Peronospora, Phomopsis, Roter Brenner
Aufwandmenge	Max. 8 Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr im Abstand von mindest. 14 Tagen; Basisaufwand: 0,5 kg/ha in maximal 400 l/ha Wasser, BBCH 61: 1 kg/ha in maximal 800 l/ha Wasser, BBCH 71: 1,5 kg/ha in maximal 1.200 l/ha Wasser, BBCH 75: 2 kg/ha in maximal 1.600 l/ha Wasser
Bienen/Nützlinge	B4 / NN3842, NN134
Wartezeit	35 Tage
Gebindegröße	5 kg
Zulassung	Bis 31.08.2024

Das bringt Ihnen Aktuan^{®2}

Wirkung gegen	
Peronospora	+++
Phomopsis	++
Roter Brenner	++

Wirkung: hervorragend: ++++
 sehr gut: +++
 gut: ++



Peronospora – Lederbeeren



Peronospora – Blattbefall