

Фокстрот® Экстра

Гербицид


Эффективность по просовидным и овсюгу на уровне 100%
Отрастание не наблюдалось.



Эффект от препарата Фокстрот® Экстра по просовидным сорнякам



на 10й-12й день после обработки, 0.45 л/га



на 24й день после обработки, 0.45 л/га

FMC

FMC

Новые возможности
старых традиций

За консультацией обращайтесь к региональным представителям FMC.

По вопросам приобретения – к официальным дистрибьюторам.

Контакты на сайте **https://ag.fmc.com/kz**

ТОО «ЭфЭмСи Агро Казахстан»
Адрес: 050040, Казахстан, Алматы, ул. Тимирязева, 28в, 5 этаж, 501 кабинет.
Тел. +7 727 356 04 27

FMC An Agricultural Sciences Company

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЗАЩИТА



Фокстрот® Экстра

Гербицид

Высокоселективный комбинированный гербицид для контроля однолетних злаковых сорняков в посевах пшеницы





Фокстрот® Экстра
Гербицид

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРБИЦИДА

- Идеальный контроль овсюга, просянок, щетинников и других однолетних злаковых сорняков
- Высокая селективность к обрабатываемой культуре
- Широкий диапазон сроков применения, независимо от фазы культуры

Действующее вещество	Феноксапроп-П-этил 90г/л + Клодинафоп-пропаргил 45 г/л + Клоквинтосет-мексил 34 г/л
Химический класс	Производные феноксипропионовых кислот
Препаративная форма	Концентрат эмульсии
Упаковка	5л
Срок годности	3 года

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Вредный объект	Норма применения препарата	Способ применения и время обработки
Пшеница, яровая и озимая	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника, метлица)	0,33 л/га - 0,45 л/га	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-3 листьев до конца кущения сорных злаков (независимоот фазы развития культуры) Норма расхода рабочего раствора 200 л/га

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМИНЕНИЮ

Факстрот® Экстра применяется независимо от фазы развития культуры.





Фокстрот® Экстра
Гербицид


ОСОБЕННОСТИ

- После опрыскивания пшеницы уже через сутки в значительной степени устраняет конкуренцию сорных растений
- Полная гибель сорных злаков происходит в течение 15-20 суток после опрыскивания в зависимости от погодных условий, вида и физиологического состояния растений
- На появившиеся после опрыскивания сорняки препарат не действует (2-я волна)
- Обработку следует начинать при появлении массовых всходов злаковых сорняков на ранних этапах их развития
- Обработка на стадии 2-3 листа у злаковых сорняков, вне зависимости от стадии развития культуры, обеспечивает максимальную эффективность гербицида
- Антидот, входящий в состав препарата, преобразует действующие вещества в нейтральные метаболиты, которые не оказывают отрицательного влияния на культуру
- Отличная совместимость в баковых смесях

ДЕЙСТВИЕ НА СОРНЯКИ

1 Сорбируется листовой поверхностью и стеблями сорняков

2 Перемещается в точки роста по флоэме и ксилеме



3 Накапливается в точках роста (меристематические ткани)

4 Контролирует сорняки, ингибируя синтез жирных кислот в мембранах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальный инструмент для контроля смешанных популяций злаковых сорняков в посевах пшеницы
- Высокая эффективность против широкого спектра однолетних злаковых сорняков, в том числе овсюга
- Высокоселективен к обрабатываемой культуре
- Широкое технологическое окно по срокам применения
- Отличная дождеустойчивость
- Отсутствие ограничений для применения в севообороте
- Совместимость в баковых смесях с противодвудольными гербицидами
- Современная и практичная препаративная форма




Фокстрот® Экстра
Гербицид


БЕЗУПРЕЧНАЯ СИНЕРГИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

СИЛЬНЕЙШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ


Феноксапроп-П-этил



Клодинафоп-пропаргил



Феноксапроп-П-этил **Клодинафоп-пропаргил**



Более эффективен **Более эффективен**