



An Agricultural
Sciences Company

Seamac® OR

Biostimuliatorius



Seamac® OR yra biostimuliatorius, pagrįstas pasauliniu lygiu patentuotos "*Sulphated Galacto Oligosaccharides*" veikliosios medžiagos. Produktas gaunamas iš raudonųjų *Solieriaceae* šeimos jūržolių *Kappaphycus alvarezii*.

UŽTIKRINTA KOKYBĖ KIEKVIENOJE PAKUOTĖJE

Biostimuliatorius **Seamac® OR** turi subalansuotą formuliaciją, kuri pagerina augalų vystymąsi normaliomis ir abiotinio streso sąlygomis. Tai unikalus natūralių aktyvių oligosacharidų ir biologiškai prieinamų maistinių medžiagų (makro ir mikro) mišinys. **Seamac® OR** biostimuliatorius skatina fiziologinį augalų atsaką, o tai gerina maistinių medžiagų įsisavinimą, padeda pagerinti pasėlių kokybinius parametrus, padidina abiotinio streso toleranciją ir tai lemia didesnę derlių. Raudonieji jūros dumbliai auginami ant vandens Indijos vandenyne. Pažangi technologija leidžia griežtai kontroliuoti žaliavos kokybę. Jūros dumbliai apdorojami nedelsiant patentuotu ekstrahavimo metodu nenaudojant jokių kenksmingų cheminių medžiagų, kad būtų išsaugotos visos naudingos maistinės medžiagos.



Naudojimo
norma 1 l/ha



Ne mažiau kaip
200 l/ha vandens



Galima naudoti
ekologiniuose ūkiuose



Gerina pasėlių augimą ir vystymąsi



Skatina šoninių šaknų formavimąsi, o tai prisideda prie didesnės ir plačiau išplitusios šaknų sistemos



Stiprina augalų apsaugą nuo abiotinio streso



Didina derlių ir gerina kokybę



Sumažina fungicidinio streso poveikį



Padidina augalų maistinių medžiagų pasisavinimą ir aprūpina augalus sudėtyje esančiu kاليu



Išgaunamas iš šviežių, auginamų raudonųjų dumblių, todėl visada išlaiko pastovų, aukščiausią kokybės lygį

ATRASKITE BIOLOGINIŲ PRODUKTŲ GALIĄ!





APSAUGA nuo abiotinio streso

AUGALAI	APDOROJIMŲ SKAIČIUS	NAUDOJIMO LAIKAS
Javai, rapsai, ankštiniai augalai, kukurūzai	2-4	Prasidėjus augalų vegetacijai iki žydėjimo pabaigos.
Bulvės	2-4	1 naudojimas: pradėjus formuotis gumbams. Kartoti 2 kartus 10 – 14 d. intervalais.
Daržovės ir dekoratyviniai augalai (sėjami)	2-4	Daigų formavimosi pradžioje ir iki žydėjimo pradžios.
Daržovės ir dekoratyviniai augalai (sodinami)	2-4	2 naudojimas: prieš sodinimą. Kartoti 1 – 3 kartus 10 – 14 d. intervalais.
Vaisiai ir uogos	4-6	1 naudojimas: pumpurų dygimo pradžioje. 2 naudojimas: prieš žydėjimą. 3 ir 4 naudojimas: po žydėjimo 30 d. intervalais.

BIOLOGICALS
by
FMC

PRODUKTŲ
KATALOGAS:

