

MOLYBDENUM 250

Un engrais foliaire hautement concentré en Molybdène

TENEURS GARANTIES (g/l) :

Molybdenum (Mo): 250

Fabriqué par :

FMC

RECOMMANDATIONS D'USAGES:

Cultures	Doses	Stade d'application	Intervalles
Cucurbitacées	0.25 – 0.5 l/ha	A la fin de la croissance végétative avant la floraison	Répéter si nécessaire après la nouaison.
Arbres fruitiers	0.25 – 0.5 l/ha	Avant la floraison	Répéter si nécessaire après la nouaison .
Fraise, myrtille, framboise	0.25 – 0.5 l/ha	Avant la floraison	Une ou deux applications supplémentaires peuvent être nécessaires à 14 jours d'intervalle . Répéter si nécessaire après la nouaison.
Cultures maraichères	0.25 – 0.5 l/ha	A la fin de la croissance végétative avant la floraison	Une ou deux applications supplémentaires peuvent être nécessaires à 14 jours d'intervalle . Répéter si nécessaire après la nouaison.
Vigne	0.25 – 0.5 l/ha	Avant la floraison	Répéter si nécessaire après la nouaison.
Haricots, pois et soja	0.25 l/ha	Lorsque les plantes ont une hauteur de 5 à 15 cm. En cas de carence modérée à sévère	Répéter à des intervalles de 10 à 14 jours à partir de la première application.
Brocolis, choux, choux fleur	0.25 l/ha	De stade 4 à 6 feuilles. En cas de carence modérée à sévère	Répéter à des intervalles de 10 à 14 jours.
Oignons	0.25 l/ha	Dès que la couverture foliaire est suffisante pour intercepter la pulvérisation.	Répéter deux semaines plus tard si nécessaire. En cas de carence modérée à sévère, répéter à intervalles de 10 à 14 jours
Pomme de terre	0.5 l/ha	Entre l'émergence à 100 % et l'initiation des tubercules	

Autres cultures : le produit peut être appliqué à d'autres cultures. Veuillez contacter votre distributeur.

Avis :

Ne pas appliquer MOLYBDENUM 250 dans moins de 200 litres d'eau par hectare .

Ne pas traiter les cultures souffrant de dégâts de pulvérisation, de gel, de fort ensoleillement, de températures élevées ou de sécheresse.

Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque MOLYBDENUM 250 est appliqué tôt le matin ou le soir.

MELANGE ET APPLICATION :

Bien agiter le récipient avant de l'ouvrir et de l'utiliser.

Le matériel de pulvérisation doit être propre.

Remplir à moitié la cuve du pulvérisateur avec de l'eau, commencer à agiter et ajouter la quantité requise de MOLYBDENUM 250. Rincer soigneusement le récipient, ajouter les rinçures à la cuve du pulvérisateur, achever le remplissage et appliquer sans délai. Maintenir l'agitation pendant toute la durée du traitement.

Nettoyer soigneusement le pulvérisateur après utilisation.

COMPATIBILITÉ :

MOLYBDENUM 250 est physiquement et chimiquement compatible avec une large gamme de produits agrochimiques. Consultez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus récentes. Toujours lire attentivement l'étiquette du produit partenaire avant de le mélanger avec MOLYBDENUM 250

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS:

Stocker dans les emballages originaux dans un endroit frais et sec au-dessus de 5°C. Ne pas stocker sous la lumière directe du soleil. Protéger du gel.

Maintenir hors de la portée des enfants. Stocker loin des boissons, des aliments et du fourrage.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :

H315 : Provoque une irritation de la peau.

H319 : Provoque une grave irritation des yeux.

Avertissement

P264 : Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P337+313 : Si l'irritation des yeux persiste : Consulter un médecin.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage.

P302+352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+351+338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer.

P332+313 : En cas d'irritation de la peau : Consulter un médecin.