

فيتيجريس™ بورون سماد سائل يحتوي على البورون (B) في صورة إيثانولامين

الصيغة: مركز قابل للذوبان (سائل)

التركيب المضمونة (وزن/حجم) :
بورون (B): 15%

توصيات للاستخدام

المحاصيل	مرحلة التطبيق	مقدار الاستعمال	طريقة المعالجة
الزراعات الكبرى (الشمندر السكري)	بعد المرحلة المكونة من 3 أوراق أو عندما تكون أوراق كافية لاستيغاب الرش. تطبيق خلال فترات الإجهاد الغذائي.	تتراوح الجرعة بين 1 و1.5 لتر / هكتار في حجم لا يقبل عن 200 لتر. للتكرار بعد 3 أسابيع	الرش الورقي أو عبر الجزور
الأشجار المثمرة	تطبيق قبل الإزهار، وبعد العقد وبعد نهاية القطاف.	تتراوح الجرعة بين 125 و200 مل / هل حسب مستوى النقص. احترم مدة 21 يوماً بين التطبيقات	
الخضروات	تطبيق قبل الإزهار. كرر إذا لزم الأمر.		
الفواكه الحمراء	بمجرد ظهور نقص. كرر إذا لزم الأمر.		

إمكانية الخلط:

فيتيجريس™ بورون متوافق فيزيائياً وكيميائياً مع مجموعة واسعة من الكيماويات الزراعية. استشر مع الموزع المعتمد للحصول على آخر المعلومات حول إمكانية الخلط. يجب قراءة ملصق المواد الأخرى قبل مزجها مع بورون. ال تتجاوز النسب الموصى بها.

تحضير محلول الرش:

يتم رج العبوة جيداً قبل الفتح والاستخدام. يجب أن تكون معدات الرش نظيفة. ثم يملأ نصف خزان الرش بالماء النظيف مع بدء تحريك. تضاف كمية فيتيجريس™ بورون حسب التوصيات مع استمرار التحريك. يملأ باقي الخزان بالماء ويتم الرش فوراً. نظف خزان الرش جيداً بعد الاستخدام. للحصول على أفضل النتائج، يتم الرش في الليل أو في الصباح الباكر حيث تكون الرطوبة مرتفعة نسبياً. لا يتم الرش في درجات الحرارة القصوى) حر شديد أو برد قارص (أو عندما يكون ضوء الشمس قوي، أو عندما يكون النبات تحت تأثير العطش أو أي ظرف إجهاد آخر.

التخزين والاحتياطات:

يتم تخزين في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو أي مصدر حرارة. يخزن في حرارة تفوق 5 درجات مئوية مع تجنب درجات التجمد.

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال، عن الأكل والشرب وعلف الحيوانات.
يتم التخلص من العبوات الفارغة بطريقة سليمة لا تضر بالبيئة.
لا يتم استخدام العبوات الفارغة لأي غرض كان.