

VYTEGRIS™ BORON

Engrais liquide contenant du Bore (B) comme éthanolamine

FORMULATION : concentré soluble (liquide)

TENEURS GARANTIES (p/v):

Bore (B) : 15%

Recommandations d'usages:

Cultures	Stade d'application	Dose	Mode de traitement
Cultures de plein champ (betterave sucrière)	Après le stade 3 feuilles ou lorsque le feuillage est suffisant pour absorber la pulvérisation. À appliquer pendant les périodes de stress nutritionnel.	La dose générale varie entre 1 et 1.5 L/ha dans un volume d'eau minimal de 200 L . à répéter après 3 semaines	Application foliaire ou racinaire
Arbres fruitiers	Appliquer avant la floraison, après la nouaison et après la récolte.	La dose générale varie entre 125 et 200 ml/hl en fonction du niveau de carence.	
cultures maraichères	Appliquer avant la floraison. Répéter si nécessaire	Respecter un délai de 21 jours entre les applications	
Fruits rouges	Dès l'apparition d'une carence. Répéter si nécessaire		

COMPATIBILITÉ :

VYTEGRIS™ BORON est physiquement et chimiquement compatible avec une large gamme de produits agrochimiques. Consultez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus récentes. Toujours lire attentivement l'étiquette du produit partenaire avant de le mélanger avec VYTEGRIS™ BORON. Ne pas dépasser la dose prescrite.

MELANGE ET APPLICATION:

Bien agiter le récipient avant de l'ouvrir et de l'utiliser.

Le matériel de pulvérisation doit être propre.

Remplir à moitié la cuve du pulvérisateur avec de l'eau, commencer à agiter et ajouter la quantité requise de **VYTEGRIS™ BORON**. Rincer soigneusement le récipient, ajouter les rinçures à la cuve du pulvérisateur, achever le remplissage et appliquer sans délai. Maintenir l'agitation pendant toute la durée du traitement.

Nettoyer soigneusement le pulvérisateur après utilisation.

Avis Pour de meilleurs résultats, pulvériser tôt le matin ou le soir lorsque l'humidité est élevée. Ne pas appliquer à des températures extrêmes, en pleine lumière ou lorsque la plante est soumise à un stress quelconque.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS:

Stocker dans les emballages originaux dans un endroit frais et sec au-dessus de 5°C. Ne pas stocker sous la lumière directe du soleil. Protéger du gel.

Maintenir hors de la portée des enfants. Stocker loin des boissons, des aliments et du fourrage. Se débarrasser des conteneurs vides d'une façon appropriée. Ne pas réutiliser les conteneurs vides.