

VYTEGRIS™ BO-MO

Formulation de micronutriments à base de bore et de molybdène solubles dans l'eau

Type de formulation : Concentré liquide soluble (SL).

TENEURS GARANTIES (p/v):

Bore (B) : 15%
Molybdène (Mo) : 0.98%

Fabriqué par : FMC

Recommandations d'usages:

Cultures	Période d'application	Dose
Arbres fruitiers et Olivier	Au début floraison, fin floraison et début nouaison.	De 100 ml/hl à 200ml/hl dans un volume d'eau minimal de 1000 L par hectare.
cultures maraichères	Au début floraison, et répéter l'application si nécessaire en cas de réapparition des carences	De 150 ml/hl à 200ml/hl.
Fruits rouges	Au début floraison, et répéter l'application si nécessaire en cas de réapparition des carences	De 150 ml/hl à 200ml/hl dans un volume d'eau minimal de 1000 L par hectare.
Betterave sucrière	Au stade 4 à 8 feuilles, répéter l'application après deux semaines	1L /ha

PÉRIODE D'APPLICATION:

VYTEGRIS™ BO-MO peut être appliqué aux cultures chaque fois qu'une carence en bore est observée ou attendue, mais après le stade 3 feuilles, ou lorsque le feuillage présent est suffisant pour absorber la pulvérisation.

Il est recommandé d'utiliser les résultats des analyses du sol et des tissus dans la mesure du possible pour guider les applications de micro et macronutriments afin d'optimiser l'état des éléments nutritifs des cultures.

Avis Ne pas appliquer ce produit en plein soleil ou à des températures supérieures à 25°C.

Si possible, vaporisez le soir ou tôt le matin pour de meilleurs résultats.

MELANGE ET APPLICATION :

Bien agiter le récipient avant de l'ouvrir et de l'utiliser.

Le matériel de pulvérisation doit être propre.

Remplir à moitié la cuve du pulvérisateur avec de l'eau, commencer à agiter et ajouter la quantité requise de **VYTEGRIS™ BO-MO**. Rincer soigneusement le récipient, ajouter les rinçures à la cuve du pulvérisateur, achever le remplissage et appliquer sans délai. Maintenir l'agitation pendant toute la durée du traitement.

Nettoyer soigneusement le pulvérisateur après utilisation.

Avis Pour de meilleurs résultats, pulvériser tôt le matin ou le soir lorsque l'humidité est élevée. Ne pas appliquer à des températures extrêmes, en pleine lumière ou lorsque la plante est soumise à un stress quelconque.

COMPATIBILITÉ :

VYTEGRIS™ BO-MO est physiquement et chimiquement compatible avec une large gamme de produits agrochimiques. Consultez votre fournisseur pour obtenir les informations les plus récentes. Toujours lire attentivement l'étiquette du produit partenaire avant de le mélanger avec **VYTEGRIS™ BO-MO**.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS:

Stocker dans les emballages originaux dans un endroit frais et sec au-dessus de 5°C. Ne pas stocker sous la lumière directe du soleil. Protéger du gel.

Maintenir hors de la portée des enfants. Stocker loin des boissons, des aliments et du fourrage.

Se débarrasser des conteneurs vides d'une façon appropriée.

Ne pas réutiliser les conteneurs vides.