

FICHA TÉCNICA

FMC



SmarTrack®

BIOESTIMULANTE

Regulador de crecimiento tipo 1. Enraizador. Sólido.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

	% EN PESO
Nitrógeno Total (N)	11.00 %
Fósforo Aprovechable(P ₂ O ₅)	55.00 %
Ácidos Naftalenacético (ANA)	0.28 %
Ácido Indolbutírico (AIB)	0.02 %
Ácidos Fúlvicos	2.00 %
Acondicionadores e Inertes	31.70 %
TOTAL	100.00 %

Registro Sanitario: RSCO-0007/II/97

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Titular del registro:

Farmacia Agroquímica de México, S.A. de C.V.

Blvd. Jaime Benavides Pompa N° 645 Col. Del Valle

Ramos Arizpe, Coahuila, México, C.P. 25904

Tels. (844) 488 2400

www.fagro.com.mx e-mail: fagro@fagro.com.mx

Distribuido por:

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,

Col. Cd. Granja, Zapopan, Jal C.P 45010

Tel. 01(33) 3003 4500 Fax.01 (33) 3003 4501

contactomexico@fmc.com

PRECAUCIÓN

25/01/2024

FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

SMARTRACK® es un producto especialmente diseñado para inducir y estimular el crecimiento de raíces y el engrosamiento de tallos. Su formulación se basa en una mezcla balanceada de hormonas “enraizadoras”, macronutrientes y ácidos fúlvicos que actúan para lograr un resultado más rápido y eficaz. Las auxinas (ANA y AIB) son principales hormonas exógenas que ejercen el control primario en la formación de raíces y actúan conjuntamente con cofactores del enraizamiento como fósforo y ácidos fúlvicos para promover el desarrollo de un mayor número de raíces de excelente vigor, incrementar el “prendimiento” de plántulas en almácigos o en campo y restablecer en corto tiempo el sistema radicular en cultivos de trasplante.

SMARTRACK® puede ser aplicado en diversos cultivos como: tomate, chile, fresa, tabaco, café, lechuga, pepino, coles, brócoli, papa, cucurbitáceas, árboles frutales y plantas ornamentales.

SMARTRACK® se aplica por aspersión disuelto en la cantidad de agua que se indica en la recomendación.

CULTIVO	DOSIS Kg/Ha	EPOCA DE APLICACIÓN
Tierra o sustrato para charolas	Disuelva 125 a 250 g en el volumen de agua suficiente para humedecer 100 Kg de sustrato	Use la dosis baja en temperaturas menores a 20°C y la dosis alta en temperaturas mayores a 20°C.
Almácigos y charolas	100 g / cada 200L de agua	Una vez por semana, iniciando las aplicaciones en la tercera semana del desarrollo de las plántulas.
APLICACIONES EN CAMPO		
Trasplante	100 g / cada 100 L de agua	Aplicar al momento del trasplante o una semana después aplicar 400 g / cada 100L de agua, dirigiendo la aplicación a la base de la planta
Foliares	0.5 gr a 1 Kg/Ha	Aplicar en la segunda y tercera semana después del trasplante.
Riego de goteo	2 Kg/Ha	Diluir el producto en el agua de riego. Aplicar en la segunda, tercera y cuarta semana después del trasplante.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección adecuado. Abra la bolsa por la parte superior. Agregue al tanque de mezcla la cantidad de agua que se indica en la recomendación, en base a la aplicación a realizar. Mida con algún utensilio graduado específico para este uso la cantidad de producto indicada en la recomendación y agregue al tanque de mezcla, agite hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Aplique el producto. Prepare la premezcla en un lugar ventilado. Para aplicación en riego por goteo, diluir el producto en agua previamente. Se recomienda que calibre su equipo de aplicación a fin de obtener un volumen de agua que permita cubrir de manera uniforme el cultivo. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. No destape la boquilla con la boca.

FICHA TÉCNICA

INCOMPATIBILIDAD

Solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados, pero se sugiere realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. Se sugiere evitar la mezcla con productos a base de Calcio no quelatados.

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México, S. de R.L de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **SMARTRACK®** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

FICHA TÉCNICA

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo y preparación del producto: Camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón. Mascarilla contra polvos. lentes protectores de plástico transparente. guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión; ábralos con cautela. Después de manejar o aplicar el producto báñese. Cámbiese de ropa y lave esta, antes de volver a usarla. Lave el equipo de aplicación en el mismo campo tratado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA. BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.
- “EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO. LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”.

PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales. Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Inhalación: Si se ha inhalado el polvo retirar a la persona del área contaminada. Si es necesario. dar respiración artificial o proporcionar oxígeno. Buscar atención médica. Contacto con los ojos: lávese con abundante agua durante 15 minutos por lo menos y si persisten las molestias consulte al médico. Ingestión: Si el producto se ha ingerido y la persona esta consiente, enjuagar la boca con agua. No provocar el vómito. Buscar atención médica. Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Eliminar lavando con jabón y abundante agua.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACIOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RIOS. LAGOS. LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.
- “PARTICULARMENTE EN SUELOS ARENOSOS O TERRENOS CERCANOS A RIOS, LAGOS O LAGUNAS O CON MANTOS DE AGUASOMEROS, APLIQUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE NITRÓGENO DE SU CULTIVO Y DIVIDA EN VARIAS APLICACIONES PARAS U MÁXIMO APROVECHAMIENTO”.
- “NO APLIQUE ESTE PRODUCTO ANTES DE UNA LLUVIA”.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacene el producto en su envase original etiquetado, en un lugar fresco y seco, con temperaturas menores a 40°. Manténgase en su envase original cerrado, lejos del fuego. No estibe más de 10 cajas. Transpórtese en vehículos autorizados.