

FICHA TÉCNICA

USO AGRÍCOLA

FMC



60 XP
HERBICIDA

metsulfuron metil

Herbicida / Gránulos Dispersables

Composición Porcentual

% en Peso

Ingrediente Activo:

metsulfuron metil: Metil 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato
(Equivalente a 600 g/kg)

60.00

Ingredientes Inertes:

Humectantes, dispersantes y compuestos relacionados.

40.00

TOTAL

100.00

Registro Sanitario: RSCO-HEDE-0276-001-034-060

Puede ser nocivo si se ingiere
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Titular del registro, importador y distribuidor:

FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco
Tel: 800 FMC AGRO (362 2476)
contactomexico@fmc.com

PRECAUCIÓN

18/12/24

FICHA TÉCNICA

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS, PASTIZALES Y CONTRA LAS ESPECIES DE MALEZAS AQUÍ RECOMENDADAS
INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

El herbicida agrícola marca **ALLY 60 XP** es un producto sistémico del grupo de las sulfonilureas, formulado en gránulos dispersables en agua, selectivo a los cultivos y pastizales establecidos en potreros indicados en las recomendaciones de uso, que se aplica en post-emergencia para el control de maleza de hoja ancha. **ALLY 60 XP** es absorbido a través del follaje de maleza de hoja ancha, inhibiendo rápidamente el crecimiento de la maleza susceptible. Las hojas de las plantas se tornan cloróticas entre 1 a 3 semanas después de la aplicación, seguido por la muerte del punto de crecimiento.

Cultivo	Dosis*	Maleza		Época de Aplicación
		Nombre Común	Nombre Científico	
Caña de azúcar	10-15 g/ha	Correhuela Girasol Gloria de la mañana Hierba de pollo	<i>Convolvulus arvensis</i> <i>Helianthus annuus</i> <i>Ipomoea</i> spp. <i>Commelina diffusa</i>	Cuando la maleza tenga de 5 a 10 cm de altura (durante la etapa de crecimiento activo), a partir de que el cultivo tenga 2 hojas y hasta antes de la etapa del embuche, ya que después podrá ocasionar fitotoxicidad a los cultivos mencionados.
Cebada	6-8 g/ha	Lengua de vaca Nabo o mostacilla Quelite Quelite cenizo	<i>Rumex crispus</i> <i>Brassica</i> spp. <i>Amaranthus</i> spp. <i>Chenopodium</i> spp.	
Trigo	6-8 g/ha	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	
Pastizales establecidos en potreros	10 – 20 g/100 L de agua	Acahual	<i>Baltimora recta</i>	En postemergencia a la maleza en crecimiento vegetativo, con follaje verde intenso. Evite aplicaciones en estado inicial de rebrote (color verde claro). Evite aplicar cuando el pastizal se encuentre inundado. A mayor tamaño y densidad de maleza, mayor volumen de la mezcla. En infestaciones severas de maleza de diferentes tamaños, es necesario realizar un chapeo general y esperar un rebrote uniforme para efectuar la aplicación. En condiciones de pastizales de mayor altura que la maleza, es conveniente realizar un pastoreo previo a la aplicación. No existen restricciones para el pastoreo de ganado en campos tratados.
	6 – 12 g/100 L de agua	Cornezuelo	<i>Acacia cornigera</i>	
	6 – 12 g/100 L de agua	Correhuela	<i>Ipomoea</i> sp.	
	10 – 20 g/100 L de agua	Escobilla	<i>Sida acuta</i>	
	10 – 20 g/100 L de agua	Hediondilla	<i>Senna obtusifolia</i>	
	6 – 12 g/100 L de agua	Huizache	<i>Acacia</i> spp.	
	6 – 12 g/100 L de agua	Zarza	<i>Mimosa albida</i>	
*Dosis: Añada un surfactante no iónico a razón de 1-2.5 ml/1L de agua.		Rotación de cultivos posterior al uso de ALLY 60 XP		
		INTERVALO DE ROTACIÓN		
		(meses que deben transcurrir antes de sembrar el siguiente cultivo)		
		Algodón	10	
La dosis de ALLY 60 XP		Calabaza kabocha	10	

PRECAUCIÓN

FICHA TÉCNICA

dependerá del espectro de maleza y su tamaño al momento de la aplicación.	Chile	10
	Frijol	8
	Maíz	8
	Melón cantaloupe	9
	Papa	8
	Sorgo	8
	Trigo	3
El grado y duración del control pueden depender de los siguientes factores: espectro de maleza e intensidad de la infestación, tamaño de la maleza al momento de la aplicación, condiciones ambientales durante y después del tratamiento, lluvias y grado de cobertura de la aspersión.		
La actividad herbicida es favorecida por condiciones cálidas y húmedas después de la aplicación.		

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: No entre o permita que otras personas entren al área aplicada sin el equipo de protección adecuado por un período de 4 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **ALLY 60 XP**, siempre utilice el equipo de protección personal que se indica en la sección de **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**.

Siga cuidadosamente las instrucciones de lavado del equipo de aspersión antes y después de usar el producto. Los residuos de este producto en la aspersora pueden causar daños a otros cultivos.

Pre-lavado del equipo de aplicación: Asegúrese de que el equipo de aplicación esté limpio y libre de residuos de otros plaguicidas antes de usar **ALLY 60 XP**.

1. Enjuague bien el tanque de la aspersora, las mangueras y puntas pulverizadoras con agua limpia.
2. Llene parcialmente el tanque con agua limpia y agregue un litro de amonía de uso casero por cada 100 litros de agua de capacidad del tanque. Llene el tanque totalmente con agua. Haga circular esta solución por las mangueras y puntas pulverizadoras por un mínimo de 15 minutos.
3. Enjuague bien el tanque de la aspersora, el aguilón, puntas pulverizadoras y mangueras con agua limpia.

Mezcla: Llene el tanque de la aspersora a la mitad con agua limpia. Haga una premezcla de **ALLY 60 XP** de la siguiente manera: Para abrir el producto, rompa el sobre o bolsa en la parte superior. En un lugar ventilado y usando un recipiente de 10 a 20 litros de capacidad, llene de agua, agregue la dosis autorizada de **ALLY 60 XP** en el recipiente para preparar una premezcla, agite hasta que las bolsas hidrosolubles se hayan disuelto totalmente, vacíe la solución de la premezcla en el tanque de mezclado o en de aplicación según sea el caso. El agua para utilizar en la aplicación debe estar libre de sedimentos y materia orgánica. Agregue esta premezcla al tanque y agite la solución con un agitador mecánico (nunca directamente con las manos). Termine de llenar el depósito con agua sin dejar de agitar la suspensión. Al final agregue un surfactante no iónico a la mezcla. Aplique en las siguientes 24 horas para evitar la degradación del producto.

Lavado del equipo de aplicación: Después de hacer aspersiones de **ALLY 60 XP** y antes de hacer otras aplicaciones con el mismo equipo se recomienda:

1. Vacíe el tanque y enjuáguelo con agua limpia a presión junto con las mangueras y puntas pulverizadoras por un mínimo de 5 minutos.

FICHA TÉCNICA

2. Llene parcialmente el tanque con agua limpia y, agregue un litro de amoníaco de uso casero por cada 100 litros de agua de capacidad del tanque. Llene el tanque totalmente con agua. Haga circular esta solución por las mangueras y puntas pulverizadoras, por un mínimo de 15 minutos.
3. Lave las puntas pulverizadoras y filtros por separado en una solución igual a la usada para lavar el tanque. Después deberá enjuagarlas profusamente con agua limpia.
4. Repita los pasos 1 al 3.
5. Vacíe el tanque y enjuáguelo perfectamente con agua limpia por un mínimo de 5 minutos, eliminando el agua a través de las mangueras y puntas pulverizadoras.
6. Elimine la solución de limpieza en forma apropiada y en áreas libres de todo cultivo.

NOTA: Durante temporadas en que el equipo de aplicación se use para varias jornadas de aplicación del producto, al final de cada jornada se recomienda enjuagar el tanque con agua limpia, después llenarlo parcialmente y hacer circular el agua por el aguilón, las mangueras y puntas pulverizadoras.

CONTRAINDICACIONES

- No utilice **ALLY 60 XP** en suelos de zonas de temporal que sean alcalinos o calcáreos (con un pH > 7.9).
- No aplique **ALLY 60 XP** a través de ningún tipo de sistema de riego.
- No aplique más de un tratamiento de **ALLY 60 XP** por cultivo, por año.
- No aplique cerca de árboles deseados ya que pueden ser dañados con la aplicación o acarreo del producto.
- No aplique **ALLY 60 XP** si el cultivo o pastizal se encuentra bajo condiciones adversas por sequía, inundación, baja fertilidad del suelo, plagas o enfermedades.
- No aplique **ALLY 60 XP** cuando el cultivo o pastizal haya sido tratado con insecticidas organofosforados sistémicos que se aplican al suelo. Sin embargo; si se aplican insecticidas organofosforados al follaje, estos deberán aplicarse después del herbicida de **ALLY 60 XP** ya que éste es metabolizado por el cultivo en las primeras 48 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

ALLY 60 XP no es fitotóxico a los cultivos a las dosis aquí recomendadas, siempre y cuando se sigan las instrucciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

El herbicida agrícola marca **ALLY 60 XP** es compatible con insecticidas piretroides o carbámicos que se aplican al follaje y con insecticidas aplicados al suelo como carbofuran y carbofuran. No se recomienda este producto en mezclas de tanque.

MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Consideraciones en el Manejo Integrado de Maleza y Biotipos Resistentes:

El herbicida agrícola marca **ALLY 60 XP** pertenece a las sulfonilureas dentro del grupo B de acuerdo a HRAC (Herbicide Resistance Action Committee), los cuales inhiben la síntesis de la enzima acetil lactato sintetasa. El uso repetido y exclusivo de **ALLY 60 XP** o algún otro herbicida del grupo B puede llevar al desarrollo de poblaciones resistentes de malezas en este y otros cultivos.

Este producto debe ser utilizado como parte de un Programa de Manejo Integrado de Maleza, el cual puede incluir prácticas culturales, el uso de medidas de control biológico enfocado a prevenir daños económicos. La aplicación de este producto deberá hacerse en base a los principios y prácticas de un Control Integrado de Maleza incluyendo métodos de detección, identificación apropiada de las especies de maleza involucradas, monitoreos de la dinámica poblacional de la maleza y la aplicación de productos en base a umbrales económicos de cada región.

FICHA TÉCNICA

Manejo de Biotipos Resistentes: Cuando los herbicidas con el mismo modo de acción son usados repetidamente por varios años para controlar las mismas especies de maleza en el mismo campo, de forma natural se presentan biotipos de maleza resistentes que pueden sobrevivir a un tratamiento de herbicidas aplicado correctamente, pueden propagarse y empezar a ser dominantes en el campo. Estos biotipos resistentes de maleza pueden no ser controlados adecuadamente. Las prácticas culturales como la labranza previenen los escapes de maleza provenientes de semilla. El uso de herbicidas con diferente modo de acción dentro y entre las temporadas de cultivo puede ayudar a retrasar la proliferación y la posible dominancia de biotipos de maleza resistentes a herbicidas.



PRECAUCIÓN

18/12/24

FICHA TÉCNICA

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de **ALLY 60 XP**:

- Siempre utilice equipo de protección personal adecuado durante la preparación de la mezcla, llenado de los equipos, aplicación y lavado de los equipos: overol o camisa de manga larga y pantalón largo, guantes de nitrilo o butilo, mascarilla con filtros, careta o lentes de seguridad, gorra impermeable y botas de goma. Después de utilizar su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lávelos tan pronto como sea posible con agua limpia y jabón, de manera separada a la ropa de uso común, seque al sol y guárdelos en el lugar de trabajo en un área fresca y bajo llave.
- El polvo puede formar mezclas explosivas con el aire.
- Mantenga el producto alejado de calor o fuentes de ignición.
- Deje ventilar el vehículo donde transporta el producto durante 20 minutos previo a la descarga.
- No reutilice el envase del producto.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

ALMACENAJE DEL PRODUCTO

- Conserve siempre el producto en su envase original, bien cerrado y con la etiqueta, en locales seguros, secos, bien ventilados, al resguardo de la luz solar y evitando que se humedezca.
- No almacene el producto a temperaturas por debajo de cero grados.
- Almacene alejado de todo tipo de alimentos, semillas, forrajes y fertilizantes.
- No coma, beba o fume en los lugares de almacenamiento del producto.
- Mantenga el producto alejado de toda fuente de calor, llamas o chispas; de ser factible, almacene en sitios provistos de sistemas automáticos de extinción de incendios.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica inmediatamente, mientras realiza lo siguiente:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
 - **Si el producto fue ingerido:** No se indica intervención específica ya que el compuesto no se considera dañino por ingestión. Llame al Servicio de Información Toxicológica SINTOX o a un médico para el tratamiento.
 - **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire aire fresco.
 - **Si el producto tuvo contacto con la piel:** Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbielo de ropa y manténgalo en reposo y abrigado.

FICHA TÉCNICA

- **Si el producto cayó en los ojos:** Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica. En caso de utilizar lentes de contacto, enjuague los ojos por 5 minutos, después retire los lentes y continúe lavando por otros 10 minutos.
- **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua limpia y jabón.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

ALLY 60 XP es una formulación a base de metsulfuron metil, el cual pertenece al grupo químico de las sulfonilureas.

Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico, proporcione tratamiento sintomático y de soporte.

Síntomas de intoxicación: Los efectos tóxicos por sobreexposición pueden ser resultado de la ingestión o inhalación del producto, o su contacto con la piel u ojos. Dependiendo de la vía de exposición se pueden presentar los siguientes síntomas: **si se ingiere o inhala**, no se espera que cause algún síntoma específico, **al contacto con los ojos**, puede causar irritación de los ojos con lagrimeo, dolor o visión borrosa, **al contacto con la piel**, puede causar irritación a la piel con comezón, ardor, enrojecimiento, inflamación o salpullido.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 800 009 2800, (55) 5611 2634 y (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **ALLY 60 XP** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.



PRECAUCIÓN

18/12/24