


















## Selectiviteit natuurlijke vijanden voor Coragen®

Groep	Soort	Insecten stadium	Toepassing	IOBC class	
Sluipwespen	<i>Aphidius colemani</i>	Adult	Directe blootstelling	1	
Sluipwespen	<i>Aphidius colemani</i>	Larven	Directe blootstelling	1	
Roofmijten	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	Mix populatie	Directe blootstelling	1	
Roofmijten	<i>Hypoaspis aculeifer</i>	Adulten	Directe blootstelling	1	
Roofmijten	<i>Stratiolaelaps scimitus</i>	Adulten	Directe blootstelling	1	
Roofmijten	<i>Typhlodromus spp</i>	adulten	Directe blootstelling	1	
Predator	<i>Forficula auricularia</i>	Adult	Droog residu	1	
Predator	<i>Forficula auricularia</i>	Adult	Directe blootstelling	1	
Predator	<i>Coccinella septempunctata</i>	Adulten	Directe blootstelling	1	
Predator	<i>Coccinella septempunctata</i>	Larven	Directe blootstelling	1	
Predator	<i>Chrysoperla carnea</i>	Adult	Directe blootstelling	1	
Predator	<i>Chrysoperla carnea</i>	Larven	Directe blootstelling	1	
Predator	<i>Anthocoris nemoralis</i>	Mix populatie	Directe blootstelling	1	
Predator	<i>Orius laevigatus</i>	Adult	Directe blootstelling	1	
Predator	<i>Orius laevigatus</i>	Nymf	Directe blootstelling	1	
Predator	<i>Orius insidiosus</i>	Adult	Directe blootstelling	2	
Predator	<i>Orius insidiosus</i>	Nymf	Directe blootstelling	1	

### Beoordeling volgens IOBC-classificatie (Hassan 1985)

Klasse 1	Ongevaarlijk	< 25% reductie
Klasse 2	Enigszins schadelijk	25-50% reductie
Klasse 3	Matig schadelijk	51-75% reductie
Klasse 4	Schadelijk	>75% reductie