

2 september 2022

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids termijn in dagen
Aardbeien (bedekte substraatteelt)	druppelbehandeling	kevers <sup>1</sup> rupsen <sup>2</sup> bladluis <sup>3</sup>	0,375 L/ha	4	1,5 L/ha	7	1
Boon met peul (bedekte substraatteelt)	druppelbehandeling	rupsen <sup>2,4</sup> mineervlieg <sup>5,6</sup> bladluis <sup>7</sup> wittevlieg <sup>8,9</sup>	0,5 L/ha	2	1 L/ha	7	1
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte substraatteelt)	druppelbehandeling	rupsen <sup>2,4</sup> mineervlieg <sup>5,6</sup> bladluis <sup>7</sup> wittevlieg <sup>8,9</sup>	33 mL/1000 planten	4	3,3 L/ha	7	1
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet-eetbare schil (bedekte substraatteelt)	druppelbehandeling	rupsen <sup>2,4</sup> mineervlieg <sup>5,6</sup> bladluis <sup>7</sup> wittevlieg <sup>8,9</sup>	33 mL/1000 planten	4	3,3 L/ha	7	1
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i>	druppelbehandeling	rupsen <sup>2,4,10</sup> mineervlieg <sup>5,6</sup>	33 mL/1000 planten	4	3,3 L/ha	7	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
(bedekte substraatteelt)		bladluis <sup>7</sup> wittevlies <sup>8,9</sup>					
Sluitkoolachtigen (plantgoed, onbedekte teelt)	traybehandeling	koolvlieg <sup>11</sup>	15 ml per 1000 planten	1	0,6 L/ha	-	-
Bloemkoolachtigen (plantgoed, onbedekte teelt)	traybehandeling	koolvlieg <sup>11</sup>	15 ml per 1000 planten	1	0,6 L/ha	-	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Aardbeibloesemkever (*Anthonomus rubi*)

<sup>2</sup> Florida-mot (*Spodoptera exigua*)

<sup>3</sup> Groene perzikluis (*Myzus persicae*)

<sup>4</sup> Turkse mot (*Chrysodeixis chalcites*)

<sup>5</sup> Mineervlieg (*Liriomyza sativae*)

<sup>6</sup> Mineervlieg (*Liriomyza trifolii*)

<sup>7</sup> Katoenluis (*Aphis gossypii*)

<sup>8</sup> Tabakswittevlies (*Bemisia tabaci*)

<sup>9</sup> Kaswittevlies (*Trialeurodes vaporariorum*)

<sup>10</sup> Tomaatmineermot (*Tuta absoluta*)

<sup>11</sup> Koolvlieg (*Delia radicum* / *Delia brassicae*)

### Overige toepassingsvoorwaarden

Om residuen in voedings- of voedergrassen ten gevolge van ophoping van persistente bodemmetabolieten te voorkomen, is het gebruik van dit product, met uitzondering van gebruik op substraatteelt, beperkt tot 1 toepassing per jaar volgens het gebruiksvorschrift. Dit product, of andere producten die cyantraniliprole bevatten, mogen gedurende hetzelfde jaar niet nogmaals op hetzelfde perceel worden toegepast.

Bij traybehandeling in sluitkool- en bloemkoolachtigen uitsluitend toepassen door middel van automatische bespuiting.

De traybehandeling mag worden uitgevoerd zowel in een bedekte als onbedekte omgeving. Uitplanten van behandeld plantgoed na traybehandeling mag enkel naar een onbedekte omgeving.

Om het grondwater te beschermen is uitplanten van behandeld plantgoed van sluitkoolachtige en bloemkoolachtige gewassen niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.

Gevaarlijk voor bijen en hommels.

Onbedekte teelt (inclusief traybehandeling in onbedekte omgeving): alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Bedekte teelt (inclusief traybehandeling in bedekte omgeving): voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

#### Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof cyantraniliprole. Cyantraniliprole behoort tot de ryanodine receptor modulators. De IRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Het resistentierisico is hoog. Om resistentieontwikkeling te voorkomen, het middel afwisselen met middelen op basis van een andere actieve stof. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.