



# Centium 360 CS

## Herbicide

GROEP

13

HERBICIDE

Herbicide voor professioneel gebruik ter bestrijding van eenjarige breedbladige onkruiden

TOELATINGSNUMMER: 12148 N (W.8)

Capsule suspensie (CS) / Werkzame stof(fen): clomazone .....360 g/L

### Overige vermeldingen

In geval van nood gerelateerd aan dit product kunt u 24/7 contact opnemen met **BIG** (BrandweerInformatiecentrum voor Gevaarlijke stoffen), tel. **+32(0)14-584545**.  
In medische noodgevallen altijd eerst 112 bellen.

Bij algemene vragen kunt u contact met ons opnemen per email: [Orders.benelux@fmc.com](mailto:Orders.benelux@fmc.com),  
of tijdens kantooruren op tel. **+31(0)10-8081422**.

**Opslag:** Vorstvrij, in originele goed gesloten verpakking bewaren.

**Gebruiksaanwijzing:** zie etiket.

# 1L e



FMC Operational Netherlands B.V.  
Fascinatio Boulevard 216-220  
NL-3065 WB Rotterdam  
Tel.: +31(0)10-8081422



UFI: HH60-K349-1N4J-9HA5

### GEVARENAANDUIDINGEN

**H413** Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

### VOORZORGSMAATREGELEN

**P273** Voorkom lozing in het milieu.

**P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

**SP1** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### OVERIGE INSTRUCTIES

**EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**STORL**  
**VERPAKKING**  
Bedrijfsafval

DEZE VERPAKKING  
IS BEDRIJFSAFVAL  
MITS DEZE IS  
SCHOONGESPOELD  
ZOALS WETTELIJK IS  
VOORGESCHREVEN.



|                                | FILL IN                             |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | Netherlands                         | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11003085                            | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | CENTIUM 360CS_1L_NL                 | Booklet                   | 230/225 x 130 mm |
| Label SKU                      | 32007969                            | Number of pages (Booklet) | 6 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_1L_CENTIUM 360CS_NL_KWIZ_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 32007454 40055634 32006132          | Preprinted Material       |                  |

**WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

| Toepassingsgebied                         | Type toepassing                                       | Werkzaamheid getoetst op         | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Consumptie-aardappel                      | Voor opkomst  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  | 0,25 L/ha per teelt-cyclus  | -   |
| Bieten                                    | Voor opkomst  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,2 L/ha                        | 1 per teeltcyclus  | 0,2 L/ha per teeltcyclus  | -   |
|   | Na opkomst  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,05-0,1 L/ha <sup>1</sup>      | 4 per teeltcyclus  |   | 7   |
|   |   |                                  | 0,2 L/ha                        | 1 per teeltcyclus  |   | -   |
| Droog te oogsten erwten                   | Voor opkomst  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  | 0,25 L/ha per teeltcyclus   | -   |
| Droog te oogsten bonen                    | Voor opkomst  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  | 0,25 L/ha per teeltcyclus   | -   |
| Veldboon (voedergewas)                    | Voor opkomst  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  | 0,25 L/ha per teeltcyclus   | -   |
| Boon met peul (onbedekte teelt)           | Voor opkomst  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per 12 maanden   | 0,25 L/ha per teeltcyclus   | -   |
| Doperwt                                   | Voor opkomst  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  | 0,25 L/ha per teeltcyclus   | -   |
| Sluitkoolachtigen (ombedekte teelt)       | Na uitplanten   | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  | 0,25 L/ha per teeltcyclus   | -   |
| Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)       | Na uitplanten   | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  | 0,25 L/ha per teeltcyclus   | -   |
| Boerenkool (geplant, onbedekte teelt)     | Na uitplanten   | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  | 0,25 L/ha per teeltcyclus   | -   |
| Wortelen                                  | Voor opkomst  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  | 0,25 L/ha per teeltcyclus   | -   |
| Asperge (zaaibed, onbedekte teelt)        | Voor opkomst  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per 12 maanden   | 0,25 L/ha per 12 maanden  | -   |
| Asperges (productieveld, onbedekte teelt) | Na het steekseizoen of kort voor of na uitlopen gewas | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per 12 maanden   | 0,25 L/ha per 12 maanden  | -   |

<sup>1</sup> in LDS-systeem met toegelaten middelen

|                                | FILL IN                             |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | Netherlands                         | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11003085                            | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | CENTIUM 360CS_1L_NL                 | Booklet                   | 230/225 x 130 mm |
| Label SKU                      | 32007969                            | Number of pages (Booklet) | 6 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_1L_CENTIUM 360CS_NL_KWIZ_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 32007454 40055634 32006132          | Preprinted Material       |                  |

Het gebruik in de teelt van winterkoolzaad, zomerkoolzaad, witte lupine, raketblad, spinazie, tuinbonen, gezaaide boerenkool, gezaaide koolraap, knolselderij, bleekselderij, rabarber, knolvenkel en blauwmaanzaad is op basis van een "derdenuitbreidingen". Deze "derdenuitbreidingen" zijn aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreidingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van veldboon (als peulvrucht), boon zonder peul (m.u.v. tuinboon), erwt zonder peul (m.u.v. doperwt), erwt met peul, knolraap, koolraap (geplant), zoete aardappel, dille, kervel, koriander, maggiplant en peterselie is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de onbedekte teelt van bladselderij, zaadteelt van kruisbloemige groenbemesters, zaadteelt van bladrap, zaadteelt van zwaardherik, zaadteelt van stoppelknol, zaadteelt van spinazie-achtigen (m.u.v. spinazie), zaadteelt van chinese kool, zaadteelt van koolrabi, en bloemenzaadteelt is op basis van een "derdenuitbreiding" en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze "derdenuitbreiding" is aangevraagd door Plantum NL. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de onbedekte teelt van mosterd, snijbiet, rode biet en schorseneer is op basis van een "derdenuitbreiding" en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze "derdenuitbreidingen" zijn aangevraagd door LTO. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassingsgebied                         | Type toepassing             | Werkzaamheid aanmerkelijk tegen  | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Veldboon als peulvrucht (onbedekte teelt) | Voor opkomst, na het zaaien | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Blauwmaanzaad                             | Voor opkomst                | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Mosterd                                   | Voor opkomst, na het zaaien | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,125 L/ha                      | 1 per teeltcyclus  |
| Winterkoolzaad                            | Voor opkomst                | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Zomerkoolzaad                             | Voor opkomst                | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,15 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Witte lupine                              | Voor opkomst                | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Kruisbloemige groenbemesters (zaadteelt)  | Voor opkomst, na het zaaien | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,125 L/ha                      | 1 per teeltcyclus  |
| Raketblad als groenbemester               | Voor opkomst                | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Bladrap (zaadteelt)                       | Voor opkomst, na het zaaien | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,125 L/ha                      | 1 per teeltcyclus  |
| Zwaardherik (zaadteelt)                   | Voor opkomst, na het zaaien | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,125 L/ha                      | 1 per teeltcyclus  |
| Stoppelknol (zaadteelt)                   | Voor opkomst, na het zaaien | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,125 L/ha                      | 1 per teeltcyclus  |
| Spinazie (onbedekte teelt)                | Voor opkomst                | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,15 L/ha                       | 1 per 12 maanden   |

|                                | FILL IN                             |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | Netherlands                         | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11003085                            | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | CENTIUM 360CS_1L_NL                 | Booklet                   | 230/225 x 130 mm |
| Label SKU                      | 32007969                            | Number of pages (Booklet) | 6 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_1L_CENTIUM 360CS_NL_KWIZ_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 32007454 40055634 32006132          | Preprinted Material       |                  |

| Toepassingsgebied                                       | Type toepassing                           | Werkzaamheid aanneemelijk tegen  | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Snijbiet (onbedekte teelt)                              | Voor opkomst                              | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,15 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Spinazie-achtigen m.u.v. spinazie (onbedekte zaadteelt) | Voor opkomst, na het zaaien               | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,125 L/ha                      | 1 per teeltcyclus  |
| Boon zonder peul m.u.v. tuinboon (onbedekte teelt)      | Voor opkomst, na het zaaien               | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Tuinboon (onbedekte teelt)                              | Voor opkomst                              | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Erwt zonder peul m.u.v. doperwt (onbedekte teelt)       | Voor opkomst, na het zaaien               | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Erwt met peul (onbedekte teelt)                         | Voor opkomst, na het zaaien               | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Boerenkool (gezaaid, onbedekte teelt)                   | Voor opkomst                              | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,2 L/ha                        | 1 per teeltcyclus  |
| Chinese kool (onbedekte zaadteelt)                      | Kort na het uitplanten                    | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Koolrabi (onbedekte zaadteelt)                          | Kort na het uitplanten                    | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Knolraap (onbedekte teelt)                              | Voor opkomst                              | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,2 L/ha                        | 1 per teeltcyclus  |
| Koolraap (gezaaid)                                      | Voor opkomst                              | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,2 L/ha                        | 1 per teeltcyclus  |
| Koolraap (geplant, onbedekte teelt)                     | Voor het planten of direct na het planten | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,2 L/ha                        | 1 per teeltcyclus  |
| Zoete aardappel (onbedekte teelt)                       | Na poten, voor opkomst                    | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,2 L/ha                        | 1 per teeltcyclus  |
| Rode biet (onbedekte teelt)                             | Voor opkomst                              | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,2 L/ha                        | 1 per teeltcyclus  |
| Knolselderij  | Kort na uitplanten                        | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Schorseneer (onbedekte teelt)                           | Voor opkomst                              | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,15 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Bleekselderij (onbedekte teelt)                         | Kort na uitplanten                        | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Rabarber (onbedekte teelt)                              | Voor of kort na uitlopen                  | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per 12 maanden   |
| Knolvenkel (onbedekte teelt)                            | Voor opkomst of na uitplanten             | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,25 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Dille (onbedekte teelt)                                 | Voor opkomst                              | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,15 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Kervel (onbedekte teelt)                                | Voor opkomst                              | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,15 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Koriander (onbedekte teelt)                             | Voor opkomst                              | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,15 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |

|                                | FILL IN                             |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | Netherlands                         | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11003085                            | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | CENTIUM 360CS_1L_NL                 | Booklet                   | 230/225 x 130 mm |
| Label SKU                      | 32007969                            | Number of pages (Booklet) | 6 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_1L_CENTIUM 360CS_NL_KWIZ_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 32007454 40055634 32006132          | Preprinted Material       |                  |

| Toepassingsgebied                  | Type toepassing             | Werkzaamheid aanneemelijk tegen  | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Maggiplant (onbedekte teelt)       | Voor opkomst                | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,15 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Peterselie (onbedekte teelt)       | Voor opkomst                | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,15 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Bladselderij (onbedekte teelt)     | Voor opkomst, na het zaaien | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,15 L/ha                       | 1 per teeltcyclus  |
| Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt) | Voor opkomst, na het zaaien | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,125 L/ha                      | 1 per teeltcyclus  |
| Veredeling (onbedekte teelt)       | Voor opkomst, na het zaaien | Eenjarige breedbladige onkruiden | 0,125 L/ha                      | 1 per teeltcyclus  |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

#### OVERIGE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Centium 360 CS kan in vrijwel alle teelten gewasreacties in de vorm van bladverkleuring (chlorose) en enige groeiremming veroorzaken, zeker als er veel neerslag valt in de periode kort na toepassing. Deze gewasreacties zijn doorgaans van tijdelijke aard zonder negatieve effecten op de uiteindelijke opbrengsten.

In koolgewassen kan er tot enkele weken na toepassing sprake zijn van extreme chlorose en enige groeiremming. Omdat het 4 tot 6 weken kan duren voordat deze symptomen uit het gewas verdwijnen wordt toepassing van het middel in kortdurende koolteelten afgeraden.

In bieten kan er onder bepaalde omstandigheden (veel neerslag in de periode rond toepassing, overlapping van spuitbanen) sprake zijn van extreme chlorose en uitdunning van het gewas waarbij opbrengstderving niet is uitgesloten.

In spinazie is enige bladverkleuring tot aan het einde van de teelt niet uitgesloten hetgeen met name problemen kan geven bij de teelt van verse spinazie.

Mocht de behandelde teelt in het voorjaar mislukken dan wordt afgeraden om zomertarwe, zomergerst, haver, witlof, cichorei, sla, ui, prei of sierteelten als vervanggewas te gebruiken. Voor het zaaien of planten van allerlei volgteelten wordt een kerende grondbewerking d.m.v. ploegen aangeraden.

In een nateelt van bloembollen (o.a. tulpen) is de kans op verkleuringsverschijnselen na toepassing van Centium 360 CS in een voorafgaande teelt niet uitgesloten. De nateelt van bloembollen na toepassing van Centium 360 CS in een voorafgaande teelt wordt dan ook sterk afgeraden!

Door drift kan het middel schadelijke effecten veroorzaken aan naburige gewassen waaronder sierteeltgewassen, fruitbomen en andere houtige beplantingen.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

##### WERKING

Centium 360 CS is een selectief herbicide tegen eenjarige onkruiden waaronder kleeftkruid, varkensgras, herderstasje, vogelmuur, perzikkruid en zwaluwtong. Het werkt systemisch; na opname door de wortels en scheuten verspreidt het zich in de plant.

##### AANBEVELINGEN

In geplante teelten (sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, boerenkool, knolvenkel, bleekselderij en knolselderij) moet Centium 360 CS bij voorkeur toegepast worden binnen de 7 tot 10 dagen na het planten op onkruidvrije, vochtige grond over een droog gewas.

In spinazie dient Centium 360 CS te worden toegepast op een vochtig zaaibed tot uiterlijk 3 dagen na zaai op niet voorgekiemd zaad. Het middel niet toepassen in de zaadteelt van spinazie vanwege kans op plantuitval.

In bieten kan Centium 360 CS worden toegepast tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden zoals bingelkruid, hondspeterselie, varkensgras, zwaluwtong, melganzenvoet en kleeftkruid waarbij in totaal max. 0,2 L middel/ha per teeltseizoen gebruikt mag worden.

Ter bestrijding van echte kamille gebruiken in mengsel met een daartoe geschikt product.

In bieten niet mengen met een grassenmiddel.

Bij toepassing na opkomst bij voorkeur gefractioneerd toepassen op jonge onkruiden.

|                                | FILL IN                             |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | Netherlands                         | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11003085                            | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | CENTIUM 360CS_1L_NL                 | Booklet                   | 230/225 x 130 mm |
| Label SKU                      | 32007969                            | Number of pages (Booklet) | 6 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_1L_CENTIUM 360CS_NL_KWIZ_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 32007454 40055634 32006132          | Preprinted Material       |                  |

**GEREEDMAKEN VAN DE SPUITVLOEISTOF**

Voor gebruik schudden en na gebruik de verpakking weer goed sluiten. Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.

- Begin met een schone spuitmachine
- Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking (als gemengd wordt met andere pesticiden eerst vaste formuleringen, daarna vloeibare formuleringen en tenslotte eventuele uitvloeiers aan de tank toe voegen)
- Vul de tank verder met water
- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking
- Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden toegevoegd aan de tank

**INTERACTIE MET ANDERE MIDDELEN**

Voor tankmengingen raadpleeg uw leverancier of FMC.

**DRIFTMANAGEMENT**

Het overwaaien van spuitnevel (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten) moet worden voorkomen. Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind. Neem de vereiste risicobepalende maatregelen in acht.

**SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR**

Maak alle spuitapparatuur na gebruik goed schoon. Voorkom daarbij verontreiniging van het oppervlaktewater.

- Verdun en verspuit de restvloeistof over het behandelde gewas
- Vul de tank halfvol met water
- Zet het roersysteem enkele minuten aan
- Verspuit daarna het mengsel over het zojuist behandelde gewas
- Spuitdoppen en filters grondig reinigen
- Als laatste de complete machine (spuittank, spuitboom, leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen

**RESISTENTIE**

Dit product bevat clomazone. Clomazone blokkeert de aanmaak van caretenoïden in de plant (HRAC groep 13).

Als herbiciden met dezelfde werkwijze jarenlang toegepast worden kunnen van nature aanwezige resistente onkruiden overleven en overheersen op deze percelen.

Om te vermijden dat bovengenoemd fenomeen (versneld) optreedt, is het belangrijk om:

- in hetzelfde gewas, in hetzelfde teeltjaar dit middel af te wisselen of te mengen met producten met een verschillende werkwijze
- in de rotatie: in de loop van de teeltrotatie herbiciden met verschillende werkwijze te gebruiken
- de gebruiksaanwijzing met betrekking tot dosering, spuitinterval en optimaal toepassingsmoment op te volgen

De mogelijke aanwezigheid van resistentie kan niet worden voorspeld. Raadpleeg uw adviseur of het HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) voor aanbevelingen op het gebied van resistentiemanagement.

**EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN**

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

**NA INSLUKKEN:** De mond spoelen. Een arts raadplegen.

**NA INADEMING:** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

**BIJ CONTACT MET DE HUID:** Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**BIJ CONTACT MET DE OGEN:** Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer **BIG: +32(0)14-584545**.

**BELANGRIJK**

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Deze garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.

FMC Operational Netherlands B.V.  
Fascinatio Boulevard 216-220  
NL-3065 WB Rotterdam

® Gedeponoerd handelsmerk van FMC

|                                | FILL IN                            |                           | DIMENSIONS (WXH) |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Country                        | Netherlands                        | Single label              |                  |
| Product SKU                    | 11003085                           | Base for Booklet          |                  |
| Product SKU Description        | CENTIU 360CS_1L_NL                 | Booklet                   | 230/225 x 130 mm |
| Label SKU                      | 32007969                           | Number of pages (Booklet) | 6 pages          |
| Label SKU Description          | LBL_ML-F_1L_CENTIU 360CS_NL_KWIZ_1 | Carton label              |                  |
| Label SKU (earlier version(s)) | 32007454 40055634 32006132         | Preprinted Material       |                  |